УДК 524.33 + 524.352—36

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОТБОРА ХОЛОДНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ЗВЕЗД

Г. В. ХОЗОВ

Поступила 3 июня 1991

Принята к печати 20 октября 1991

Предложен фотометрический критерий для отбора холодных углеродных звезд на основе единичного измерения в RIK-цветах.

Возможно ли, исходя из особенностей химсостава углеродных звезд, проводить их первичный отбор, воспользовавшись лишь разовым широкополосным фотометрическим наблюдением в нескольких цветовых полосах? Такой вопрос в числе других мы ставили перед собой, проводя сравнительное изучение фотометрических характеристик красных гигантов переменного блеска в рамках долгосрочной наблюдательной программы Астрономической обсерватории Госуниверситета Санкт-Петербурга.

Положительный ответ на поставленный вопрос был получен нами на основании анализа результатов многолетних RIK-наблюдений холодных M, S и C-звезд, представленных преимущественно долгопериодическими и полуправильными переменными. Всего анализировались около 300 наблюдений 21 кислородной, 3 циркониевых и 14 углеродных звезд. Наблюдавшиеся объекты представлены в табл. 1 в порядке, соответствующем номерам каталога двухмикронного обзора неба [1]. Остальные данные взяты из ОКПЗ [2].

При анализе каждое отдельное наблюдение звезды независимо от фазового момента рассматривалось как наблюдение самостоятельного объекта с фиксированным «мгновенным» значением фотометрической характеристики в виде звездной величины и показателей цвета. Для включения проявления физических особенностей того или иного объекта, связанных с фазовым моментом, для подавляющего большинства звезд использованы наблюдения, охватывающие весь диапазон фаз. При этом рассматривались лишь только измерения, выполненные одновременно во

ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

IRC	Звезда	Спектр	Тип перемен.	Период	Примечания
1	2	3	4	5	6
-20642	R Aqr	M5e—M8.5e+pec	M	386.96	
+10050	IK Tau	M6e—N10e	M	465*	NML Tau
+10121	BL Ori	C6.3(N8; Tc)	Lb	?	
+10215	R Leo	M6e—M9e	M	309.95	
+10216	CW Leo	C9.5	M	630*	
+10406	R Aql	M5e—M9e	M	284.2	
+10527	R Peg	M6e—M9e	M	378.1	
+20127	U Ori	M6e—M9.5e	M	368.1	
+20207	T Cnc	C3.8—C5.6(R6—N6)	SRb	482	
+20298	U Her	M6.5e—M9.5e	M	406.10	
+20328	MW Her	M8—M9	M	500*	CIT 9
	T Her	M2.5e—M8e	M	164.98	Нет в IRC
+30215	R LMi	M6.5e—M9e	M	372.19	
+30219	RW LMi	C4.3ev	M	605*	CIT 6
+30260	R Boo	M3e—M8e	M	223.40	
+30283	RU Her	M6e—M9e	M	484.83	CIT 8.
+30395	X Cyg	S6.2e—S10.4e	M	408.05	
+40004	—	?	M	723*	CIT 1
+40009	R And	S3.5e—S8.8e(M7e)	M	409.33	
+40273	V CrB	G6.2e(N2e)	M	357.63	
+40397	RS Cyg	C8.2e(NOpe)	SRa	417.39	
+40442	DG Cyg	M7e—M9.5e	M	457.61	CIT 10
+40448	V1489 Cyg	M4.5—M7.9 IA—III	SRa	1045*	NML Cyg
+40485	V1426 Cyg	C7.2e	M	475*	CIT 13
+40489	V460 Cyg	C6 4(N1)	SRb	180:	
+50096	V384 Per	C(N)	M	540*	CIT 5
	Y Per	C4.3e(R4e)	M	248.60	Нет в IRC
+50141	R Aur	M6.5e—M9.5e	M	457.51	
+50301	R Cyg	S2.5e—S6.9e	M	426.45	
+50306	RT Cyg	M2e—M8.8elb	M	190.28	
+50314	Z Cyg	M5e—M9e	M	263.69	
+50324	U Cyg	C7.2e—C9.2e(Npe)	M	463.21	
+50338	V Cyg	C5.3—C7.4e(Npe)	M	486.84	
+50484	R Cas	M6e—M10e	M	388.14	

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6
+60009	T Cas	M6e—M9e	M	444.83	
+60255	T Dra	C6.2e—C8.3e(N0e)	M	421.62	
+70168	T Cep	M5.5e—M8.8e	M	388.14	
+80048	S Cep	G7.4e(N8e)	M	486.84	

Примечание. Звездочками отмечены наши определения типа переменности и периода по временном интервале, охватывающем 10—15 циклов изменения блеска объекта.

всех цветах. Поскольку для разных звезд межзвездное покраснение различается и, возможно, в широких пределах, мы использовали при анализе Q -параметр, не зависящий от величины межзвездного покраснения [3]:

$$Q_{RIK} = (R - 1) - \frac{E_{R-1}}{E_{I-K}} (I - K).$$

На рис. 1 приводятся зависимости Q_{RIK} от показателя $I-K$, который в данном случае характеризует степень «холодности» той или иной звезды, а также фазовый момент наблюдения. В нашем случае холодными звездами считаем все объекты, которые даже в максимуме блеска имеют $(I-K) > 2^m$, что соответствует эффективным температурам ниже 3300 К. Этому критерию удовлетворяют все 38 звезд, использованных при анализе, независимо от химсостава. Из всех наблюдений лишь в четырех случаях были получены значения $(I-K) < 2^m$, но они скорее всего обусловлены ошибками измерений, поскольку не соответствовали фазам максимального блеска объекта в рассматриваемых цветах. Сплошной линией нанесена зависимость Q -параметра для чернотельного излучения, а штриховыми ограничены зоны заполнения M и S звездами—в верхней части, C -звездами—в нижней части рисунка.

Из рисунка очевидно, что эти зоны заполнения хорошо различаются. К сожалению, зависимости Q -параметра от $I-K$ для кислородных и циркониевых звезд не различаются, хотя последние и имеют некоторую тенденцию к расположению вблизи нижней границы верхней зоны заполнения этими звездами. Если в интервале $2^m 0 < (I-K) < 2^m 5$ границы зон отстоят примерно на $0^m 8 - 1^m 0$, то расхождение границ между зонами в интервале $2^m 5 > (I-K) > 9^m 5$ составляет не менее $1^m 1$. Все без исключения значения Q_{RIK} для углеродных звезд отрицательны и по абсолютной величине больше 1^m . Верхняя и нижняя

границы зон могут быть представлены следующими выражениями в интервале $3^m 0 < (I-K) < 9^m 5$, соответственно:

$$Q_C = -0.80(I-K) + 1.52 \text{ и } Q_{MS} = -0.80(I-K) + 2.62.$$

Следует отметить, что в интервале $2^m 5 < (I-K) < 3^m 5$ для кислородных и циркониевых звезд Q -параметр положителен.

Рис. 1. Параметр Q_{RIK} для кислородных (○), циркониевых (○) и углеродных (+) звезд в зависимости от наблюдаемых значений $(I-K)$ в различные фазовые моменты изменений блеска.

Большими крестами в правой части каждой из зон на рисунке отмечены ошибки определений показателей цвета $R-I$ и $I-K$ для случаев самых слабых объектов. При этом горизонтальная черта характеризует ошибку в определении $I-K$, а вертикальная—суммарную ошибку вычисленного Q -параметра, учитывающую ошибки определений $R-I$ и $I-K$ при наблюдениях.

Параметр Q_{RIK} в данном случае вычислялся в соответствии с «нормальным» законом распределения межзвездного поглощения по длинам волн [4]. Рассмотрение всех имеющихся данных о возможных от-

клонениях поглощения от «нормального» в отдельных областях неба показывает, что найденные нами соотношения лишь в незначительной степени могут измениться, не влияя на сделанный вывод.

А вывод заключается в том, что любая наблюдаемая звезда с показателем $I-K > 2^m$, для которой в любой фазовый момент установлено значение $Q_{RIK} < -1^m$, является углеродной звездой.

Таким образом, отмеченная закономерность может быть использована при отборе холодных углеродных звезд на основании одного фотометрического наблюдения объекта в цветовых полосах R , I и K .

Государственный университет
Санкт-Петербурга

A PHOTOMETRIC METHOD FOR THE SELECTION OF THE COOL CARBON STARS

G. V. KHOZOV

The photometric criterion for the selection of the cool carbon stars on the base of a single measurement of RIK -colours is suggested

ЛИТЕРАТУРА

1. G. Neugebauer, R. B. Leighton. Two-micron sky survey, Preliminary Catalog, NASA SP-3074, Washington, 1969.
2. П. Н. Холопов и др. Общий каталог переменных звезд, т. I—III, Наука, М., 1985.
3. В. Страйхис, Многоцветная фотометрия звезд, изд. «Мокслас», Вильнюс, 1977.
4. Н. L. Johnson, Nebulae and Interstellar Matter, ed. B. M. Middlehurst, L. Aller, Univ. Chicago Press, 1968.