УДК: 52:531.51+524.354.6

О МОМЕНТЕ ИНЕРЦИИ НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД I. РЕЛЯТИВИСТСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ НАКОПЛЕННОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ

Л.Ш.ГРИГОРЯН¹, Г.Ф.ХАЧАТРЯН²

Поступила 11 сентября 1996

Принята к печати 23 сентября 1996

Выведено релятивистское дифференциальное уравнение первого порядка для накопленного момента инерции сферически-симметрического небесного тела. Предложена приближенная формула, описывающая вклад релятивистских эффектов в момент инерции сверхплотной звезды. В случае конфигураций из несжимаемой жидкости эта аппроксимация описывает результаты численных расчетов Чандрасекара и Миллера с погрешностью 5% во всем диапазоне центральных давлений от 0 до ∞ .

1. *Введение.* Вращение является общим свойством небесных тел. Оно детально изучено в ньютоновской теории тяготения (см., например, [1] и приведенные там ссылки). Релятивистская теория медленно вращающихся звезд была предложена Хартлом [2]. Им же, совместно с Торном [3], были изучены модели вращающихся звездных конфигураций. Эти исследования были продолжены в [4-8] и других работах. Влияние вращения на параметры белых карликов и нейтронных звезд изучалось параллельно в [9-12] и других публикациях. Интерес к релятивистской теории вращающихся небесных тел значительно возрос в последнее десятилетие в связи с наблюдением ряда короткопериодических пульсаров и осознанием того обстоятельства, что вращение играет важную роль для конечной стадии звездной эволюции (теория гравитационного коллапса и вспышек сверхновых).

В п.2 выведено релятивистское уравнение для накопленного момента инерции медленно вращающегося сферически-симметрического небесного тела. В следующем разделе обсуждаются релятивистские поправки к полному моменту инерции. В Заключение приведены выводы работы.

2. *Релятивистское уравнение для накопленного момента инерции.* В случае стационарного аксиально-симметрического гравитационного поля можно ввести систему координат t, r, θ, φ , в которой квадрат интервала имеет вид [13]

$$ds^2 = e^\nu c^2 dt^2 - e^\lambda dr^2 - r^2 e^\mu [d\theta^2 + \sin^2\theta(d\varphi + \omega dt)^2], \quad (1)$$

где ν, λ, μ и ω являются функциями r, θ и угловой скорости вращения небесного тела Ω , измеренной удаленным наблюдателем.

Согласно [2] медленное вращение является малым возмущением, и поэтому в нулевом порядке по Ω метрический тензор зависит только от радиальной координаты:

$$v = v_0(r), \quad \lambda = \lambda_0(r), \quad \mu = \omega = 0 \quad \text{при} \quad \Omega = 0 \quad (2)$$

(шварцшильдовская система координат), и определяется релятивистскими уравнениями гидростатического равновесия для сферически-симметрического небесного тела:

$$\frac{dP}{dr} = -G(\rho + c^{-2} P) \frac{m + 4\pi r^3 P/c^2}{r(r - 2Gm/c^2)} \quad (a)$$

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi\rho r^2 \quad (b)$$

(уравнения Оппенгеймера-Волкова), где

$$e^{-\lambda_0} = 1 - \frac{2Gm}{rc^2} \quad (a)$$

$$\frac{dv_0}{dr} = \frac{2G(m + 4\pi r^3 P/c^2)}{r(rc^2 - 2Gm)} \quad (b)$$

В этих выражениях P и ρc^2 - давление и плотность полной энергии звездного вещества, $m(r)$ - тяготеющая масса, накопленная внутри сферического слоя радиуса r , G - ньютоновская гравитационная постоянная, а c - скорость света. Имея уравнение состояния

$$\rho = \rho(P) \quad (5)$$

вещества сверхплотного небесного тела, и, задавая центральное давление $P(0) = P_0$, можно определить радиус R и тяготеющую массу

$$M = m(r) \quad \text{при} \quad r \geq R \quad (6)$$

путем интегрирования (3) с начальным условием

$$m(0) = 0. \quad (7)$$

При этом радиус небесного тела $r = R$ определяется условием $P(R) = 0$ или $\rho(R) = \rho_s$, где ρ_s - плотность вещества на поверхности небесного тела. Функции $\lambda_0(r)$ и $v_0(r)$ определяются уравнениями (4). Результаты подобных расчетов подытожены в [14-19] и других работах.

Медленное вращение небесного тела приводит к релятивистскому эффекту увлечения инерциальных систем отсчета (см., например, [15]), благодаря которому

$$\varpi(r) \neq \Omega, \quad (8)$$

где ϖ - угловая скорость вращения гравитирующего вещества в локально инерциальной системе отсчета:

$$\varpi = \Omega + \omega. \quad (9)$$

Вращение приводит также к сферической, квадрупольной и другим

более сложным деформациям, которые определяются функциями ν , λ и μ . Из (1) видно, что ν , λ и μ являются четными функциями, а ω - нечетной функцией Ω . Поэтому в первом приближении по малому параметру $c\Omega R^2/GM$ (медленно вращающееся сферически-симметрическое небесное тело) можно считать

$$\nu \approx \nu_0(r), \quad \lambda \approx \lambda_0(r), \quad \mu \approx 0, \quad \omega \approx \Omega. \quad (10)$$

Функция $\varpi(r)$ определяется не диагональной компонентой уравнения Эйнштейна:

$$R_0^3 = \frac{8\pi G}{c^4} T_0^3, \quad (11)$$

где R_{ik} - тензор Риччи пространства-времени, а

$$T_{ik} = (\rho c^2 + P)u_i u_k - P g_{ik} \quad (12)$$

- тензор энергии-импульса звездного вещества. В раскрытом виде (11) сводится к уравнению

$$\frac{d}{dr} \left(r^4 j \frac{d\varpi}{dr} \right) + 4r^3 \varpi \frac{dj}{dr} = 0 \quad (13)$$

с граничными условиями

$$\left(\frac{d\varpi}{dr} \right)_{r=0} = 0, \quad \varpi(\infty) = \Omega \quad (14)$$

(см., например, [2,3,6-11,16,18]). При этом

$$j(r) = e^{-\nu_0/2} \sqrt{1 - 2Gm/r c^2} \Rightarrow j(r) = 1 \quad \text{при } r \geq R. \quad (15)$$

Уравнение (13) элементарно интегрируется за пределами небесного тела [2,9]:

$$\frac{\varpi(r)}{\Omega} = 1 - \frac{2GI}{c^2 r^3} \quad \text{при } r \geq R. \quad (16)$$

В этом выражении $I = J/\Omega$ является релятивистским обобщением для медленно вращающейся системы ньютоновского понятия момента инерции (J - полный момент количества движения для небесного тела и гравитационного поля). Для вычисления релятивистского момента инерции, необходимо проинтегрировать уравнения Оппенгеймера-Волкова (3) совместно с (46), (13), а затем воспользоваться условиями непрерывности ϖ и $d\varpi/dr$ на поверхности небесного тела:

$$\frac{\varpi(R)}{\Omega} = 1 - \frac{2GI}{c^2 R^3}, \quad \frac{d\varpi}{dR} = \frac{6GI\Omega}{c^2 R^4}. \quad (17)$$

При желании можно использовать интегральное представление [8,16]

$$I = \frac{8\pi}{3} \int_0^R j(r) r^4 \frac{\varpi(r)}{\Omega} \frac{\rho + c^{-2} P}{1 - 2Gm/r c^2} dr. \quad (18)$$

Для сего вывода достаточно проинтегрировать обе части уравнения (13) и в полученное выражение подставить

$$\frac{dj}{dr} = -\frac{4\pi Grj(\rho + c^{-2}P)}{c^2 - 2Gm/r}, \quad (19)$$

а также $d\omega/dR$ из (17).

Можно обойтись без дифференциального уравнения второго порядка, каковым является (13). Для этого введем функцию $i(r)$, определяемую соотношением

$$i = \frac{c^2 \omega' r^4}{2G(3\omega + r\omega')}, \quad (20)$$

где штрих над функцией означает операцию дифференцирования по r . Дифференцируя $i(r)$, имеем

$$\frac{di}{dr} = \frac{3c^2 \omega r^3 (4\omega' + r\omega'')}{2G(3\omega + r\omega')^2}. \quad (21)$$

В свою очередь из (13) и (19) находим

$$4\omega' + r\omega'' = \frac{4\pi}{c^2} Gr(4\omega + r\omega') \frac{\rho + c^{-2}P}{1 - 2Gm/r c^2}, \quad (22)$$

и поэтому

$$\frac{di}{dr} = 6\pi r^4 a(1+a) \frac{\rho + c^{-2}P}{1 - 2Gm/r c^2}, \quad (23)$$

где

$$a = \frac{\omega}{3\omega + r\omega'}. \quad (24)$$

Из определения (20) вытекает, что

$$1 - 3a = \frac{2Gi}{c^2 r^3}. \quad (25)$$

Подставив выражение для a в (23), приходим к уравнению

$$\frac{di}{dr} = \frac{8}{3} \pi r^4 \left(1 - \frac{2Gi}{c^2 r^3}\right) \left(1 - \frac{Gi}{2c^2 r^3}\right) \frac{\rho + c^{-2}P}{1 - 2Gm/r c^2}. \quad (26)$$

Из него следует, что за пределами небесного тела $i(r)$ постоянно и, как видно из (17), (20), равно полному моменту инерции:

$$i(r) = I \quad \text{при } r \geq R. \quad (27)$$

Согласно (14) в центре небесного тела

$$i(0) = 0. \quad (28)$$

Наконец, в случае слабого гравитационного поля (26) переходит в уравнение

$$\frac{di_N}{dr} = \frac{8}{3} \pi \rho r^4 \quad (29)$$

для накопленного момента инерции $i_N(r)$ ньютоновской теории. Аналогия с уравнениями (36), (6), (7) для накопленной массы позволяет утверждать, что $i(r)$ является накопленным моментом инерции релятивистской теории.

Объединяя (26) с уравнениями Оппенгеймера-Волкова (3), получим систему трех релятивистских дифференциальных уравнений первого порядка, определяющих распределение давления, массы и момента инерции в объеме сферически-симметрического небесного тела. Как видим, (26) заменяет уравнения (46), (13).

Уравнение (26) впервые без вывода было использовано одним из авторов (Л.Ш.Г) в [17] для вычисления моментов инерции белых карликов и нейтронных звезд.

3. *Релятивистские поправки к моменту инерции.* Отличие релятивистского уравнения (26) от уравнения (29) ньютоновской теории можно учесть введением множителя σ :

$$I = \sigma I_N, \quad I_N = i_N(R). \quad (30)$$

Для модели из несжимаемой жидкости:

$$\rho = \text{const}, \quad (31)$$

релятивистский множитель σ был рассчитан Чандрасекаром и Миллером [6] путем численного интегрирования (46), (13). В модели (31) уравнения (3), (29) интегрируются аналитически:

$$R = r_0 \sqrt{1 - \left(\frac{\rho c^2 + P_0}{\rho c^2 - 3P_0} \right)^2}, \quad M = \frac{4}{3} \pi \rho R^3, \quad I_N = \frac{2}{5} MR^2, \quad (32)$$

где $r_0^2 = 3c^2/8\pi G\rho$ (см., например, [14]). На рис. 1 представлены результаты расчетов [6]. Из них следует, что σ стремится (а) к ньютоновскому пределу 1 при $r_g/R \rightarrow 0$ ($P_0/\rho c^2 \rightarrow 0$), и в то же время (б) к значению ≈ 2.00 в пределе $r_g/R \rightarrow 8/9$, когда $P_0/\rho c^2 \rightarrow \infty$. Заметим, что для сверхплотного звездного вещества отношение $P/\rho c^2$ не может превышать 1 [14], и поэтому соответствующие отрезки кривых (между вертикальными прямыми с $P_0/\rho c^2 = 1$ и ∞) представляют академический интерес. Более того,

$$\lim_{P \rightarrow \infty} \frac{P}{\rho c^2} = \frac{1}{3}, \quad (33)$$

согласно свойству асимптотической свободы кварков. В последнем случае из рис. 1 видно, что σ может достигать значения порядка 30%. На рис. 1 результаты Чандрасекара и Миллера дополнены отношением σ к

$$\sigma_0 = \frac{2}{1 - 0.5x + \sqrt{1 - x + 0.09x^2}}, \quad x = \frac{r_g}{R}, \quad r_g = \frac{2GM}{c^2}. \quad (34)$$

Кривая σ/σ_0 свидетельствует о том, что $\sigma_0(x)$ описывает результаты расчетов $\sigma(x)$ с погрешностью 5% во всем диапазоне центральных давлений от $P_0 = 0$ до $P_0 = \infty$.

Рис. 1. Графики релятивистского момента инерции I , релятивистского множителя $\sigma = I/I_N$ и σ/σ_0 в зависимости от r_g/R для моделей сверхплотных звезд из несжимаемой жидкости ($\rho = \text{const}$). Значения I и σ взяты из [6] (табл. 1), $I_0 = c^2(3c^2/8\pi G\rho)^{3/2}/2G$. Вертикальные прямые соответствуют $P_0/\rho c^2 = 0.1, 1/3, 1$ и ∞ .

В работе Равенола и Пстика [8] предложена формула

$$I \approx 0.21 \frac{MR^2}{1-x} \quad (35)$$

для момента инерции сферически-симметрического небесного тела. Столь простая формула с погрешностью $\sim 10\%$ воспроизводит результаты численных расчетов для 11 вариантов уравнения состояния $\rho = \rho(P)$ звездного вещества и конфигураций с не очень малыми массами ($0.5 M_\odot \leq M < 2 M_\odot$ для одного из вариантов уравнения состояния). Как отмечается в [8], (35) не применимо для модели с $\rho = \text{const}$. В этом случае согласно (34)

$$I \approx \frac{0.8 MR^2}{1 - 0.5x + \sqrt{1 - x + 0.09x^2}}. \quad (36)$$

Перейдем к выводу $\sigma_0(x)$ методом, который был использован Равнолом и Петиком для обоснования (35).

Рис. 2. Графики функций, входящих в релятивистское уравнение (26) и (38), в зависимости от радиальной координаты r , для моделей с $\rho = \text{const}$, R - радиус небесного тела, $I_0 = c^2 (3c^2/8\pi G\rho)^{3/2} / 2G$. Дальнейшие пояснения в тексте.

На рис. 2а приведены графики накопленного момента инерции $i(r)$ как функции радиальной координаты r для моделей из несжимаемой жидкости. Рядом с кривыми указаны значения центрального давления P_0 в единицах ρc^2 . Кружочки на кривых указывают расположение сфе-

рической поверхности $r = r_1$, внутри которой накоплено 5% полного момента инерции:

$$i(r_1) = 0.05 I. \quad (37)$$

Расположение кружочков согласуется с результатом ньютоновской теории: $r_1 = (0.05)^{1/5} R \approx 0.55 R$, и указывает на то, что 95% момента инерции сосредоточено во внешнем слое небесного тела с $0.55 \leq r/R \leq 1$. На рис.

2b приведена функция

$$\xi(r) = \left(1 - \frac{2GI}{c^2 r^3}\right) \left(1 - \frac{GI}{2c^2 r^3}\right) \frac{1 + P/\rho c^2}{1 - 2Gm/r c^2} \quad (38)$$

(она фигурирует в (26)) в зависимости от r . Обозначения и конфигурации те же, что и на рис. 2a. Из графиков видно, что во внешнем слое изменим $\xi(r)$ можно пренебречь:

$$\xi(r) \approx \xi(R), \quad \text{при } r_1 \leq r \leq R. \quad (39)$$

Таким образом, 95% полного момента инерции сосредоточено во внешнем слое конфигурации, где $\xi(r) \approx \xi(R)$. Поэтому при вычислении I можно заменить $\xi(r)$ его значением на поверхности небесного тела:

$$\xi(R) = \left(1 - \frac{2GI}{c^2 R^3}\right) \left(1 - \frac{GI}{2c^2 R^3}\right) \left/ \left(1 - \frac{2GM}{c^2 R}\right) \right. \quad (40)$$

Производя замену в (26) и интегрируя, приходим к равенству

$$I \left(1 - \frac{2GM}{c^2 R}\right) \approx I_N \left(1 - \frac{2GI}{c^2 R^3}\right) \left(1 - \frac{GI}{2c^2 R^3}\right), \quad (41)$$

из которого следует

$$\sigma \approx \sigma_0(y, z), \quad (42)$$

где

$$\sigma_0 = \frac{2}{y + \sqrt{y^2 - z^2}}, \quad y = 1 - \frac{2GM}{c^2 R} + \frac{5GI_N}{2c^2 R^3}, \quad z = \frac{2GI_N}{c^2 R^3}. \quad (43)$$

Подстановка (32) в (43) приводит к (34).

4. *Заключение.* В релятивистской теории момент инерции медленно вращающегося сферически-симметрического небесного тела определяется интегрированием уравнения (46) совместно с дифференциальным уравнением второго порядка (13), где ω - угловая скорость вращения звездного вещества в локально-инерциальной системе отсчета (см., например, [2,3, 6-11,16,18]). В данной работе выведено релятивистское дифференциальное уравнение первого порядка (26) для накопленного момента инерции $i(r)$. Оно заменяет (46), (13) и совместно с уравнениями Оппенгеймера-Волкова (3) позволяет определить распределение давления, массы и момента инерции в объеме сферически-симметрического небесного тела.

Для релятивистского множителя σ , определяемого соотношением $I = \sigma I_N$ (I_N - момент инерции, вычисленный с помощью уравнения (29) ньютоновской теории), выведена приближенная формула (42). В случае конфигураций из несжимаемой жидкости σ_0 принимает вид (34) и воспроизводит результаты численных расчетов Чандрасекара и Миллера [6] с погрешностью 5% во всем диапазоне центральных давлений от нуля до бесконечности.

В следующей публикации аппроксимация $I \approx \sigma_0 I_N$ будет применена для конфигураций с плотностью $\rho \neq \text{const}$ и будет сопоставлена с приближенной формулой Равенола-Петика (35).

В расчетах использован PC Pentium, подаренный Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Работа выполнена в рамках гранта 96-855 Министерства образования и науки Республики Армения.

¹ Институт прикладных проблем физики

² Ереванский государственный университет, Армения

ON NEUTRON STAR MOMENT OF INERTIA I. RELATIVISTIC EQUATION FOR ACCUMULATED MOMENT OF INERTIA

L.Sh.GRIGORIAN¹, H.F.KHACHATRIAN²

It is derived a relativistic differential equation of the first order for accumulated moment of inertia of spherically-symmetric celestial body. It is proposed an approximate formula describing the contribution of relativistic effects to the moment of inertia of a superdense star. Results of the numerical calculations carried out by Chandrasekhar and Miller for configurations of incompressible fluid are approximated by our formula within an accuracy of 5% for all values of central pressures from 0 to ∞ .

ЛИТЕРАТУРА

1. Ж.Л.Тассуль, Теория вращающихся звезд, Мир, М., 1982.
2. J.B.Hartle, Astrophys. J., 150, 1005, 1967.
3. J.B.Hartle, K.S.Thorne, Astrophys. J., 153, 807, 1968.

4. *J.V.Hartle*, *Astrophys. J.*, **161**, 111, 1970.
5. *J.V.Hartle*, *Astrophys. Space Sci.*, **24**, 385, 1973.
6. *S.Chandrasekhar, J.C.Miller*, *Mon. Notic. Roy. Astr. Soc.*, **167**, 63, 1974.
7. *J.M.Thomas*, *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.*, **79**, 189, 1989.
8. *D.G.Ravenhall, C.J.Pethick*, *Astrophys. J.*, **424**, 846, 1994.
9. *Д.М.Седракян, Э.В.Чубарян*, *Астрофизика*, **4**, 239, 551, 1968.
10. *В.В.Папоян, Д.М.Седракян, Э.В.Чубарян*, *Астрофизика*, **5**, 97, 415, 1969.
11. *Г.Г.Арутюнян, Д.М.Седракян, Э.В.Чубарян*, *Астрофизика*, **7**, 467, 1971; *Астрон. ж.*, **48**, 496, 1971.
12. *Г.Г.Арутюнян, В.В.Папоян, Г.С.Саакян, А.В.Саркисян*, *Астрофизика*, **33**, 69, 1990.
13. *J.V.Hartle, D.H.Sharp*, *Astrophys. J.*, **147**, 317, 1966.
14. *Г.С.Саакян*, *Равновесные конфигурации вырожденных газовых масс*, Наука, М., 1972.
15. *Ч.Мизнер, К.Торн, Дж.Уилер*, *Гравитация*, Мир, М., 1977.
16. *W.D.Arnett, R.L.Bowers*, *Astrophys. J. Suppl. Ser.*, **33**, 415, 1977.
17. *L.Sh. Grigorian, G.S.Sahakian*, *Astrophys. Space Sci.*, **95**, 305, 1983.
18. *G.Bao, E.Ostgaard*, *Inter. J. Mod. Phys. D*, **3**, 813, 1994.
19. *Г.С.Саакян*, *Физика нейтронных звезд*, Изд. ОИЯИ, Дубна, 1995.