

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КОНСТАТА “ш” В ОСНОВАНИЯХ МАТЕМАТИКИ

*Г.Б. Аракелян,
Ведущий научный сотрудник
Института Философии,
социологии и права НАН РА,
доктор философских наук*

Понятие натурального числа всегда казалось настолько простым и незаменимым, что долгое время не возникало потребности в его определении посредством других понятий. Однако все попытки обоснования математики сведением ее к арифметике натурального ряда оказались безуспешными. Детальный анализ оснований математики, отвергая идею первичности натурального ряда, приводит к системе двух исходных функций и восьми фундаментальных математических констант, включая новую константу, обозначенную нами армянской буквой ш. Посредством константы ш решается ряд “непробиваемых” проблем физической теории, а перспективными сферами её применения являются динамические и самоорганизующиеся системы, колебательные и энтропийные процессы, теория хаоса, фазовые переходы, фракталы, турбулентность, планетные орбиты...

С чего начинается множество чисел? .

“С натуральных чисел”, – очевидно скажут многие. Сам же натуральный ряд обычно начинают с единицы, но последняя при глубоком рассмотрении в теории чисел и анализе оказывается весьма сложным математическим объектом. Можно, конечно, начинать с 2 или 3 или даже, как это иногда делают, с 4, считая именно двойку (тройку, четверку) первым натуральным числом, однако наша математическая интуиция восстает против этого: ряд, начинающийся не с нуля и даже не с единицы, выглядит нелепо и не очень привлекательно. Хуже всего то, что единицу

так или иначе ввести надо, как и нуль, который всегда почему-то плохо вписывается в идею изначальности натурального ряда.

Концепция, основанная на идее первичности натуральных чисел по отношению ко всем остальным математическим объектам, вынуждена для построения действительных и комплексных чисел прибегать к искусственным приемам. В частности, отрицательные целые числа $-1, -2, -3, \dots$ так же как нуль, не могут быть получены из натуральных чисел без дополнительных допущений. Наверное не случайно, что отрицательные числа лишь в XIII веке были завезены Леонардо Пизанским (Фибоначчи) в Европу с Востока, где они также появились позже дробных чисел и тоже далеко не сразу – вначале в Древнем Китае, с VII века в Индии. Нельзя упрощенно представлять себе дело так, что из понятия натурального числа логически вытекает понятие отрицательного натурального ряда $-1, -2, -3, \dots$. Для введения последних необходим какой-то принцип, допустим, делающий возможным установление взаимно-однозначного соответствия между теми и другими. Здесь существенно, что новые объекты вроде отрицательных чисел и нуля не строятся из натуральных, а фактически определенным образом вводятся в дополнение к ним.

Между тем основная цель любой концепции, стремящейся к унификации математики путем выявления ее первоосновы, всегда одна и та же: из минимального базиса исходных математических объектов и правил оперирования ими построить остальные объекты – здесь это множество всех чисел, – не выходя за пределы первоначально выбранного базиса. Конечно, в данном случае в исходный базис с самого начала могут быть включены и такие объекты как бесконечный ряд отрицательных чисел вместе с нулем, раз уж процесс их получения нарушает указанное условие. Расширенный подобным образом базис оказывается достаточным для того чтобы уже без помех построить множество всех действительных чисел. Но, во-первых, это уже *не* натуральный базис, во-вторых, он слишком громоздок, а главное, всё равно не способен решить некоторые очень важные вопросы.

Среди них проблема комплексных чисел. Мнимая единица обычно определяется равенствами $i = \sqrt{-1}$ или $i^2 = -1$, а множество комплексных чисел как множество чисел типа $x + iy$, где x и y

произвольные действительные числа. Не говоря уж об искусственности подобного определения чрезвычайно важной величины, которое в сущности является лишь свойством числа i , взятым за неимением лучшего в качестве его определения, есть и нечто другое. Совершенно непонятно, почему например мнимая единица в своей же степени равна $e^{-\pi/2}$:

$$i' = (\sqrt{-1})^{\sqrt{-1}} = e^{-\frac{\pi}{2}}$$

В рамках обсуждаемой концепции такое соотношение выглядит загадочным. Это соотношение, получаемое в теории функций комплексного переменного, не поддается рациональному осмыслению в пределах концепции первичности натуральных чисел.

Не менее загадочным выглядит простой пример извлечения корня степени n из единицы. Уравнение $x = \sqrt[n]{1}$, в правой части которого нет ничего кроме натуральных чисел, имеет n корней

$$x_k = e^{2k\pi i/n} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

из которых лишь один (при $k = 0$) является действительным, а все остальные корни — комплексные.

Современную математику невозможно представить без таких величин как константы e и π , между тем они не находят себе никакого разумного объяснения в рамках обсуждаемой концепции, хотя и могут выражаться через натуральные числа с помощью бесконечных рядов и произведений. Притом во многих случаях появление этих констант, в частности при решении различных задач, весьма неожиданно и едва ли предсказуемо, хотя и строго доказано.

Можно привести множество впечатляющих примеров, показывающих совершенно особую роль в математике таких величин как π и e . Непонятно, почему среди бесконечного множества трансцендентных, иррациональных чисел явно выделяется среди остальных небольшая группа фундаментальных констант, появляющихся во всех сферах математики включая такое исконное “владение” натурального ряда как теория простых чисел. Между тем в концепции, первооснову которой составляет натуральный

ряд, числа типа π и e выступают как вторичные по отношению к натуральным числам конструкторы, определенным образом из них построенные. Объяснение универсальной значимости и уникальности фундаментальных математических констант (ФМК) входит в прямые обязанности данной концепции, является ее внутренней задачей. Однако жесткая числовая демократия натурального ряда не в состоянии объяснить появление чисел-аристократов, притом чуждой природы, не подчиняющихся действующим канонам. Здесь не видно никакого подхода: числа π и e , мнимая единица i и другие, менее значительные константы это как бы пришельцы из другого математического мира, необъяснимые феномены в математической и философской доктрине изначальности натуральных чисел.

Подводя итог сказанному, прежде всего констатируем, что великая тысячелетняя идея, превратившись в какой-то момент в стойкий, нерушимый догмат, а впоследствии – в тормозящий развитие предрассудок, пыталась захватить всю сферу чистой математики, а также математического естествознания. Достичь конечной цели или хотя бы приблизиться к ней ни в том ни в другом случае не удалось. Ни огромная практическая польза, ни авторитет блистательной плеяды мыслителей разных эпох, являющихся предвестниками современной доктрины исключительности и изначальности натуральных чисел, ни какие-либо другие факторы не в состоянии компенсировать ее бессилие в решении проблем, касающихся оснований математики и математического естествознания. Здесь достаточно лишь указать на одно решающее обстоятельство (подробнее см. [Аракелян 2007а, 38,39]: *системы арифметики натуральных чисел не содержит в себе все те первичные элементы, которые необходимы для построения остальных объектов математики.*

Аксиоматическая система AG

Отвечающая всем требованиям искомая формальная система хотя и не так популярна как системы арифметики натуральных чисел, но тоже известна и обозначается символом AG [Клини 1973, 259–263]. Система AG содержит следующие формальные символы:

$\sim \supset \& \vee \neg \forall \exists = + - 0 a b c \dots x y z \alpha$
 $\beta \gamma \dots \chi \psi \omega () _1$

Это семь логических (эквивалентность, импликация, конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, кванторы всеобщности и существования) и три математические операции (равенство, сложение, вычитание), расположенные в порядке убывающего слева направо ранга, индивидуальный объект 0 (нуль), 26 курсивных букв латинского и 24 строчные буквы греческого алфавита, левая и правая скобки, наконец символ $_1$, снабжая которым переменные $a, b, c, \dots$, можно получить потенциально бесконечное множество новых переменных $a_1 a_{||} a_{|||} a_{||||} \dots b_1 b_{||} b_{|||} \dots$, а строчные греческие буквы используются для обозначения только функций.

Система G, посредством которой осуществляется переход от логико-математического формализма, точнее исчисления предикатов, к формальной математике, содержит следующие семь аксиом:

$$M_1 \quad a = b \supset (a = c \supset b = c)$$

$$M_2 \quad a = b \supset a + c = b + c$$

$$M_3 \quad a = b \supset c + a = c + b$$

$$M_4 \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$M_5 \quad a + 0 = a$$

$$M_6 \quad a - a = 0$$

$$M_7 \quad a + b = b + a$$

Содержательный смысл аксиом достаточно ясен. Аксиомы M_1 – M_4 фиксируют свойства равенства и сложения, M_5 – уникальное свойство нуля, состоящее в том, что прибавление нуля к любому a не меняет a , M_6 вводит операцию “–” и объект $-a$, противоположный a в смысле равенства их суммы нулю, M_7 – коммутативный закон сложения. Таким образом, постулаты исчисления предикатов (не приведенные здесь, см [там же, гл. 1]) вместе с семью математическими аксиомами для операций равенства, сложения, вычитания объектов a, b, c и нуля образуют логико-математическую аксиоматику системы AG.

Но в чем, спрашивается, преимущество этой системы перед другими формальными системами и что следует понимать под бесконечным множеством объектов $a, b, c, \dots$? В отличие от сис-

тем, имеющих единственную интерпретацию на множестве натуральных чисел, формальная система AG допускает большое количество интерпретаций как числовой, так и нечисловой, теоретико-групповой природы. В числовых интерпретациях системы AG множествами объектов $a, b, c, \dots$ могут быть:

- а) все целые числа
- б) все рациональные числа
- в) все действительные числа
- г) все комплексные числа

Если в аксиомах M_1-M_6 символы $+$, $-$, 0 заменить соответственно через символы $\cdot$, $^{-1}$, 1 или, что в принципе то же самое, толковать $+$ как умножение, $-a$ как обозначение обратного a элемента, то есть деления единицы на a , 0 как единицу, то бесконечными множествами объектов системы G могут быть:

- д) положительные рациональные числа
- е) рациональные числа, *не равные нулю*
- ж) положительные действительные числа
- з) действительные числа, *отличные от нуля*
- и) множество *не равных нулю* комплексных чисел

Содержательных интерпретаций, как видим, много, но главное здесь не их количество и многообразие, а то, что среди этого многообразия есть интерпретация (г) на множестве всех комплексных чисел, то есть на множестве всех чисел, если учесть, что действительные числа, частным случаем которых являются натуральные, есть частный случай комплексных чисел. Отметим, что система аксиом M_1-M_7 с операциями $\cdot$, $^{-1}$ и индивидуальным объектом 1 (в их обычных значениях) имеет интерпретацию (и) на множестве всех комплексных чисел, но только *без нуля*. А пытаться строить универсальную систему без нуля нельзя, поскольку это уникальная и незаменимая математическая величина, фундаментальная математическая константа.

Поскольку мы добиваемся формальной системы, имеющей в виду всё без исключения множество чисел, то выбор однозначно падает на операции сложения, вычитания и константу 0 , а не на умножение, деление и 1 . Можно теперь уже говорить об универсальной логико-математической системе, аксиоматически опре-

деляющей математическое число вообще, континуум всех чисел без каких-либо упущений и лакун. Важно также, что наряду со множеством исходных объектов система AG задает полный набор первичных логических и математических операций, через которые по идее могут быть выражены все остальные. На этом пути нас ждут интересные результаты, в частности при попытке получения провалившихся в конкурсе на роль исходных элементов системы операций умножения, деления и единицы.

Нетрудно заметить, что в списке базисных компонентов нет ни одного числа за исключением нуля; посредством семи аксиом М полностью, хотя и неявно, определено понятие математического числа, но конкретные числа как таковые пока отсутствуют. Не определены еще единица и вторичные операции умножения и деления. Это важнейшая задача, которая в рамках системы AG должна быть решена как прямое, логически и онтологически необходимое продолжение первых двух этапов. Необходимо прежде всего осуществить переход от аксиоматически задаваемых основных свойств числа к конкретным числам. *Какие именно числа должны следовать за нулем в формальной иерархии математических величин, являющейся естественным продолжением и необходимым следствием принятой системы универсальной математики? Каковы правила – законы, устанавливающие соответствие между составленными из переменных и постоянных величин множествами, иначе говоря, каковы исходные, материнские функции, посредством которых строятся остальные функции?*

Функциональные уравнения Е

Вопрос в том, как решить поставленную задачу, не прибегая к искусственным приемам, как, оставаясь в рамках исходного формального базиса системы AG, ввести в нее конкретные числа? Поставим проблему несколько иначе и спросим, чего в первую очередь недостает пока системе AG, какие глубинные внутренние потенции системы еще не востребованы и не раскрыты? В неявной форме ответ частично содержится в предыдущем разделе, когда обсуждались различные интерпретации системы AG. Там наряду с интерпретацией на множестве всех чисел, с пониманием

трех символов формального языка как сложения, вычитания и нуля была и интерпретация системы AG также на множестве всех чисел (только без нуля) и при толковании тех же символов как умножения, обратного элемента (деления единицы на a) и единицы. Приняв тогда единственно возможное решение, мы вместе с тем как бы приняли на себя обязательство непременно выразить отодвинутые "по конкурсу" на второй план операции $\cdot$, $^{-1}$ и число 1 через исходные операции $+$, $-$ и число 0. Впрочем, и так ясно, что без умножения, деления и свойств единицы говорить о теории чисел и вообще о математике не приходится, и так или иначе они должны быть как-то определены. Отметим, что задача корректного введения арифметических действий стоит и перед любой достаточно богатой системой формальной арифметики. В случае формальной системы универсальной числовой математики задача введения недостающих пока арифметических действий, а также ничуть не менее важная задача *получения первичных чисел и исходных функций* фактически сводятся, как сейчас увидим, к решению соответствующим образом составленной системы функциональных уравнений.

Предварительно условимся о терминологии. Любое математическое равенство назовем, как иногда делается, *законом сохранения*, желая тем самым подчеркнуть, что в равенстве двух частей математической формулы (предложения) содержится глубокая идея постоянства математического закона, неизменяемости аналитических связей и в некоторых случаях идея сохранения каких-то величин. Равенство, содержащее только постоянные величины, назовем *соотношением*, равенство с переменными — *уравнением*, а равенство, где в качестве искомой величины выступает функция, — *функциональным уравнением*. Введение новых математических реалий редукцией их посредством функциональных уравнений к исходным элементам это могучее средство, общий метод развертывания формальной системы, дополняющий функциональными свойствами задаваемые аксиомами свойства числа. В сущности, это неявное определение новых элементов, раскрывающее изначально заложенный в системе потенциал. Функциональные уравнения это простейший и самый верный путь к редукции операций умножения и деления к сложению и вычи-

танию; здесь достаточно ограничиться умножением и сложением, поскольку остальное уже тривиально.

Итак, обозначив новую операцию умножения точкой $\cdot$, которую во многих случаях можно опустить, мы хотим с помощью *простейших функциональных уравнений* определить, или в некотором смысле свести, умножение к сложению, и сейчас требуется составить соответствующие уравнения. Для двух числовых выражений $x + y$ и $x \cdot y$, а следовательно четырех функциональных выражений

$$f(x+y), f(x \cdot y), f(x) + f(y), f(x) \cdot f(y)$$

возможны в общей сложности шесть уравнений. Поскольку уравнения

$$f(x+y) = f(x \cdot y), f(x) + f(y) = f(x) \cdot f(y)$$

просто означают отождествление умножения со сложением, а в уравнениях

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y), f(x+y) = f(x) + f(y)$$

нет сведения одной операции к другой, остается всего два функциональных уравнения – так называемые уравнения Коши. Обозначив искомые функции через $\psi(x)$ и $\alpha(x)$, имеем:

$$E_1 \quad \psi(x+y) = \psi(x) \cdot \psi(y)$$

$$E_2 \quad \alpha(x) + \alpha(y) = \alpha(x \cdot y) \quad (x \neq 0, y \neq 0)$$

Функциональные уравнения E_1, E_2 нетрудно обобщить на случай многих переменных:

$$E_{10} \quad \psi(x_1 + x_2 + \dots + x_k) = \psi(x_1) \cdot \psi(x_2) \dots \psi(x_k)$$

$$E_{20} \quad \alpha(x_1) + \dots + \alpha(x_k) = \alpha(x_1 \cdot x_2 \dots x_k)$$

Введем теперь функциональный аналог изначальной математической константы нуль – константу λ , то есть основным свойствам нуля $a \pm 0 = a$, зафиксированным в аксиомах $M_5 - M_6$, придадим функциональный характер. Для этого есть только один путь. В единственной под знаком функции сумме одну из переменных заменим, по аналогии с ± 0 , выражениями $\pm \lambda$ для некоей константы λ , так что

$$E_{3-4} \quad \psi(x \pm \lambda) = \psi(x)$$

что равносильно двум уравнениям:

$$E_3 \quad \psi(x + \lambda) = \psi(x)$$

$$E_4 \quad \psi(x - \lambda) = \psi(x)$$

В более общем случае, учитывающем возможность многократного применения *функционального правила нуля* (периодичности), эти уравнения выглядят так:

$$E_{30} \quad \psi(x + \lambda + \dots + \lambda) = \psi(x)$$

$$E_{40} \quad \psi(x - \lambda - \dots - \lambda) = \psi(x)$$

Договоримся при понимании E_1 – E_4 , или E_{10} – E_{40} как единых, целостных систем уравнений применять обобщенные символы E и E_0 , а полученную к настоящему моменту логико-математическую систему обозначать далее символом AGE.

Отметим для справки, что формальная система AGE, подробно представленная в капитальной, монографии “Фундаментальная теория ЛМФ”, это лишь первые три части пятичленного формализма базисной, фундаментальной теории физического мира ЛМФ, которая основана на идее единства математической логики (Л), числовой математики (М) и фундаментальной физики (Ф). Ее корневая структура начинается с логических атомов и завершается обобщенными физическими законами сохранения, изменения и квантования. Теория изложена в указанной монографии, её сжатый примерно в четыре раза вариант – в книге “От логических атомов к физическим законам”, а в 2010 г. вышла в свет книга “LMP Fundamental Theory” – с учетом новейших экспериментальных данных мюонной физики, соответствующих числовым предсказаниям теории ЛМФ и тем самым подтверждающих ее истинность.

Решение уравнений E_0 . Построение континуума

Подробный и всесторонний анализ [Аракелян 2007; 2007a] уравнений E_{10} – E_{40} в рамках системы AG однозначно приводит к материнским (комплексным) функциям экспоненты $\psi(x) \equiv e^x$ и логарифма $\alpha(x) \equiv \text{Ln } x$, к системе ФМК e , π , i , 2 , связанных известными формулами Эйлера

$$e^{\pi i/2} = i, \quad e^{2\pi i} = i^2 = -1, \quad e^{3\pi i/2} = -i, \quad e^{\pm 2\pi i} = i^2 \cdot i^2 = 1$$

с периодом $\lambda = 2\pi i$.

Посредством ФМК e , π , i , 2 нетрудно построить континуум как упорядоченное множество конкретных чисел. Построить число значит выразить его через известные величины или по крайней мере указать способ, алгоритм сведения к ним. А таковых у нас уже достаточно, и по формулам

$$e^0 = i^2 \cdot i^2 = 1, \quad e^{\pi i/2} = i, \quad e^{\pi i} = i^2 = -1, \dots$$

они образуют единую и самодостаточную систему *прото-чисел* – исходных математических атомов для построения остальных чисел. Следует особо подчеркнуть, что мы имеем не одну, как в концепции первичности натурального ряда, а сразу все четыре математические “единицы”. В геометрической интерпретации они представляются в виде показанных на рисунке точек на осях прямоугольной системы координат, в которой любое число толкуется как точка на плоскости (комплексной). Используя геометрические образы, можно сказать, что всё, на что способна интуиционистская математика в одном, положительном направлении оси OX , здесь делается одновременно (не в физическом, разумеется, смысле, а в смысле равноправия, отсутствия логической очередности) и единообразно во всех четырех возможных направлениях; при этом не возникает проблем с введением, например, отрицательных чисел, с мнимой единицей, с математическими константами и т. д. Само построение множества всех чисел, осуществленное в [Аракелян 1981, 123–129], покажем схематично, не вникая в детали.




Рис. 1

Геометрическая интерпретация математических единиц и образованных из них множеств типа $\{ni^k\}$

Вначале из исходных элементов $0, i, -1, -i, 1$, последовательно применяя схему сложения

$$0, \quad 0 + a \equiv a, \quad a + a \equiv 2a, \quad 2a + a \equiv 3a, \quad 3a + a \equiv 4a, \dots$$

с вполне очевидными сокращенными обозначениями, получим четыре потенциально бесконечных множества типа

$$\{ni^k\} \quad (k = 1, 2, 3, 4)$$

“целочисленных” (по отношению к четырем единицам) чисел с соответствующими условными названиями:

$$\{ni\} \quad 0, \quad i, \quad 2i, \dots, \quad ki, \dots \quad \text{мнимо-}$$

положительные целые числа

$$\{ni^2\} \quad 0, \quad -1, \quad - \quad 2, \dots, \quad - \quad k, \dots \quad \text{целые}$$

отрицательные числа

$$\{ni^3\} \quad 0, \quad -i, \quad -2i, \dots, \quad - \quad ki, \dots \quad \text{мнимо-}$$

отрицательные целые числа

$$\{ni^4\} \quad 0, \quad 1, \quad 2, \dots, \quad k, \dots \quad \text{целые положительные}$$

числа

Два следующих построения для каждого из множеств также вполне очевидны и в принципе ничем не отличаются от обычного построения множества всех положительных действительных чисел, являющегося разновидностью одного из четырех конструируемых здесь множеств. Построения эти сводятся к получению положительных рациональных чисел как отношений между целыми положительными и трех их аналогов – отрицательных, мнимо-положительных и мнимо-отрицательных; затем к получению четырех множеств положительных, отрицательных, мнимоположительных и мнимо-отрицательных иррациональных чисел, образуемых, например, путем составления бесконечных непериодических, в частности двоичных, дробей. В геометрической интерпретации им ставится в соответствие бесконечное множество точек на осях абсцисс и ординат указанной прямоугольной системы координат и остается лишь построить точки комплексной плоскости, проекциями которых считаются точки на осях. Это осуществляется двучленным выражением типа $\pm x \pm iy$, где x и iy в геометрической интерпретации – точки правого верхнего квадранта декартовой системы координат комплексной плоскости. Если устранить это весьма искусственное ограничение и, не ума-

для общности, считать x и y отличными от $\pm i$, все двучлены можно привести к единой знакомой всем форме $z = x + iy$. Разумеется, к геометрическим образам мы прибегли лишь для наглядности, по идее вполне можно обойтись без понятий точки, плоскости, системы координат и т.п. Кроме того, количество шагов, приводящих к комплексным числам, можно сократить, минуя, например, построения “рациональных” чисел или, допустим, генерирование чисел из объектов $0, i, -1, -i, 1$ рассматривать как единое, не расчленяемое, не распадающееся на отдельные процедуры действие. Можно даже при желании построить множество всех чисел из исходных *единиц* унифицировано, минуя все промежуточные звенья. Всё это в конце концов вопросы технического свойства, которые в данной ситуации не столь существенны. Цель обсуждения схемы построения в другом: показать, что система AGE действительно обладает потенциалом, воплощаемым в инструментарий, необходимый и достаточный для получения континуума как множества математических конструкторов, строящихся по определенным правилам из исходных.

Добавим, что хотя содержательные толкования множества комплексных чисел могут быть разными, проточисла как генератор четырех единиц и множество чисел, конструируемых из последних, обладают исключительно важным свойством единственности. Об этом в какой-то мере свидетельствует безальтернативность всех (не показанных здесь) построений, основанных на идее полного исчерпания всех возможных простейших вариантов, а строгое доказательство единственности имеется в содержательной теории. Не углубляясь в детали, скажем только, что применительно к системе AGE единственность следует понимать, во-первых, как отсутствие каких-либо других помимо системы величин $e, \pi, i, 2$ числовых решений исходных функциональных уравнений и отсутствие каких-либо других помимо множества элементов типа $x + iy$ завершенных числовых множеств, соответствующих постулатам системы и конструируемых из атомов $0, \pm i, \pm 1$. Во-вторых, любая попытка обобщения, расширения, дополнения и т.п. множества комплексных чисел возможна лишь ценой отказа от тех или иных исходных положений системы AGE.

Тот факт, что посредством функций ψ и α оказывается возможным не только сведение операций умножения и деления к аксиоматически заданным операциям сложения и вычитания, но и однозначное получение четырех фундаментальных математических констант, неявно определяемых системой уравнений E и E_0 , говорит о совершенно исключительной роли этих функций в математике. Другого унифицированного способа введения в математическую теорию констант e , π , i , 2 как замкнутой, согласованной системы фундаментальных величин не существует.

Проточисла и функции

Не совсем очевидным следствием всех этих рассуждений является вывод, что любая попытка сведения всех математических функций к какому-либо списку исходных функций неизбежно столкнется с проблемой фундаментальных констант, необходимость решения которой столь же неизбежно приведет ко всё тем же экспоненте и логарифму. Поэтому мы еще раз утверждаем, что никаких других функций, способных реально претендовать на базисную роль в математике нет. Любая аналитическая функция, какой бы сложной, неординарной она ни была, посредством математических констант и их комбинаций, операций $+$, $-$, $\cdot$, $:$, $\lim$, суммы слагаемых Σ , произведения сомножителей Π , дифференцирования df/dz , интегрирования, суперпозиции и других операций может быть выражена, по крайней мере в области комплексных чисел, через e^z и $\ln z$. Количество интересующих нас функций практически необозримо, и не только рассмотрение, но даже простое перечисление всех случаев заняло бы слишком много места и едва ли вообще реально. Этого, впрочем, и не требуется — достаточно ограничиться основными элементарными функциями, простые комбинации которых с помощью бесконечных сумм, произведений, суперпозиций и т.д. образуют обширный класс неэлементарных функций.

Простейшими и наиболее полезными в самых различных случаях, не исключая самые сложные, комбинациями экспоненты и проточисел (e - i - 2 -преобразования) являются шесть хорошо известных тригонометрических функций, сокращенно обозначаемых как $\cos z$, $\sin z$, $\operatorname{tg} z$, $\operatorname{ctg} z$, $\sec z$, $\csc z$ (для тангенса и котан-

генса нередко используются и другие обозначения), и столько же аналогичных им и не содержащих мнимой единицы (с-2-преобразования) гиперболических функций. Шесть обратных тригонометрических и шесть обратных гиперболических функций попарно связаны между собой посредством константы i , и все без исключения двенадцать обратных функций выражаются через i и логарифм.

Выражение z^u , возводящее комплексное число z в комплексную степень u , распадается на два частных случая, когда либо основание степени z , либо показатель степени u постоянное комплексное число. Следовательно, *степенная* функция z^a ($z \neq 0$) представляется в виде

$$e^{a \operatorname{Ln} z} = e^{a(\operatorname{Ln} z + k2\pi i)} = e^{a(\operatorname{Ln} |z| + i\varphi + k2\pi i)}$$

и вследствие свойств логарифма однозначна, если $a = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, и многозначна в остальных точках. Для *показательной* функции a^z ($a \neq 0$) также все ясно: $a^z = e^{z \operatorname{Ln} a}$ есть многозначная (из-за $\operatorname{Ln} a$) функция в отличие от экспоненты e^z , областью однозначности которой является вся комплексная плоскость, “разрезанная” вдоль отрицательной части действительной оси. В теории специальных функций, например Γ -функции, нередко встречается произведение показательной функции a^z на степенную z^b , где a и b могут быть различными постоянными величинами. В общем случае

$$a^z z^b = e^{z \operatorname{Ln} a + b \operatorname{Ln} z}$$

для главного же значения логарифма

$$a^z z^b = e^{z \ln a + b \ln z}$$

К этому виду можно привести также любое число за исключением 0, и в определенных случаях именно такая форма представления числа является наиболее удобной и отвечающей существу дела.

Неограниченное количество элементарных функций получается из основных конечным применением операций $+$, $-$, $\cdot$, $:$ и суперпозиции. Снимая ограничения на конечность и допуская тем самым бесконечные ряды и произведения, дифференцирование и интегрирование во всех их разновидностях, бесконечную суперпозицию, то есть допуская операции, связанные с

предельным переходом $\lim$, получим почти необозримый класс неэлементарных функций, по-прежнему выражаемых через e^z , $\ln z$, но уже посредством и предельных операций. Желающие могут заглянуть в энциклопедии и специальные справочники или в справочную часть известной программы "Mathematica 7" и убедиться как в существовании множества различных связей между отдельными функциями, так и в их сводимости к исходным ψ и α . Завершая обсуждение функций, следует непременно добавить (это обстоятельство является крайне важным, возможно даже решающим), что произвольная математическая функция может быть представлена, притом единственным образом, в виде конечного, а чаще бесконечного e - i -2-преобразования, то есть тригонометрического ряда, частный случай которого – ряды Фурье. Окончательного доказательства нет, но для очень широкого класса функций это доказано, см. [Зигмунд].

Уравнение суперпозиции

Считая аксиоматически заданный 0 константой наивысшего, условно нулевого, ранга, мы должны считать константами *первого ранга* связанные с нулем, функциями ψ и α и составляющие замкнутую числовую систему проточисла. Сюда можно добавить постоянную Эйлера, которая элементарной комбинацией проточисел не является и в получении которой используется по сути логико-математический, выражаемый в аксиоматике через не только математические операции, но и логические кванторы, принцип бесконечного предельного перехода. А комбинациям вроде e^π , e^{γ} , 2π , $\pi/2$, $\pi^2/4$, $\ln 2$, $\sqrt{2}$ и даже более сложным комбинациям отводится в этой иерархии место констант *второго ранга*.

В свете сказанного неизбежно встает вопрос об общем количестве констант первого ранга, который мы поставим в такой форме: все ли начальные потенции системы AGE задействованы для получения фундаментальных математических констант и нет ли каких-то других, не использованных еще возможностей? Способ введения проточисел, а также знакомство со спецификой постоянной Эйлера имеют решающее значение для понимания этого вопроса и позволяют подойти к ответу на него с самых

общих позиций. Анализ ситуации под таким углом зрения показывает, что неиспользованным пока остается конструктивный принцип суперпозиции функций, и можно по крайней мере допустить, что неэлементарное, выражающееся через операцию $\lim$ действие этого принципа может привести к чему-то принципиально новому, необычному. Далее отметим, что система функциональных уравнений $E_1 - E_4$ содержит все основные виды сохранения (инвариантность аналитической формы связи, инвариантность величины по отношению к преобразованию, наличие в преобразовании числовых констант) за исключением лишь одного — независимости числового решения от выбора переменных преобразования. Сводя воедино оба начала — бесконечную суперпозицию и не зависящую от переменных преобразования константу, придем к следующему функциональному уравнению:

$$E_5 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S(S(\dots S(x)\dots)) = \text{const}$$

Символом S здесь обозначена неизвестная еще функция или, быть может, функции, бесконечная суперпозиция которой (которых) должна по идее привести к гипотетической и не равной другим константе (константам); x означает произвольно взятое число.

Предполагая существование обратной S функции $\text{arg } S$, рассматривая выражение во внешних скобках как функцию-переменную и опираясь на очевидное свойство операции предельного перехода $\lim_{n \rightarrow \infty} = \lim_{n-1 \rightarrow \infty}$ можно свести всё к системе двух уравнений для прямой и обратной функций, которую представим в виде двойного равенства

$$E_{51} \quad S(x) = \text{arg } S(x) = x$$

содержащего константу(ы) суперпозиции уже неявно, в качестве числового решения системы уравнений. Решение ищем в *простейших элементарных функциях*, понимая под этим все известные элементарные функции математики исключая, однако, их комбинации, получаемые применением арифметических действий и суперпозиции. Существует три десятка таких функций, необходимые сведения о которых содержатся в учебниках по математике и справочниках по элементарным функциям. С целью

их тестирования на предмет соответствия фундаментальному уравнению E_5 сформулируем по убывающей степени общности естественные требования, предъявляемые к искомой функции (или функциям).

а) Уравнение E_5 имеет место для всех действительных и мнимых чисел

б) Графики функций $f(x)$, $f^{-1}(x)$ и $y = x$ имеют общую точку пересечения, в которой выполняется соотношение E_{51} , то есть равенство значений функции, обратной функции и аргумента

в) Функции $f(x)$, $f^{-1}(x)$ и $y = x$ пересекаются лишь в одной точке

г) Эта точка отлична от 0 и 1

Всем этим требованиям [Аракелян 2007, 105–112; 2007а, 88–93] удовлетворяют лишь функции: a^x и $\cos x$. Учтем теперь, что уравнение суперпозиции E_5 , рассматриваемое отдельно от остальных лишь по практическим соображениям, является неотъемлемой частью системы уравнений E_1 – E_5 . А последняя представляет собой единую систему функциональных уравнений с единым решением в найденных уже функциях $\psi(x)$, $\alpha(x)$ и в константах, из которых неизвестны пока лишь константы суперпозиции. Отсюда следует, что показательная функция может быть только экспонентой: $a^x = e^{-x}$.

Таким образом, решение уравнения E_5 в элементарных функциях действительной переменной приводит к следующим функциям и константам ш (первая буква армянского алфавита, читается “а”) и $W(1)$:

$$\cos x \equiv \frac{\psi(ix) + \psi(-ix)}{2} \equiv \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{ш} = 0,73908\ 51332\dots$$

$$\psi(-x) \equiv e^{-x} \quad W(1) = 0,56714\ 32904\dots$$

Для данной пары функций и констант справедливость предельного отношения E_5 не зависит от выбора начальной, действительной или мнимой, переменной x . А выражаясь языком геометрии, можно сказать, что применением принципа бесконечной суперпозиции ко всем точкам, лежащим на действительной и

мнимой осях, обе оси отображаются в точки 3 или $W(1)$. Тройные точки пересечения ω и $W(1)$ показаны на рисунках; для большей наглядности отдельно приводятся также взятые в более широком интервале графики функций $\cos x = x$ и $y = x$, пересекающиеся в точке ω .




Рис. 2

Константа x_c как тройная точка пересечения кривых $y = \cos x$, $y = \arccos x$ и $y = x$




Рис. 3

Константа x_c как тройная точка пересечения кривых $y = e^{-x}$, $y = -\ln x$ и $y = x$




Рис. 4

Пересечения кривых $y = \cos x$ и $y = x$ в точке x_c

Для функции косинуса из уравнения

$$E_{52} \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\cos \dots \cos(z) \dots) = {}^3$$

имеем

$$E_{53} \cos z = \arccos z = z$$

Аналогично для экспоненты e^{-x} из исходного уравнения

$$E_{54} \lim_{n \rightarrow \infty} \psi^{-1}(\psi^{-1} \dots \psi^{-1}(z) \dots) = W(1)$$

получаем

$$E_{55} e^{-z} = -\text{Ln}(z) = z$$

Трансцендентные уравнения E_{53} и E_{55} , удобные для вычисления констант 3 и $W(1)$, неразрешимы в конечном виде относительно неизвестной x . Стало быть, эти константы, связанные как и должно с функциями ψ , α и проточислами, не являются однако комбинациями последних наподобие e^π или, допустим, $\pi^2/4$. Следовательно, 3 и $W(1)$ имеют равный с π , e , i , 2 , γ статус констант первого ранга.

Займемся вначале константой 3 . Предшествующее изложение подводит к мысли, что в области действительных и мнимых чисел любая математическая константа так или иначе, через те или иные операции обусловлена материнскими операциями ψ и α и что все константы глубоко связаны друг с другом, составляя единую взаимодополняющую систему выделенных математических величин. Вполне поэтому закономерно, что константа 3 ,

определяемая уравнением E_5 через исходную в системе AGE операцию суперпозиции, то есть будто совершенно независимо от принципов, которые положены в основу определения функций ψ , α и проточисел, тем не менее имеет решение непосредственно соотносящееся с теми и другими. Более того, близость по природе, удивительное сходство вторичных аналитических форм, включенность константы 3 в систему фундаментальных констант бросается в глаза, если простейшую комбинацию соотношений для проточисел сравнить с соотношением E_{53} , получаемым из исходного E_5 :

$$\frac{\psi(i\pi) + \psi(-i\pi)}{2} = i \cdot i$$

$$\frac{\psi(i^3) + \psi(-i^3)}{2} = ^3$$

В обоих соотношениях полусумма функциональных слагаемых типа $\psi(x)$, $\psi(-x)$ дает одну из содержащихся под знаком функции констант, другими словами $e^{-2-i\pi}$ -преобразование приводит к $i \cdot i$, а e^{-2-i^3} -преобразование, с заменой π на 3 , приводит к 3 . В обоих соотношениях содержатся только константы, составляющие таким образом семейство взаимосогласованных фундаментальных математических величин. Уравнение E_5 , определяющее фактически константы 3 и $W(1)$, наряду с функцией косинуса

$$S(x) = \frac{\psi(ix) + \psi(-ix)}{2} \quad (x \text{ действительно или мнимо})$$

и материнской функцией $\psi^{-1}(x)$ с самого начала могло быть включено в систему функциональных уравнений E в качестве одного из ее уравнений. Но стоявшие тогда задачи, в частности введение новых операций и построение континуума, не требовали констант γ , 3 и $W(1)$, добавление же уравнения E_5 несколько осложнило бы решение системы из пяти уравнений, и в основном по техническим соображениям мы предпочли заняться суперпозицией позже.

Решая любое из трех уравнений E_{53} (удобнее, конечно, иметь дело с уравнением $\cos x = x$ для действительной переменной x) одним из существующих методов приближенного решения

трансцендентных уравнений, например стандартным методом касательных Ньютона, получим число [Аракелян 1981, 135, 136]

$^3 = 0,73908\ 51332\ 15160\ 64165\ 53120\ 87673\ 87340\ 40134$
 $11758\ 90075\ 74649\ 65680\ 63577\ 32846\ 54883\ 54759$
 $45993\ 76106\ 93176\ 65318\ 49801\ 24664\ 39871\ 63027\ 7149$
 $0\ 36913\ 08420\ 31578\ 04405\ 74620\ 77868\ 85249$
 $023891\ 53928\ 94388\ 45095\ 23480\ 13356\ 12767\ 7223...$

которое по всей видимости трансцендентно, то есть выражается бесконечной непериодической десятичной (или любой другой n -ичной) дробью. Здесь приведены лишь двести знаков десятичного представления константы 3 , а вычислены 100 000, а затем и 6 400 000 ее десятичных знаков [Аракелян 2007b, 2010a]. Заметим также, что есть и другой – общедоступный, “эмпирический” способ получить десятичное приближение числа 3 . Дело в том, что с определенной точностью оно как бы содержится в любом калькуляторе, способном производить операцию $\cos$. Надо лишь наугад набрать число (выражаемое, понятно, в радианах) или, ничего даже не набирая, нажимать раз за разом или держать нажатой кнопку “cos”. Получаемый с доступной для данного калькулятора точностью результат (5) скоро замелькает на экране. Это означает, что предельное значение бесконечной последовательности математических преобразований не зависит от выбора начального действительного и мнимого числа. Другими словами, перед нами уникальный случай глобального числового аттрактора.

О характере приближения к пределу получаемой из E_{52} последовательности чисел можно судить по рисункам.




Рис. 5
 Графики функции $\cos(\cos(\dots\cos(x)\dots))$ для $n = 2, 4, 7$




Рис. 6

Графики функции $\cos(\cos(\dots\cos(x)\dots))$ для $n = 28, 30, 36$

Для мнимой переменной ix это последовательность действительных чисел $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots$ которая с каждым шагом приближается к своему пределу, попеременно принимая большие и меньшие чем 3 значения. Кстати, в теории ЛМФ константа 3 – это тот самый “скрытый параметр”, недостающее звено в семействе математических величин, которое позволяет в [Аракелян 2007; 2007a; 2010] решить, считающуюся ранее “непробиваемой” проблему теоретического определения численных значений некоторых фундаментальных физических постоянных путем их сведения к ФМК.

Что касается второго случая, он несколько своеобразен. Известно, что экспонента e^{-ix} переводит мнимое число в комплексное, поэтому для любого ix уравнение E_{54} приводит к бесконечному упорядоченному множеству типа

$$x_1 + iy_1, x_2 + iy_2, x_3 + iy_3, \dots, x_n + iy_n, \dots$$

Особенность этой последовательности комплексных чисел в том, что с увеличением n варианта y_n стремится к нулю, переменная же x_n , а вместе с ней и вся последовательность $x_n + iy_n$, сходится к пределу $W(1)$. При этом, как и в случае косинуса, переменная x_n приближается к своему пределу колеблясь возле точки сходимости $W(1)$ с постоянно уменьшающейся амплитудой колебаний. Первые двести знаков десятичного представления второй константы суперпозиции таковы:

$$W(1) = 0,567143\ 2904\ 09783\ 87299\ 99686\ 62210\ 35554\ 9753\ 8\ 15787\ 18651\ 25081\ 35131\ 07922\ 30457\ 93086\ 68456$$

71492 95980 35943 76698 47463 56061 34226 84613...

С точностью в n десятичных знаков константа $W(1)$, называемая также *омега-константой*, может быть получена в "Mathematica 7" набором выражения $N[\text{ProductLog}[1], n]$, где вместо n может стоять любое семи- или даже восьмизначное число.

Используемое здесь обозначение не случайно, поскольку речь фактически идет об определенном значении функции Ламберта $W(z)$, или омега-функции, см. [Michon], обычно задаваемой функциональным уравнением

$$z = W(z)e^{W(z)}, \text{ или } W = ze^{-W}$$

Функция $W(z)$, определенная для множества всех чисел z включая 0 и используемая при решении различных трансцендентных уравнений, нашла достаточно широкое применение в чистой математике и за ее пределами – в физике и биологии, в механике жидких сред, при анализе динамических систем, в теории алгоритмов и т.д., см. [Corless *et al.*]. Если $z = 1$, получаем уравнение

$$W(1) = e^{-W(1)}$$

тождественное E_{55} . Таким образом, одно из двух решений уравнения E_5 для действительной и мнимой переменных совпадает с выделенным значением функции $W(z)$, соответствующим простейшему случаю отсутствия множителя z в уравнении (7). В этом смысле число $W(1)$ может считаться первенцем бесконечного семейства чисел $W(z)$. Следует также отметить, что пути, ведущие к константе 0,567143..., весьма различны. В то время как в последнем уравнении экспонента задана с самого начала и задача сводится лишь к нахождению различных значений $W(z)$ в зависимости от значений переменной z , в функциональном уравнении E_5 неизвестными "величинами" наряду с 3 и $W(1)$ являются функции $\cos(z)$ и e^{-z} , причем значения констант суперпозиции от конкретных значений z никак не зависят. Остается добавить, что получение приближенного десятичного значения константы $W(1)$ на калькуляторе ненамного сложнее чем в случае константы 3 . Взяв произвольное число, надо производить над ним одну за другой операции e^x и $1/x$ до тех пор, пока число 0,56714 32904... не появится на дисплее с максимальной для данного калькулятора

точностью. Следовательно, ФМК $W(1)$ это еще и один из двух глобальных числовых аттракторов.

Итоги и перспективы

Характерной особенностью ФМК является неожиданное появление в самых разных разделах чистой и прикладной математики, в самых разных ролях и в самых непредвиденных обстоятельствах. История математики полна таких неожиданностей, притом в отношении всех без исключения фундаментальных констант. В связи с этим любопытно отметить, что уравнение $\cos x = x$, впервые рассмотренное в [Аракелян 1981, 135, 136] в связи с решением проблемы теоретического определения численных значений фундаментальных физических постоянных, в последнее время встречается довольно часто. В этом можно убедиться с помощью Интернета, последовательно задавая например поиск десятичных приближений

0,73908 0,739085 0,7390851 0,73908513 0,739085133

...

числа ³ в поисковых системах Google, Alta Vista, Yahoo, ... Для пяти-четырнадцати верных знаков после запятой количество web-страниц исчисляется обычно сотнями, далее оно убывает и с пятнадцати до ста и более знаков исчисляется десятками, считанными единицами или полным отсутствием ссылок. Конечно, очень часто, особенно для пяти-шести знаков, имеет место простое совпадение каких-то сочетаний цифр с тем или иным десятичным приближением константы. После того как всё случайное будет отброшено, останется более тысячи (!) страниц, где речь уже идет о математическом числе, являющемся решением уравнения для косинуса. Правда, и здесь рассмотрение обычно носит формальный характер и преследует весьма ограниченные, преимущественно иллюстративные цели — при изложении приемов математического исследования, таких как анализ итерационных процессов и методы численного решения (например, метод касательных Ньютона) трансцендентных уравнений, простейшим и характерным примером которых и является данное уравнение. Исследование формальных свойств косинуса, в частности его особых точек, также приводит к “магической” точке 0,739085...

С основаниями математики, а тем более с фундаментальной физикой эти случаи, безусловно, прямо не соотносятся, хотя и здесь можно найти подоплеку. Уравнение $\cos x = x$ относится к числу простейших трансцендентных уравнений, к тому же с единственным, графически легко представимым и не равным 0 или 1 решением, известным еще со второй половины 19-го века [Bertrand; Briot; Heis; Miller].

Всё вроде очень просто, доступно и лежит на поверхности, но лишь глубокий анализ позволяет постичь истинную природу указанного числа как фундаментальной математической константы одного ранга с π . Впрочем, и огромный чистый алмаз может быть принят за любопытный блестящий камешек: если уж говорить о константе π , то вплоть до появления методов решения бесконечных числовых рядов и произведений она рассматривалась лишь как чисто геометрическое отношение длины окружности к диаметру. Широкий выход новой константы за рамки чистой математики практически неотвратим, и вот уже число 0,739085... вместе с уравнением для косинуса появляется наряду с числами Фейгенбаума при анализе процессов перехода от хаоса к упорядоченности, при рассмотрении фракталов – см., например, [Bojar; Руппе], а также [Weisstein] – при решении уравнения Кеплера для предельного случая, когда эксцентриситет эллиптической орбиты равен 1 [AKiTi]. В этом нет ничего удивительного или неожиданного, если принять во внимание исходное уравнение E_5 . Геометрически оно может интерпретироваться как отображение мнимой и действительной осей координат в одну точку, а содержательно истолковано как, допустим, переход от произвольной множественности к вполне определенной количественно иной особенности. Можно поэтому предположить, что новые появления константы ³ в области физических явлений мыслимы при исследовании энтропийных процессов, процессов упорядочивания физических систем, теории хаоса, колебательных процессов, фазовых переходов, фракталов, динамических систем, турбулентности, ...

Наше рассмотрение постоянной суперпозиции косинуса не будет полным без упоминания истории касающейся ее обозначения и названия. Напомним, что число 0,739085... как решение

уравнения типа $f(x) = x$, конкретно уравнений E_{53} , является неподвижной точкой отображения, как решение уравнения суперпозиции E_{52} – глобальным аттрактором, а как одно из решений системы функциональных уравнений E – фундаментальной математической константой. Разумеется аттрактор – нечто большее чем неподвижная точка отображения, но в то же время фундаментальная математическая константа – куда более важный объект, чем аттрактор. Но и в ранге аттрактора, тем более глобального, число заслуживает не только специального обозначения, но и именного названия. О том как это иногда делается (возможно по неведению, но в любом случае с нарушением авторского права) можно судить по выдержке из небольшой статьи, опубликованной в 2007 году в известном американском математическом журнале и случайно обнаруженной нами в интернете в конце 2009 года. “Среди моих друзей, выпускников школы, число *Дотти* было прозвищем единственного действительного корня уравнения $\cos x = x$. Говорят, что Дотти, профессор французского языка, заметила, что какое бы число она не набирала на калькуляторе, последовательное нажатие кнопки COS всякий раз давало на дисплее одно и то же значение 0.739085... . Она спросила своего мужа, профессора математики, почему калькулятор всегда дает только одно значение, независимо от первоначально набранного числа. Он посмотрел, попробовал и сказал, что пока еще не разобрался. На следующий день он понял произошедшее, как и то, что его жена нашла красивый, простой образец глобального аттрактора” [Kaplan].

После этой статьи о числе *Дотти* (*Dottie number*), как о глобальном аттракторе и просто замечательном числе, заговорили многие. Появились упоминания в научной печати, предложение о включении в учебники по математике, отдельная статья в математическом веб-сайте MathWorld [Weisstein], десятичная запись (более ста знаков после запятой) *Dottie number* в онлайн энциклопедии целочисленных последовательностей [Sloane], широкое обсуждение на математических форумах с интригующими названиями [A most mysterious of numbers] и т. п.

Между тем, число 0,739085..., как аттрактор и более того как фундаментальная математическая константа, впервые, как

указано выше, появилось за четверть века до “Dottie number”, в начале 80-ых прошлого столетия [Аракелян 1981]. Названная “постоянной косинуса” или “постоянной суперпозиции косинуса” и обозначенная символом ω эта константа широко использовалась при решении некоторых важнейших проблем физической теории [Аракелян 1981; 1989; 1995; 1997; 2007; 2007a; 2010]. Впрочем, наше авторское право на обозначение и название данного числа, подтвержденное соответствующими доказательствами и подкрепленное обращением руководства Национальной академии наук Армении к журналу “Mathematics Magazine”, никем фактически не оспаривается и уже внесены кое-какие изменения в указанную статью в MathWorld. А раз уж принято не только символически обозначать, но и давать именные названия особо значимым числам, всё похоже говорит в пользу константы Аракеляна, хотя понятно допустимы и другие названия: *постоянная суперпозиции косинуса*, *аттрактор косинуса*, *просто константа ω* и т.п.

Что касается числа $W(1)$, обнаружившего себя в качестве константы суперпозиции экспоненты в ходе очерченного выше исследования, то о его достаточно широком применении в области чистой математике и ее приложений уже говорилось. Напомним только, что *омега-константа* не только одна из фундаментальных математических констант, но один из двух числовых глобальных аттракторов в области элементарных функций.

В числах заключена великая тайна и великая сила, которую человек стал осознавать с незапамятных времен. Не случайно числовая магия возникла задолго до появления математики как науки, оказав на последнюю немалое влияние, особенно в момент ее становления; не случайно и современная наука и “тайное знание” при всём их различии с одинаковым пиететом относятся к числам; пожалуй, только наука о числах (по-разному, конечно, понимаемая) является обязательной, неперменной принадлежностью как фундаментальной науки, так и оккультизма. С высоты сегодняшнего знания кажется вполне очевидным, что в лоне математики и математического естествознания хорошо известные величины – фундаментальные математические константы – приобрели со временем высочайший статус, вселенскую значимость.

Если вообще попытаться хотя бы в грубом приближении, без особых претензий на точность и тем более полноту, буквально в нескольких словах охарактеризовать наиболее характерную содержательную особенность, прикладную роль каждой из восьми фундаментальных математических констант в отдельности, то картина может быть такой:

0	отсутствие данного количества или свойства
π	от прямолинейного к криволинейному
e	быстрое увеличение
i	периодические процессы
2	появление нелинейных связей
γ	переход к интегральным формам
$^3, W(1)$	переход от множественного к единичному

А в более важном в данном контексте системном подходе константы 0, e, π , i, 2 вправе, как было показано выше, считаться началом всех чисел, “первоатомами” числового множества, способными конструировать континуум; что же касается констант γ , $^3, W(1)$ это как бы мостик между единичным (число) и актуальной математической бесконечностью (интеграл, суперпозиция).

ЛИТЕРАТУРА

Аракелян Г.Б. *Фундаментальные безразмерные величины (Их роль и значение для методологии науки)*. Ереван: Изд. АН, 1981

– *Числа и величины в современной физике*. Ереван: Изд. АН, 1989

– *The New Fundamental Constant of Mathematics*. Pan-Armenian Scientific Rev., vol. 3, London, 1995

– *Основания физической теории*. Ереван: Давид, 1997

– *Фундаментальная теория ЛМФ*. Ереван, 2007
www.hrantara.com/Monograph.pdf

– *От логических атомов к физическим законам*. Ереван: “Лусабац”, 2007, www.hrantara.com/Book.pdf

– *Новая фундаментальная математическая константа (с точностью до 100000 знаков после запятой)*, 2007,
<http://www.hrantara.com/NewConstant.pdf>

– *LMP Fundamental Theory*. Yerevan: Sarvard, 2010

– *Новая фундаментальная математическая константа (с точностью до 6 400 000 знаков после запятой)*, 2010,
<http://www.hrantara.com/NewConstant2.pdf>

Зигмунд А. *Тригонометрические ряды*, т. 1–2. М.: Мир, 1965

Клини С. *Математическая логика*. М.: Мир, 1973

A most mysterious of numbers
<http://forums.xkcd.com/viewtopic.php?f=17&t=23066&p=687416>

AKiT Kepler's Equation of Elliptical Motion
<http://www.akit.ca/KeplerEquation.html>

Bertrand J. *Exercise III in Traité d'algèbre, Vols. 1-2, 4th ed.*, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1865, p. 285.

Bojar Ondřej. *Chaos přehledně*
<http://chaospace.hyperlinx.cz/index.php?pgid=230>

- Briot C.M.** *Leons d'algèbre conformes aux programmes officiels de l'enseignement des lycées, 11th ed.*, Paris: Librairie Ch. Delagrave, 1881, 341–343.
- Corless R.M., Gonnet G.H., Hare D.E.G., Jeffrey D.J., and Knuth D.E.** *On the Lambert W Function*. *Advances in Computational Mathematics* **5**, 329–359 (1996)
- Heis E.** *Schlüssel zur Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra, Vol. 2, 3rd ed.*, Cologne, Germany: Verlag der M. DuMont-Schauberg'schen Buchhandlung, 1886, p. 468
- Kaplan S.R.** *The Dottie Number*, *Math. Mag.* **80**, (2007), 73–74
- Michon G.P.** *Final Answers: Numerical Constants*
<http://home.att.net/~numericana/answer/constants.htm#mertens>
- Miller T.H.** *On the Numerical Values of the Roots of the Equation $\cos x = x$* , *Proc. Edinburgh Math. Soc.* **9**, (1890), 80–83
- Rynne B.P.** *F1.4ZJ2 Fractals and Chaos Solutions 7*
<http://www.ma.hw.ac.uk/~bryan/f14zj2/sol7.pdf>
- Sloane N.J.A.** *Sequence A003957*. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences <http://oeis.org/history?seq=A003957>
- Weisstein E. W.** *Fixed Point*. From MathWorld
<http://mathworld.wolfram.com/FixedPoint.html>
- *Dottie Number*, From MathWorld. A Wolfram Web Resource
<http://mathworld.wolfram.com/DottieNumber.html>

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

$u = 0,7390851332\dots$ թիվը երկու համընդհանուր մաթեմատիկական ատտրակտորներից և ութ հիմնարար մաթեմատիկական հաստատուններից մեկն է, որը մյուս յոթ հաստատունների հետ մեկտեղ դուրս է բերվում ֆունկցիոնալ հավասարումների միջոցով՝ համապարփակ մաթեմատիկայի ձևական աքսիոմատիկ համակարգի շրջանակներում: Փաստորեն, հաստատունը մաթեմատիկայի այն թաքնված պարամետրն է, որը հնարավորություն է ընձեռում լուծելու ֆիզիկական տեսության որոշ անհաղթահարելի թվացող թվային պրոբլեմներ: Նրա կիրառման ոլորտը շատ լայն է՝ քառսի տեսություն, դինամիկ և ինքնակառավարվող համակարգեր, տատանողական և էնտրոպիկ գործընթացներ, ֆրակտալներ, փուլային անցումներ, մոլորակների ուղեծրեր, իսկ հեռանկարում՝ նաև բազմաթիվ այլ ոլորտներ: Այն առաջին անգամ 1981 թ. ներկայացվելով որպես հիմնարար մաթեմատիկական հաստատուն և ատտրակտոր՝ հեղինակային իրավունքի համաձայն նշանակվել է հայկական տառով և տարբեր անվանումներով՝ «ա հաստատուն» (ամենապարզ ձևը), «Առաքեյանի հաստատուն» (հեղինակի անունով), «կոսինուսի սուպերպոզիցիայի հաստատուն» (նկատի ունենալով ստացման ոլորտը) և այլն:

SUMMARY

The constant u (the first letter of the Armenian alphabet) is one of two global attractors and one of eight fundamental mathematical constants (FMC). It is obtained, alongside with other seven FMCs, by means of functional equations in the limits of a formal axiomatic system of universal mathematics. Actually, the constant u represents a *hidden parameter* of mathematic, helpful for solution of some “inaccessible” numerical problems of physical theory, as well as theory of chaos, dynamical and self-organizing systems, oscillatory and entropic processes, fractals, phase transitions, turbulence, planetary motion and possibly numerous other problems originating in future. As a FMC and attractor the number $0.739085\dots$ was firstly presented in 1981 in my book, and according to copyright law it is notated by symbol u and named as a “constant u ” – the simplest form, or “Arakelian’s constant” – by author’s name, or “cosine superposition constant” – by functional location and definition.