



Հայաստանի կենսաբ. հանդես, 3 (73), 2021

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ ՄԻ ԶԱՆԻ ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԹՓԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎՆԱՍԱՏՈՒ ԹԵՓՈՒԿԱԹԵՎԵՐԻ (INSECTA, LEPIDOPTERA) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ռ.Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Մ.Ա.ՄԱՐԶԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ի կենդանաբանության ինստիտուտ
harruz@yandex.ru, mmarjanyan@yahoo.com

Ուսումնասիրվել է Երևան քաղաքի գեղազարդ թփերի 4 ցեղերի ներկայացուցիչների (*Berberis* L., *Lonicera* L., *Syringa* L., *Spiraea* L.) վնասատու թեփուկաթևների (Lepidoptera) ֆաունան: Հայտնաբերվել են 27 տեսակի միջատներ, որոնք զգալի վնաս են հասցնում վերոհիշյալ բույսերին: Բերված են համառոտ տեղեկություններ այդ վնասատուների կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Երևան – գեղազարդ թփեր – վնասատուներ – թեփուկաթևներ

Изучена фауна чешуекрылых вредителей представителей 4-х родов (*Berberis* L., *Lonicera* L., *Syringa* L., *Spiraea* L.) декоративных кустарников города Еревана. Обнаружено 27 видов насекомых, которые значительно повреждают вышеупомянутые растения. Приведены краткие сведения о биоэкологических особенностях этих вредителей.

Ереван – декоративные кустарники – вредители – чешуекрылые

The fauna of pest lepidoptera of 4 genus (*Berberis* L., *Lonicera* L., *Syringa* L., *Spiraea* L.) of ornamental shrubs of Yerevan is studied. 27 species of insects which harm these plants were found. The short information about bioecological features of these vermins is presented.

Yerevan – ornamental shrubs – vermins – Lepidoprera

Բնակավայրերի կանաչապատման ժամանակ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում բարձր գեղազարդությամբ, կլիմայակարգավորիչ, փոշեհավաք, աղմկապաշտպան, բարձր հարմարվողականությամբ, ֆիտոնցիդ և այլ հատկություններով օժտված ծառաթփատեսակներին: Գեղազարդ թփերի արագ աճն ու երկարակեցությունը, ինչպես նաև հատուկ խնամքի պահանջի բացակայությունը պայմանավորում են դրանց կիրառումը կանաչ շինարարությունում:

Երևան քաղաքի կանաչապատման ոլորտում թե՛ անցյալում, թե՛ ներկայում եղել և մնում են բազմաթիվ խնդիրներ և բացթողումներ: Համաձայն վերջին ուսումնասիրությունների՝ ներկայումս մայրաքաղաքում աճում են ավելի քան 170 տեսակի ծառեր և թփեր: Հարկ է նշել, որ քաղաքի կանաչ զանգվածում գերակշռում են անցյալ դարի 60-ական թվականներին տնկված ծառաթփատեսակներ, որոնք ծերացած են և վաղուց կորցրել են սաղարթի ամբողջականությունն ու գեղազարդությունը [1, 5]:

Այս բույսերի պահպանման և վերարտադրության համար անհրաժեշտ է ճիշտ և ժամանակին կատարել ագրոտեխնիկական միջոցառումներ, պայքարել դրանց վնասատուների և հիվանդությունների դեմ:

Երևանի և հանրապետության մի շարք քաղաքների գեղազարդ տնկարկների վնասատուների և հիվանդությունների ուսումնասիրմանը նվիրված բազմաթիվ հետազոտություններ են կատարվել 1960-90-ական թվականներին [2, 3, 8], որոնց արդյունքում արձանագրվել են ավելի քան 800 տեսակի վնասատուներ (նեմատոդներ, տզեր, միջատներ): Սակայն վերջին տարիներին նմանատիպ ուսումնասիրությունները խիստ սակավաթիվ են [4, 7]: Անցած ժամանակահատվածում զգալիորեն փոխվել է քաղաքների ու գեղազարդ տնկարկների պատկերը (տեսակաշարը, տարիքը), ու դրան զուգահեռ ձևավորվել է յուրահատուկ էնտոմոֆաունա:

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Երևանի գեղազարդ թփերի առավել տարածված 4 ցեղերի ներկայացուցիչների վնասակար թեփուկաթևերի (թիթեռների) ֆաունան, ուսումնասիրել կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները:

Նյութ և մեթոդ: Ուսումնասիրությունները կատարվել են 2015-20 թթ. Երևանի բուսաբանական այգում, քաղաքի պուրակներում և զբոսայգիներում: Աշխատանքում օգտագործվել են միջատաբանական հետազոտություններում ընդունված մեթոդներ [9], այդ թվում՝ հավաքներ միջատաբանական ցանցով, էքզաուստերով: Նախահասուն փուլերի ճոխստիարակումը իրականացվել է լաբորատոր պայմաններում:

Թիթեռների տեսակային պատկանելության որոշումը կատարվել է մի շարք որոշիչների [6, 10] և ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ի կենդանաբանության ինստիտուտի միջատաբանական հավաքածուի նյութերով:

Արդյունքներ և քննարկում: Ստորև ներկայացված են համառոտ տվյալներ Երևանի պուրակներում և զբոսայգիներում տարածված գեղազարդ թփատեսակների 4 ցեղերի ներկայացուցիչների վերաբերյալ [1]:

Կծիխուր սովորականը (*Berberis vulgaris* L., ընտանիք Berberidaceae) մինչև 1,5 մ բարձրությամբ տերևաթափ թուփ է: Երաշտադիմացկուն, ցրտադիմացկուն, սովորապես, հողի նկատմամբ պահանջկոտ չէ: Գեղազարդ է տերևներով (դեղնականաչ՝ վաղ գարնանը, նարնջակարմիր՝ աշնանը), դեղին ծաղիկներով և վառ կարմիր պտուղներով:

Ցախակեռասների (*Lonicera* L., ընտանիք Loniceraceae) ավելի քան 200 տեսակներից Հայաստանում աճում են 4 տեղական և 29 ներմուծված տեսակներ: Լուսասեր են, հողի նկատմամբ բավականին պահանջկոտ, դիմացկուն են զազի և ծխի նկատմամբ: Գեղազարդ են գունավոր հատապտուղներով և հոտավետ ծաղիկներով:

Հայտնի է եղրևանու (*Syringa* L., ընտանիք Oleaceae) մոտ 30 տեսակ, որոնցից Հայաստանում տարածված են 2-ը՝ սովորական (*S. vulgaris* L.) և պարսկական (*S. persica* L.): Սովորական եղրևանու ավելի քան 350 սորտերն աչքի են ընկնում ծաղիկների ամենատարբեր գունավորմամբ, լիաթերթիկությամբ, ծաղկման ժամկետներով և տևողությամբ:

Ասպիրանների (*Spiraea* L., ընտանիք Rosaceae) ցեղն ընդգրկում է շուրջ 100 տեսակների տերևաթափ թփեր, որոնցից Երևանի բուսաբանական այգու հավաքածուում ներկայացված են 22-ը. ցրտադիմացկուն են, չորադիմացկուն, պահանջկոտ չեն հողի նկատմամբ:

Աղ.1-ում ներկայացված են վերոհիշյալ թփատեսակների հիմնական վնասատուները:

Արձանագրված 27 տեսակի թեփուկաթևերը, ըստ ընտանիքների, ներկայացված են հետևյալ կերպ՝ Nepticulidae-1, Gracillariidae-2, Alucitidae-1, Ypsolophidae-1, Cossidae-1, Carposinidae-1, Tortricidae-10, Geometridae-2, Lasiocampidae-3, Sphingidae-1, Saturniidae-1, Erebidae-1, Noctuidae-2: Զանազան առումով առավել շատ տեսակներով (10) ներկայացված է տերևույրների Tortricidae ընտանիքը: Ըստ կերային մասնագիտացման՝ պոլիֆագ են 20, ստենոֆագ՝ 7 տեսակներ:

Աղյուսակ 1

Թփառնատվների վնասատու թռչունկաթների ֆաունան

Բույսի անվանումը	Վնասատու թռչունկաթնի անվանումը	Միջատի վնասող փուլը և բնույթը
1	2	3
<i>Berberis vulgaris</i> L.	<i>Lobesia botrana</i> Den.et Shiff.	Թռչունկերը ներթափանցում են կոկոնների մեջ, անիւն, սպառ մետաքսաթելերով միացնելով մի բանի կոկոններ՝ ձևավորում են բներ
	<i>Archips rosana</i> L.	Երկատարայ թռչունկերը ներթափանցում են բաղբջների և կոկոնների մեջ, կմակաբացում կամ ծավառում են տերևները, պտավաթելթիկները: Մեծ հատակի թռչունկերն սպառւմ են խաղախիսննդի որսիւծ տերևների ներսում, վնասում են նուև պտաղները
	<i>Carposina berberidella</i> H.-S.	Թռչունկերը անիւնում են հատա հացաղ պտաղներով
	<i>Malacosoma parallela</i> Stgr.	Թռչունկերը ճյուղերի անկյուններում մետաքսաթելերով բներ են կառաւում և անիւն թաղթջներով ու տերևներով: Հանգիւծալիւն թաղնուցմուն դեպքում լքել տերևազկերում են բաղբ
	<i>Ypsolopha lonicerella</i> Stökl.	Երկատարայ թռչունկերը անիւնում են տերևները, սպառ սաղքում են մետաքսաթելերով լքաղ միացրած 2 տերևների միջև
<i>Lonicera</i> L.	<i>Phyllonorycter emberizaepinella</i> Beche.	Թռչունկերն անիւնում են տերևների տաղիւն մակերևաղ
	<i>Eupoecilia ambiguella</i> Hb.	Թռչունկերը վնասում են կոկոնները, ծաղիկները և պտաղները՝ մետաքսաթելերով վաղթաթելով ձևավորում են բներ
	<i>Archips rosana</i> L.	Տե՛ն <i>B. vulgaris</i> -ի վնասատաղ ներքի պառնաղում
	<i>A. xylostenia</i> L.	Թռչունկերը կմակաբացում են երկատարայ տերևները, կոկոններն ու ծաղիկները, սպառ տերևները խաղախիսննդի որսում են գլխաղեր ջղի լաղնաթաղ, արև մեջ սաղքում և հաղնաղակաղբում են
	<i>Pteropteryx dodecadactyla</i> Hb.	Թռչունկերը ձևավորում են ցաղաղաղիւն գլխաղներ
	<i>Carposina berberidella</i> H.-S.	Տե՛ն <i>B. vulgaris</i> -ի վնասատաղ ներքի պառնաղում
	<i>Neoris huttoni</i> Moore.	Թռչունկերը անիւնում են տերևներով՝ թաղներով մաղն կաղաղները
	<i>Lymantria dispar</i> L.	Թռչունկերը անիւնում են բաղբջներով, տերևներով և կոկոններով: Հանգիւծալիւն թաղնուցմուն դեպքում լքաղն ունաղնում են տաղաղթը

Աղյուսակ 1 (շարունակություն)

1	2	3
<i>Syringa vulgaris</i> L.	<i>Gracillaria syringella</i> F.	Թյառքներն ակամամբ և խաղախառն են տերևները
	<i>Zenecera pyrina</i> L.	Թյառքներն անոթներ են բացում ընծաղների, հյուսիսի, ինչպես նաև ելվառասպալ լայնի զարմանում
	<i>Archips rosana</i> L.	Տես <i>B. vulgaris</i> -ի վնասատուների պահանջներ
	<i>Adoxophyes orona</i> Fish.v. Rosl.	Թյառքները վնասում են բույսերին, սպառում տերևները՝ դրանք խաղախառն լայնի և մետաքսաթելալ լայնի միջև
	<i>Choristoneura diversana</i> Hb.	Կենսակյանը նման է <i>Adoxophyes orona</i> -ին, թյառքներն սպառում և սնվում են գազարթույն ընծաղների վրա գտնվող խաղախառն և լայնի տերևներում
	<i>Pandemis heparana</i> Den.et Shiff.	Թյառքները վնասում են բույսերին, կոկոնները, ծաղկաբույսերը՝ մետաքսաթելալ լայնի միջև
	<i>Malacosoma neustria</i> L.	Կենսակյանը նման է <i>Malacosoma paralela</i> -ին
	<i>Sphinx ligustri</i> L.	Թյառքները կոկոնացնում են տերևները
	<i>Amphipyra berbera</i> Rungs.	Թյառքները վնասում են բույսերին, տերևները սպառում և սպառում
	<i>A. pyramidea</i> L.	Կենսակյանը նման է <i>Amphipyra berbera</i> -ին
	<i>Stigmella aurella</i> F.	Թյառքներն ակամամբ են տերևների տալիս մակերեսը
	<i>Archips rosana</i> L.	Տես <i>B. vulgaris</i> -ի վնասատուների պահանջներ
	<i>Acleris aspersana</i> Hb.	Թյառքներն սպառում են խոնավ տերևների սպառում
	<i>Celypha siderana</i> Treitschke	Կենսակյանը նման է <i>Acleris aspersana</i> -ին
<i>Spirea</i> L.	<i>Clepsia spectrana</i> Tr.	Թյառքները սնվում են բույսերին, կոկոնները, ծաղկները
	<i>Biston betularia</i> L.	Թյառքները կոկոնացնում են տերևները
	<i>Eupithecia satyrata</i> Hb.	Թյառքները վնասում են ծաղկները
	<i>Lastocampa quercus</i> L.	Կենսակյանը նման է <i>Malacosoma paralela</i> -ին

Ըստ բույսերի օրգաններին հասցրած վնասի՝ Նշված տեսակները բաշխված են հետևյալ կերպ. բողբոջների և տերևների՝ 20, ընձյուղների, ճյուղերի և ցողունի՝ 2, կոկոնների, ծաղիկների և պտուղների վնասատուներ՝ 11: Տեսակների քանակով գերակշռում են տերևակերները (ֆիլլոֆագերը), որոնց ներկայացուցիչները զանգվածային բազմացման տարիներին զգալի վնաս են հասցնում թփատեսակներին: Այս խմբում առավել վտանգավոր են *Zeuzera pyrina* L., *Archips rosana* L., *Biston betularia* L., *Malacosoma parallela* Stgr., *M. neustria* L., *Lasiocampa quercus* L. տեսակները: Վնասատու թեփուկաթևների ամենաշատ տեսակներ արձանագրվել են *Syringa vulgaris*-ի վրա (10):

Ներկայացված տվյալները կարող են ուղեցույց հանդիսանալ քաղաքի կանաչապատման և բույսերի պաշտպանության աշխատանքների կազմակերպման գործընթացում:

Երևանի և հանրապետության մի շարք քաղաքների գեղազարդ տնկարկների վնասատուների վերաբերյալ հոդվածում ներկայացված տվյալները նախնական բնույթ են կրում, աշխատանքներն այդ ուղղությամբ շարունակվում են:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վարդանյան Ժ.Հ., Գալստյան Գ.Ս., Գրիգորյան Ս.Ս., Փայտյան Յու.Ե. Գեղազարդ ծառեր ու թփեր կանաչապատման համար, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 361 էջ, 2015:
2. Арутюнян Г.А. Вредная энтомофауна ботанических садов Армении, Бюлл. Бот. Сада АН АрмССР, 25, с. 99 -107, 1979.
3. Арутюнян Г.А. Влияние вредной энтомофауны на декоративность зеленых насаждений г.Еревана, Бюлл. Бот. сада АН АрмССР, 26, с. 141-151, 1985.
4. Арутюнян Р.Г., Алексанян А.С., Арутюнян Г.А. Вредная энтомофауна кизильника (*Cotoneaster Medic.*), Материалы XVI международной конференции “Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России”, Назрань, с. 20-22, 2014.
5. Варданян Ж.А., Ктракян С.А. Эколого-биологические аспекты оптимального сочетания аборигенных и интродуцированных древесных растений применяемых в озеленении г.Еревана, Доклады НАН РА, 4, 119, с. 345-351, 2019.
6. Гусев В.И.Определитель повреждений деревьев и кустарников, применяемых в зеленом строительстве, Москва, Агропромиздат, 239 с., 1990.
7. Калашян М.Ю., Марджанян М.А., Оганесян В.С., Арутюнова Л.Дж., Хачатрян А.Г., Арутюнян Р.Г., Мирумян Л.С., Карагян Г.А., Магомедова М.З., Креджян Т.Л., Аветисян А.А., Акопян Н.Х. Предварительные данные по фауне беспозвоночных животных городского ландшафта(Mollusca, Insecta),Материалы XXI международной конференции “Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России”, Магас, с. 333-335, 2019.
8. Мирзоян С.А. Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении, Ереван, “Айастан”, 453 с., 1977.
9. Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых. Воронеж, 191с., 1970.
10. Синев С.Ю. Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России, СПб.-М., КМК, 424с., 2008.

Ստացվել է 25.05.2021