

սկիսութիւն ճոխերուն առջեւ ալ, որ չընա-  
ղակերտ պայտանիքու ջերմութեան մէջ փա-  
փուկ իւրորտիներով պարարուած և ոչ իրենց  
սեղանոյն նշխարաց խեղճերանքներով կ'ուզեն  
որ Ղազարոսներ յաղենան:

Այս օրերուս մէջ ընդունուած նմանի մը  
կ'ըսէ, որ զեռ սասանութիւնը բոլորովին չեն  
զաղորած, բայց առաջուան սաստկութիւնը և  
աւերածը չկայ: Այլապէս ինչո՞ւ հիւանդու-  
թեանց հետեւութիւնը աննկարագրելի են:

Հ. Յ. Գ.



## ՏԱՐԿԻՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

### DARWINISME

(Շար. տես էջ 107)

ՁԻՐԻՆՈՐ ԻՐԱՎԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ<sup>1</sup>. — Աշխարհագրական բաշ-  
խումբ. — Երկրագնդի մակերևութին վրայ բաշխու-  
ման և կենդանիներու բաշխումն և առաջին իրադրութիւնն՝  
որ Տարբերութիւնը ուղեւորութիւններուն առնել, ածու-  
րածութիւնը գրաւեց. — Հարաւային Ամերի-  
կայի մէջ, բոլորեալ ալ կենդանիներն կը յաշտուեն ի-  
րարու փաղաք մը՝ քանի կ'իջնեն լայնութեան աստի-  
ւաններէն, — երկրէ մը անցնելով մերձաւոր երկրի, կը  
անանկ՝ որ մերձաւոր տեսակներն՝ աստիւծաբար ան-  
ցեր են ուրիշ տեսակներուն տակ: — Ընդարձակ ցա-  
մաքը չընկալաւով կղզիներուն և աղիկակազմութեան  
մէջ կայ անոնց յատուկ սեփական բազմութիւն մը կեն-  
դանիներու և բոյսերու: Այսու համարէն, սերտ նմա-  
նութիւն մը կայ կղզիներու տեսակներուն և ամենէն  
մերձաւոր ցամաքի տեսակներուն մէջ: — Նմանութիւնը  
զեռ աւելի սերտ և ի մէջ աղբի կենդանիներն՝ որոնք  
ցամաքի և կղզիներու վրայ կը գտնուին, և բոլորով  
կենդանիներու՝ որոնք նոյն հողի վրայ եղբւր են ժամա-

նակաւ: — Հին և նոր աշխարհի բոյսերն ու կենդա-  
նիներն իրարմ շատ տարբեր են, լինելու և անոնց  
կենսաբանական զինակներն հաւասար եղած են: —  
Արապիկ, մի և նոյն լայնութեան սաստիճանին և մի և  
նոյն կլիմայի տակ՝ հարաւային Ամերիկայի, Հարա-  
ւային Ամերիկայի և Աւստրալիոյ կենդանի եակներն՝  
շատ կը տարբերին իրարմ. իսկ ընդհանրապէս, հա-  
րաւային Ամերիկայի մէջ, լայնութեան զանազան ա-  
տիւաններուն և ալիւսայ կլիմաներու տակ, անհամե-  
մատ կերպով իրարու մօտ են կենդանի եակներն: —  
Աւստրալիոյ պարկուտներէ (marsupiaux) կազմուած  
սանաւոր կենդանին, մեծապէս կը տարբերի ուրիշ աշ-  
խարհներուն մէջ եղածէն: Բայց այս կենդանին՝ վերջին  
սաստիճան և նոյն խմբին մէջ գտնուած տեսակներն  
շարքին, որոնք մի և նոյն աշխարհի մէջ իրարու յա-  
ջորդեր են, և որոնք ձեռքով վերսրիշեալ կենդանին  
կը միմայի բարձր տեսակներուն՝ զօր երկրաբանու-  
թիւնը կը գտնէ ուրիշ աշխարհներու մէջ ալ:

Այս իրադրութիւններուն զօրութեամբ պարզ կերպով  
զեռի լուծուէր խնդիրը՝ ըսելով թէ իրեն պայտե-  
կաբարդուէր են, վասն զի Աստուած պայտե ուզեր  
է, և տեսակները հան ստեղծեր է ուր որ զանոնք կը  
տեսնենք, և թէ անանցանելի արգելքներով իրարմ  
բաժնուած երկրներու մէջ գտնուող տեսակներու ստեղ-  
ծագործութեան բազմութիւն կերպները քան:

— Միեւնոյ գիտութիւնը, որ, առանց աստիւծ պատա-  
ռը ուրանալու, կը փնտռէ և կը քննէ երկրորդ պատ-  
ճառները, փնտրելով որ արդի աշխարհագրական բաշ-  
խումբներն առաջ կ'անեն են ֆիզիկական յետափոխու-  
թիւններ (perturbation), և թէ տեսական տեսակներ  
ստեղծ ինչ աշխարհագրական բաշխումներուն հետ, կը  
համարի թէ բոլորեալ և կենդանիներու արդի բաշխումն  
ալ նախին զինով մ'առաջ կ'անուէ է<sup>2</sup>: — Մէկ երկրէ  
միւս երկրը անցած ասան իրարու յաշտուող մերձա-  
ւոր տեսակներն կամ՝ ձեռքին միմէն միակ նախնական  
ձեռն տակ կ'ան զանազանութիւն չեն: — Կղզիներէն  
տեսակներն՝ որոնք մերձաւոր ցամաք տեսակներն  
բաժնուած են, մի և նոյն ծագումն ունենալուն համար  
չէ՞ որ զանոնք իրարու մօտեցնելով նմանութիւններ ու-  
նին, և կամ անոնց աղբիւն նոր պայմաններէն առաջ  
չեն՝ զարդ զանազանող տարբերութիւններն: —  
Ինչպէս քաջատեսիլ են՝ ցամաքային տեսակներուն ամե-

1. Հմա. Perrier, *Le trasformisme*. — Darwin, *Origine des espèces*, Գլ. ԺԻ:

2. Այսպէս, երբոր գիտութիւն երկու երկիրներու հա-  
տարաբար ձեռք կամ տեսակներ, շատ աւելի ընդհան  
է ենթադրել՝ որ ասոնք մի և նոյն կենսի մէջ մնած են, և  
այս կենսը իրեն իրենց սակեղագործութեան կեցոյն  
կը նկատուի: — Երբեք կը գտնուան որ Ասլան-  
գիւսն և Միւս արկանանաղ գտնուած աշխարհներու մէջ  
մերձաւոր տեսակներ կը գտնուին: Բայց յիշեալ ենք  
որ սանաւային գտնել առաջ՝ բնական շտա կողմը եղած  
երկրներուն ճարտիւսանութեան աստիւծաբար աւելի  
բարձր էր քան կիսա. այդ աշխարհներուն մէջ կային  
տեսակներ՝ որոնք կիսա կ'ապրին լայնութեան սասա-

նագոյն աստիւծանի տակ: Եւ որովհետեւ բնական շտա  
կողմի երկրները՝ գրեթէ անըզհաս ցօտի մը կը կաշ-  
մեն, որ զուցէ առաջ ալ պայտե էր, հետեւաբար՝ կըը-  
նանք ըմբռնել՝ որ այդ անը կ'ան կենդանիներն իրարմ  
զալթել երկու աշխարհներու մէջ: — Այս կերպով կը  
քաջատեսիլ անոնց արդի սերունդներուն նմանութիւն-  
ները: Եւ նոյն սերունդներուն մէջ կ'ան տարբերու-  
թիւններն առաջ կ'ան են՝ անոնց աղբիւն համապատե-  
նեան ըրած արգելքներէն: Եւ ասային անմաս-  
նութիւնները բաժնուած էր ետքը որոշ կերպով տես-  
նուած են: — Եւ որովհետեւ ու Միաբայի Նախնական  
բոլորական տեսակներն աւելի մերձաւոր են իրարու քան  
թէ արդի տեսակներն:

նաեւոր կապակցութիւնը որ ունին մի և նոյն տեղերու մէջ գտնուած բրածոյներու հետ. միմեկ այդ չէ՝ պատահական, այլ՝ վառ գիտքի տակաւորեմունքով օրինակ. ներքէ քիչ շատ փոփոխուած սերունդներ են բրածոյ ձեւերու։ — Չարմանայի չէ՝ որ մի և նոյն լայնութեան աստիճաններուն ասի գտնուող՝ իրարմ ընդարձակ ծովերով բաժանուած ցամաքներու վրայ տեսնուի սեմապտեւ տարբեր տեսակներ. վառն զի երբեք մէջ միւս երկրորդ անցնելու արդիւնք շատ ասեմն է վեր կայ, և ինչ յեղաշրջութիւններու (cataclysmes) ձեռքով աստանդանցած ձեւերն՝ սեմանման տարբերութիւններ կրելու ժամանակ ունեցան։ — Անոր համար, Աստալիսի և մեր ձաւոր կղզիներն մասնաւոր կենդանիներ ունին. երկրորդական շրջանն է վեր՝ Ասիայէն այս դասուած երկրներու մէջ պարկուտ կենդանիներն միայն կային, և այս տեսակներէն, որոնց ձառքարը նշխարներն կան նոյն ասի, Աստալիսի մէջ ինքն գտնուող տեսակներն առաջ եկան։

Միջոյնն տեսակներու բաշխումն ալ նոյն նետուանքն էլիւ։ — Միջոյնն կամ խոր ծովու տեսակներն ունեցան են այնպիսի քնափափայլք՝ ուր ապրելու պայմաններն շատ փոխուած չեն, անոր համար ալ ինչ նման են բրածոյ տեսակներուն։ Իսկ ծովազերայ տեսակներն ապրել են այնպիսի պայմաններու մէջ որոնք թէ՛ ժամանակին շատ փոխուած չեն, անոր համար ալ ինչ նման են բրածոյ տեսակներուն։ Այդ պատճառաւ այդ տեսակներն շատ կը տարբերին թէ՛ իրարմ և թէ՛ ծովային տեսակներէն. սակայն էթէն ելլելով մինչեւ երկրաբանական դասակարգ, այդ յիշուած տեսակներն միջնորդներ (intermédiaire) ձեռքով կը միանան ինչ տեսակներու հետ՝ որոնք կը տեսնուին խոր ծովերու մէջ։ — Այս կէտը կը ստիպէ զմեզ խօսելու նաեւ հնաբանական փաստի վրայ։

Հնեագիտութիւն Ինքնագիտութիւն. — Հնաբանական (paléontologique) կարգ(serie)։ — Երկրաբանական ու

սեփականութիւն (sédimentaire) խաւերն՝ դրքի մը լիթերոլոգիան կը նմանին, որոնց մէջ գիտութիւնը կըրնայ բնական պատմութիւնը և մասնաւորապէս կենդանի եւակներու յաջորդութիւնը ստիպել։ Ասիայն այս դրքին մէջ շատ լիթերոլոգիա կան, թէ՛ վառն զի, դեռ երբեք կենդանի ամենափոքր մասն չտեսնուի, և կամ թէ՛ շատ պատահական վառեղանակներ մուշտ ըլլուած են։ — Դարձեալ. վառն զի է բաց առեւել փոփոխութիւնը, շատ ասիւս կենդանի եւակներ բրածոյ կ'ըլլան. մասնաւոր ցամաքային կենդանիներն շատ քիչ են որ կը թողուին։ Հետեւաբար, անընդհատ շարունակութեամբ պատմութիւնն չի կրնար քաղուիլ երկրաբանական խաւերու լիթերոլոգիայ, այլ միայն յիշուած խորքերէն։ Եւրոպայի եւ Երկրային լիթերոլոգիայի մասն. մասամբ պիտի տեսնուի պահուած նշանները և դասաւոր մասերը պիտի լրացնեն անոնցմով։

Այդ, էթէն բարեշրջութեան պայմաններուն հետեւաւոր, անընդհատ Թագած բրածոյներու ամեն յառաջանքներն նպաստաւոր են բարեշրջական դրութեան, այնպէս որ որչափ նշխարներ գիտեստով ձեռնայն հնաբանական գիտութիւնը, այնչափ այդ գիտական վիճակը հաստատուի ստալիթական դրութիւնը։

Կենդանիներն, մի և նոյն պարու մէջ եղած չեն առեւելք ալ. — տեսակներն յաջորդաբար կ'ազատուին են երկրաբանական շրջաններու ընթացքին մէջ. — կենդանի աստիճան ծագումէն մինչեւ մարդուն ծագումը՝ անընդհատ նոր տեսակներ առաջ եկան են։

Իսկ այս տեսակներն առաջ չեն զար յանկած, մեզ քանի տեսնուած զարեւուր մէջ, իբրեւ թէ օրինակ իմ, անկերական յեղաշրջութեան մը ետքը, ամբողջ բնութիւնը վերափոխուած ըլլայ, այլ տեսակներն քիչ քիչ կը նորոգուին. անոնք կը զննուին, անոնք կ'երեւան։ Մէջէն ընդունող տեսակն՝ այլ եւս չերեւանար. — և այս կէտին վրայ կը յիշուի երկրաբանք քանի մը սիկային խաւերուն համար բարեւ թէ այս կամ այն բրածոյն է։

1. «Լիթի (Lyell) փոխաբերաբար ըստին համեմատ, երկրաբանական գիտանքներ (archives) երկրագունդի իւր բնութեան մեր ձեռքը անկատար հասած պատմութիւնը կը կարծեն, որ դրութեան և մշտափոփոխ գաւառաբանական մը, և որուն միայն վերջին հատորը ունիք՝ որ կը խառն միայն երկու կամ երեք քաղաքներու (pages) վրայ։ Այս հատորին գլուխներէն քանի մը հատուածներ, և իր քաղաքներէն էթէն քանի մը զիւրաքան տողեր հասած են մինչեւ մեզի։ Այս քանդաղ կերպով փոխուող լեզուին և որ յաջորդ դրութիւններուն մէջ քիչ շատ կը տարբերի, իրարմ իւր բառն կրնայ ներկայացնել տեսակներ կամ ձեւեր, որոնք ապրելու մէջ քիչ շատ կը տարբերի, որոնք կ'ազատուին լիթերոլոգիայի մէջ. և մեր կը սխալման համարժեք թէ այս ձեւերն յաջորդական երեւցեր են» (Տարբեր. էջ 388)։

2. Այնպէս Տարբեր բնաւ չէր ծանկեր հնաբանութեան յառաջ գիտարարութիւնները հակառակ իրեն գիտութեան։ — այս դատարարութիւններն են ինքեւեայ կէտեր։ — Այսինքն, արդի և նախնական տեսակներուն յաջորդական օղերն պահպանուող են, որոնք պիտի միանան ինչ տեսակները նորերուն հետ. — երկրաբանական

կարգութիւններն մէջ՝ տեսակներն ամբողջական խառնուրդ յանկած կ'երեւան։ — Կամբրան (Cambrai, քաղաք Գաղղիայ) գետնէ վար գրեթէ բնաւ չեն գտնուիր բրածոյի սիկեր (dépot)։ — Այս պատճառաւ, ամենեւեւ աւելի նշանաւոր հնաբանք, ինչպէս Փիկտէ, Ալգոն, Պարիս, Փիկտէ (Pictet), Ֆորբէ (Falcomer), Ֆորբ (Forbes), և ամենահայտնաւոր երկրաբանք, Լիլլի, Մարշալ (Murchison), Սեդվիկ (Sedgwick) . . . միայն, և յառեւելք բառն ետեւ. դեմար, պայտաւանքներն տեսակներն անփոփոխելութեան սկզբունքը» (Տարբեր. էջ 387-388)։

3. «Ինչպէս կարելի է բնական լիթերոլոգիայ մը անգամ մը ընդունել եւս, այլ եւս չերեւանար. . . նոյն իսկ ապրելու մի և նոյն հնաբանականներն մէջ. . . իրարմ տեսնուի եւս երկու ձեւեր կամ տեսակներ. — ինչ և նոր — չէին կրնար երբեք միմեկ ըլլալ, որովհետեւ գրեթէ ամբողջ թէ՛ երկուքն ալ ժամանակաւ պիտի ըլլան իրենց զառնաւ նախնականներէն զանազան յառաջանքներ, և արդի իրարմ տարբեր կ'ազատուին՝ իրարմ տարբեր կերպով փոփոխուելու կը գիտեն» (Տարբեր. էջ 391-392)։

Այս տեսակներն՝ դիպուսածով շեն զար առաջ, այլ հաստատուել կարող մը, պարզեմ դեպ ի բաղադրանքը յառաջելով: Անդհոնյարականներն (invertébrés) կ'ապրին որդակարկաններեն (verlébrés) առաջ: Ողնայարականներուն մէջ ձկներն կ'երևան սխուրեան գետնէն սկսեալ. ասանցմէ ետքը կու գան դորտոպը (batraciens) անիւրեր ժամանակի մէջ ջրէն առաջին դուրս ելած ցամաքներուն վրայ սողուններն իր սկսին երկրորդ դարու մէջ: Թռչուններն ու ստնաւորներն կամ կաթնաբոյժներ (mammifères) երկրորդական դարու մէջ սկսեան եւ ծովովի, բայց բուն երրորդ դարու մէջ կատարեալ զինակի հասեր են:

Ի՞նչէն իմանալու տեսակներուն նախնիները փնտռելը անցելու մէջ, կը գտնենք՝ որ այս տեսակներն ալ ունեցեր են նախատիպ օրինակներ՝ որոնք կամայ ևս մաց կը տարբերին այդ տեսակներէն այնչափ որչափ երկրայ ժամանակէն դեպ ի անցեալը հեռանաք: Օրինակի համար, ձկն մէջ մաս ունի և նոյն տեսակի մասերու երկու նախագիծերը (rudiment). ստորին յետամտամակային դարու (placode) ձկուն (որ hipparion, կը կոչուի) վրայ այս երկու վերալիշեալ նախագիծերը լիովին զարգացած էին. իսկ յետագայ ժամանակէն (ծոցէն) ժամանակի ձիւն այս երկու կողմանի մասերն ու միայն լաւ զարգացած էին, այլ նաեւ անոնք նա առջնակցական անդամը վրայ ուրիշ մաս մ'աչ: Այս երեք նախատիպ օրինակներու մէջտեղ կը դրուին միջնորդ կամ միջին զինակներ՝ ժամանակներու կանոնաւոր կարգով:

Եւ յիշել, անի յայտնի իրողութիւն մ'է որ բազմաթիւ բնականներու խումբերն անցած են ձեւէ մը աւելի ձեւի, կամ մէկ տեսակէ միւս տեսակը. — և այս անցքին տեսակներն կամ ձեւերն կան լին վերին սեւերը կամ հիւշարարութիւնները իրարու հետ կապելու կամ միացնելու համար և լին մի և նոյն սեւի տեսակներուն պատմութիւնը կազմելու: Այսպէս առաջին դորտոպը (batraciens) ունին ձկներու սեփական բազմաթիւ յատկանիշներ. առաջին թռչուններն, օրինակ իմ Սոյնեֆօնէն մէջ զատուած archæopterix, սողուններու սեփական շատ յատկանիշներ ունին: — Փափարարութիւնն, որոնք բնականներն առան են, գիտատեսներու մէջ, զոր օրինակ նախնիներն. — դոմիտներու, խոյնղիւններն (ammonites), — որովայնառններու մէջ, ինչպէս հանձնակներու վրայ, և այլն: Լաւ եւս քննուած և տեսակներու կազմութիւնը:

Այդ միջոցաւ արարողորձեան գրութիւնը կը համարէ՝ լին Աստուած անդադար կը վերանորոգէ իրեն գործը, որդէս զի իր ամէն մէկ միջամտութեամբ աւելցնէ ևս զորածին վրայ՝ տեսական տարբերութիւններու պէս անշուն կէտեր, ընդհանրապէս բարեբաղնութիւնը թուի լին պայծառ և դիտական կերպով կը բացատրէ ճարտարական յարդարութիւնը, այսինքն, և տեսական ձեւերն կամ տեսակներն փոփոխուած են՝ անսխալ, նաբար բարձրացած են՝ յարմարելով միջամտութեան ուր կ'ապրեն: — Ապրելու պայմաններուն (condition) մեծապէս փոխուելուն պատճառաւ, իւրաքանչիւր խմբի կենդանի տեսակներն ալ շատ փոխուած են. — Եւ աւելցնեն. կան միշտ այնպիսի տեղեր՝ ուր կենաց պայմաններն անփոփոխ էին, անոր համար եղած են ի հարկէ հանքեր ալ որ միշտ անփոփոխ տեսած են (ծովուն խորը եղած կենդանիներն<sup>2)</sup>): — Երբորգական ժամանակներն ի վեր կենաց պայմաններուն զգալի կերպով նոյն շնորհուն համար, տեսակներն ալ աւելի հաստատուած և անփոփոխ ճնշուցեր են: — Եւ որովհետեւ կենաց պայմաններն կամ հանգամանքներն երբեք յանկարծ փոխուած չեն, այլ զանազակ կերպով, անոր համար՝ վնասներն ալ ըստ նորոգուման չէ միջամտելու, այլ կամայ կամաց: — Այսինքն զի կենդանի տեսակները իրարմ որչափ տարբերութիւններն առաջ կու դրան, իրեն նոյն տեսակը, հարկաւորութեան եղանակէն կամ կերպէն, հետեւարար՝ ամէն խմբերն ալ կրնան նախաւորապէս ամառնել զեփաններու մէջ ունենալ իրենց ստորին նախատիպ օրինակներն:

Դիտել կու ասանք նաեւ՝ որ բուսական թաղանթութեան կամ ազդին յարդարաւոր զարգացումներուն մասին եղած նշանաւոր իրողութիւններն եւս նպաստաւոր են բարեբաղնութեան. զանգ զի բուսական ծագման կորը բացարձակապէս զգալահետաքնն և զարդարանական բազմաթուրութեան (complication). զազատանքներն միայն նախնական ժամանակներու կը վերաբերին. յետոյ կու դան կիկադէ (cycadées) և կոնարներ. — միայն թանկերն ու երկաթթանկերն կ'երևան երկրորդական դարուն մէջ և երրորդին մէջ կը հասնին իրենց կատարեալ զարգացման:

Այլեւս ի՞նչ իրողութիւն — Սազմաբանական (embryologique) կարգ: — Սազմաբանութիւնը, որ ամենաբարձր դիտութիւն է և որ շատ արագ զարգացել է « պատմութիւն անհատի մը զարգացման» հաւկիցային

1. « Անենէն աւելի յաւանք գիտականն այս կ'երեւի — մանաւանդ ի՞նչ իրարմ՝ շատ տարբեր խումբերու վրայ ըլլալ ինչպիսի, ինչպէս են ձկներն և գետնաններն — որ ի՞նչէ, օրինակի համար, արդի զինակի մէջ այս խումբերն իրարմ կը տարբերին երկու զոյգ յատկանիշերով, այս տարբերիչ յատկանիշերն աւելի ստական կերպով են այդ երկու խմբերմէն ճարտարներ մէջ, այնպէս որ երկու խումբերն առաջ քիչ մ'աւելի սեփաւոր էին իրարու քան ի՞նչ (Տարբեր, էջ 406):

2. Օրինակ իմ, « Ինչպէս լին լիւնայիններն (lingula silurienne) շատ քիչ տարբերութիւն ունին այդ սեւի վերաբերեալ կենդանի տեսակներէն:

3. « 1893. *L'Embryologie générale*, Dr Roule, P. ris, 1893; Darwin, *Origine des espèces*, p. 518. — Տարբեր հետեւան կերպով կը միացնեն ճարտարական փաստը կամ ազգացոյցը՝ սազմաբանականին հետ: « Ահապէս և որչի շատ ձեռնաւ գաւառներն կը պիտի են այս իրողութեան վրայ լին կենդանիներն կը նմանին չափով մը, մի և նոյն դասու վերաբերեալ արդի կենդանիներուն սազմութեան: — կը պիտի նաեւ այս ըստ բուսականի երկը համեմատութեան վրայ՝ որ կայ ինչ անհետացած տեսակներն երկրաբանական յարդարութեան և արդի տեսակներու սազմանին զարգացման մէջ: Այս զազականներու զարմանալի կերպով կը համեմատեն ի՞նչ

գիտական անհայտ միջուկ չափաւս կերպարանքը կամ ձեւը : — Գլխաւոր բնականաբար իրողութիւններ, որոնք կրճատ ներգրայ խոյր չափաւս արել, կեանաւայներ են :

4. Որովհետեւ ամեն կենդանիները նախնական խորշով (cellula) մէջ սկզբը կ'առնան, անոր համար իրարու հը նման իրենց սկզբնաւորութեան մէջ : — Առաջին և յետոյ փուլերն (phase) ամենաւս հասարակաց են, այսինքն, հասարակ խորշ (segmentation, — morula, — planula, — gastrula, և այլն) :

5. Ամեն կենդանի պարզէն գնդի բաղադրեալը կ'ելլի բազմութիւն երկու փուլերու և փոփոխութիւններու ձեւով : և այս երկու փուլերու միջոց կ'առնենայ ձեւ նման իրենցինքն : այն ձեւերուն նման զորս կը պահանջ ասորին նախնական իրենց բոլոր կենդան մէջ :

3. Մի և նոյն գտած նապակէ Լանթերնի, ինչպէս Լիննէյն, զարգացման ամբ յայտնի նմանութիւններ կ'առնեն ամեն ան ժողովրդականը : Երբեք իրենց ստեփանկ յոսու կանխիկները կ'առնան և ինչ կամ շատ կը զարգաւորին իրարմ : — Մի և նոյն ճիգ դառնութեան, բայց ասոր բեր գտնար, փոքրերեւոյ ձեւերն : ինչպէս Լիննէյն և կաթնասնայներն, միջուկ ձուլ նախաւոր արմնակը : զուգահեռական զարգացումն ունին : և այս փնտնեալ եղբ' միջոցն Լիննէյն իրենց ստեփանկութեան յատկանիշներուն մէջ և հետաւորութիւն, կաթնասնայներն առաջ կը ասնին իրենց զարգացումը, կ'առնեն այն փնտնեալները որոնք զարգաւորաց մէջ կայուն են, իսկ կաթնասնայներն մէջ անհասարակ և փոփոխական, և փերչակէ կը հասնին իրենց զատու ընտրելի նախաւոր արմնակին :

6. Բարեշրջանակներուն զարգացումը, որոնք զարգանալով ձեւան գրգռութեամբ կարելի չէ յայտարարել կենդանաբաւ :

գրգռութեամբ կը լանայի ցուցնելու : որ չափաւս կը առաքելի ապակեմ այն փոփոխութիւններով որոնք սեղի կ'ունենան անհասարակութիւններ : կենդան ընթացքին մէջ, զորս ապա կը ժառանգեն անոնց սերունդներն համապատասխան ժամանակի մը մէջ : իսկ (փերչիկեալ դիտականներու) կարելիքով որ ստացի գրգռել անփոփոխ կ'ենթադրէ, շարունակաբար, յաջորդական սերունդներու մէջ, չափաւսաբն ժրայ կը հասարակութեան մեծամեծ առաքելութիւնները : իր այսպէս ստացի կենդանայ շուտ փոփոխուած և նախկին պատկերին պէն կ'ըլլայ, զոր ընտանիքին կը պահէ (էջ 416) :

1. Յիշատի ոչնչաբաւականներուն ամեն գտնարն ալ Երթաւոր (Leptocardes կամ Amphioxus) Լիննէյն և նոյն շրջանակներն կամ երեւոյթներն կ'առնեն, իսկ այդ Երթաւորներն Լիննէյն ասորին կարգին են, կամ լաւ եւս protochorde ըստաններուն բարձրագոյն գտնին են :

Պոն Պարեյ, որ սաղմաբանութեան նաւորն եղաւ, կեանակը հասարակ ամենաւս ձեւով է : և կ'սփռաւ ըզրկերու, մուկեղներու, օճերու, հասարակներն կրճատելու ապագայի իրարու շատ կը նմանին իրենց զարգացման առաջին շրջանակներն մէջ, թէ իրենց արդիւնութեան և թէ իրենց մասերուն բարեշրջանակ եղանակով : և այս նմանութիւնը սխալ փաստարկ է որ այդ սաղմներ իրարմ կրճատ զանազանի միայն իրենց հասարակութեան ձեւով : Աջակի մէջ պատկան երկու փոքր սաղմներ ունիմ յոյս, որոնց անունը արմնապրել զանց կ'ընեն, և ներկայայտեն չեմ' կրճատ ըսել թէ ինչ գտն են... ճշմարիտ է որ այս սաղմներուն ծայրերը

նախնական կարգի և սաղմաբանական կարգի մէջ եղան այս եղանակն ամենաւս թիւնը : Որովհետեւ եթէ ճշմարիտ է թէ նախ մը զարգացումով կ'առնին պարզէն ի բաւ զարգանալ, կրճատ այդ նախնական իրենց նպատակներն կ'առնէ, և նախորդ որ չէր որ ուրիշ տեսակներն յատկապէս ստարին նեւերն անցնէր, որոնք իրենց նպատակներն չեն նապաստել :

Ընդհանրական բարեշրջանակ գրգռութեամբ գրգռուածութեան կրճատ մեղմուի այս երեւոյթը, Միւլլերի են : անեալ օրէնքով : այսինքն, և Ամենաւս բարեշրջանութեան պատճառով իրենցով մը անհասարակ բարեշրջանութեան համարուն կրճատութիւնն, համապատասխանութիւնն է : — Կամ արդէ բաւարար : Իրարեւոյթն անհասարակ մասնա փոքրով կը կրճատ այն երեւոյթները որոնցմ անցած է իրեն անհասարակ :

Այս կենդանաբան (biogenétique) կենդան օրէնքը հասարակական և համեմատական ժամանակներու ժառանգականութեան օրէնքն է : այս, զոր պարզեալ կը պարզէ Տարբեր : և իւրաքանչիւր եղանակ և նոյն զարգացում կը կրճատ այն փնտնեալները որոնքմ անցած են իրենց նախնին : Այսպէս օրէնքն է ինչ, նախ մը և կաթնասնայներ կամ աստնաւոր մը կը նմանին իրարու երկուսն ասնին իրենց զարգացման ընթացքին մէջ, քանի մը կ'երկուսն ալ կը կրճատ այն երեւոյթները որոնքմ անցած և հետաւոր : կայ նախնին որ սղմաբանականներու առաջինն եղաւ :

Այս կրկնով կը մեղմուի ոչ միայն սաղմաբանական կամ իրենցինքն, այլ նաեւ շատի մը եւանդներ զարգացման մէջ նշմարուն անկանոնութիւններն : — կը բացատրուին կերպարանփոխութիւններն և փոփոխակի (alternant) ձեւանցներն : այս զեւթիւն մէջ,

գնա եւս կը պահին, բայց եթէ իրենց զարգացման առաջին շրջանին մէջ են, բան որ չենց կրճատ սղմով անանցէ, քանի մը մուկեղներն և կաթնասնայներն ու յետոյ, թռչուններն : թռչուններն և ուղեղը, և նոյն իսկ մարդուն Լիննէյն ու ուղեղը, ասոնց աննշմարելի և նոյն կենդանու ձեւէ մը առաջ կու գան :

2. և Պարեյն որ չկայ որուն կամ շրջանակն կամ ծոցախորդի թռչուն նախապէս և չլայն իրենց ամեն մասերով և դիտուած համեմատութիւններով, շատի որ այս մասեր տեսանելի եղանակն սաղմին մէջ (Տարբեր, էջ 523) :

Կենդանաբանական ամբողջ իտմներ կամ որոնք մէջ սաղմաբանութեան ձեւերն շատ առաքելութիւն շատին ևս անեն : — Ընդհանրական կամ իտմներ ալ զարգացման ձեւին կարելի չէ զուլակել թէ փերչիկ որոնք ձեւերն ինչ պիտի ըլլայ : Սարգիսի շատ փոքր կերպարանփոխութիւններ կը կրճատ Միւլլերի մէջ ալ կերպարանփոխութիւններն շատ անհասարակ են :

3. և Սարգի փոփոխութեան, ծոցախորդի փերչիկի որ և չլայնին մէջ ալ երեւոյթ, սերունդներուն մէջ կը յայտնուի համապատասխան ժամանակի մը մէջ... Կրճատ փոփոխութիւններն զարգացման զեւթիւն ալ սերնդ փոփոխութիւն (variation) բաւար իրեն ընդհանրականութեան փոփոխութեան — որոնք առաջին կ'առնուի տեսնուած են սղմն : և զան թէ ծոցախորդ ժրայ (Տարբեր, էջ 525) :

4. Զարգացման բազմութիւն կերպեր որոնքն են : — 1. Իսկը արաւ կերպով կը դիտել որ չափաւս անեն, գրգռել բոլոր ոչնչաբաւականներն մէջ այդ պարզեալ է : — 2. Իսկը չափաւս փնտնեալ կը համար միջանկարէ :

կրկնութիւնը արագ շրջաբեր, այլ զանազակ կերպով. կենդանի էակը, իրեն միջավայրին յարմարելով, երբայն ժամանակ կը նայ շրջաններէն մեկուն մէջ որուն մէջ իրեն տեսակը թերեւս երկայն դարեր մնացեր է. — կը բացատրուի թէ այս զանազակ վիճակներն ինչպէս այսչափ արագ անցնեն են ընդհանրապէս, այնպէս որ նոյն իսկ անմոռելի ոմանք խափառուներ անխնայացն են. որովհետեւ ժառանգութեան օրէնքը, ինչպէս որ փորձը կը հաստատէ զայդ, կը գիտն միշտ ժամանակէն առաջ իրագործուելու սերունդներուն մէջ: — կը բացատրուին նոյն իսկ երկու զուգահեռական գիծերու մէջ յանկարծ վրայ եկած մէկ քանի տարբերութիւններն, որովհետեւ նոր ժառանգութեան յատկանիշ մը կընայ մեծ ազդեցութիւն ընել էակին տարբեր պատմութիւնէն վրայ: — կը բացատրուի վերադարձման (régression) երեւոյթը, այսինքն՝ եզականութիւն մը՝ որով քանի մը կենդանիներէ՝ իրենց չափահաս վիճակէն աւելի կատարեալ թրթուրային (larvaire) վիճակ ունին<sup>1</sup>. և այս առաջ կու գայ նոյն կենդանիներուն հաստատուն անփոփոխ կերպով կրկնուել տեսակին նախընթաց վիճակները Չորօրինակ, Պարեգտուները (tuniciers) ի սկզբան՝ զեւ երկնց որոշիչ ձեւը շառած ողնայարականներու նման՝ ողնային (dorsale) լար ունին: Նոյն երեւոյթը կը տեսնուի պատառաւորը ողնայարականներու (crustacés)<sup>2</sup> և խոպոպուտաններու (cirripèdes), և այլն, վրայ:

(intermediaire) քանի մը շրջաններու մէջ կանկ առնել ետքը. — կենդանաբանփոխարին կրող կենդանիներուն մէջ այսպէս է. օրինակ ինչ, որոշ տակու մի ժամանակ կ'ապրի շերտիկիկ (têtard) վիճակէն մէջ. միջատաներն, կատարեալ միջատ ըլլալէն առաջ, կ'ապրին թրթուրային թրթուրներու, յետոյ կ'աւանդանան վիճակէն մէջ, — բայց այս զանազան վիճակներն իրարու կը յաջորդեն մի և նոյն անկատի մէջ. — խափ վերջին որոշիչ վիճակին կը հասնի՝ զանազան անկատներու մէջ զանազան շրջաններէ կամ երեւոյթներէ անցնելու ետքը. ստոր օրինակ են, փոփոխակ եռանց (génération alternante) ունեցող կենդանիներն, ինչպէս լուիք (pucceron-phylloxera), ծոգամայրերն...:

1. « Տնկերներու (ascidie) (tuniciers) հակիթթը բարձրագոյն յօրինուածով պատ թրթուր մը առաջ կը բերէ, որ ողնայարականներուն յօրինուածի մը մօտեւնայ: Այս թրթուրը փողպէն խոխ կամ անկող ունի (branche pharyngienne), նման ստորին ողնայարականներուն. ունի ողնային դրութիւն մը որ ձեւացած է ըղջիկ և ողնածուծէ (moelle épinière): Մարմինը, իրեն արտադրութեան մէջ, ունի խոշոր գլուխ մը և երկայն ազի՝ որուն վրայ կան երեքմասն (métamérisme) շղերը՝ որոնք տեղաշարժութեան կը ծառայեն: Իւրեւն անկողի թրթուրը (շերտիկիկ) իրապէս ողնայարական մ'է: Երբոր շերտիկիկ կը հաստատուի, այն առեւ շարք մը յետախաղաղ փոփոխութիւններ կը կրէ, որոնք կը վերափոխու չափահաս ձեւով մը՝ որ շատ աւելի պարզ է քան թրթուրային ձեւը » (Փերրիէ):

2. « Խոպոպուտաններու (cirripèdes) թրթուրները, զարգացման առաջին շրջանին մէջ, երբք զգոյ թրթուր ունին, միակ և պարզ աչք մը, փողպէն խոխ մը, որով շատ կ'ուսեն, վրան կը արտադրեամբ կը հաս-

Այս ըսել չէ՝ թէ կաթնաբոյժ մը կենդանաւորուն մ'է (zoophyte), որք մը, ձուկ մը... որովհետեւ այս տեսակներէ՝ հասարակաց արմատէն ի սկզբան բաժնուած հիւղեր են, որոնք յետոյ սեփական յատկանիշներով յատուկ ձեւ առնէ են: Այսպէս, մեծ ձառի մը մէջ բոլոր հիւղերը մնացնող հիւթը՝ նոյն արմատէն առաջ կու գայ. և այն հիւթը՝ որ առաջին հիւղերուն կ'երթայ, ակիղներ կը շեղի, իսկ բարձրագոյն հիւղերու մէջ գացող հիւթը՝ շատ ետքը կը բաժնուի:

— Կ'առաքուի թէ սաղմոսն վրայ չեն տեսնուիր շրջաններ՝ որոնց մէջ ապրած ըլլալ տեսակ մը. որովհետեւ այս սաղմոսն՝ առանց հասնելու իրենց վերջին կէտին, ինչպէս կընային կեանք ունենալ: — Սակայն այս առաքումութիւնը՝ հիմնական չեղեւիր. — և յերաւ, վրան զի եթէ սաղմոսն իրենց վիճակէն յարմար միջավայրի մէջ էին, կընային ապրիլ կամ կեանք ունենալ ինչպէս պէ՛տէ: Ինչպէս որ կ'ապրին կերպարանափոխ և փոփոխակ եռանց ունեցող (génération alternante) կենդանիք. բայց ընդհանրապէս ժառանգութիւնը կը ստեղծէ զանոնք և չի ձգէր, որ միջին շրջաններու կամ երեւոյթներու մէջ կենան<sup>3</sup>:

Հ. Ս. ՍԱՐԳՍԻ

### Շարայաբանի

տրնան: Երկրորդ շրջանին մէջ, որ թիթեռնիկի հարսնակ վիճակէն կը համապատասխանէ զոյգ զոյգ քջան շերտ յօրինուածով լողալու. թիթեռն ունին, զոյգ մը փառուոր աչքեր և շատ բազմաթիւ եղբերիկներ (antennes). բայց բերանին շատ անկատար է և խիստ կերպով փակուած, այնպէս որ չեն կրնար ուտել: Այս վիճակի մէջ, իրենց միակ զօրքն և փնտուղ, զգալութեան զարգացման ձեւով, և զանիւ, իրենց լողալու կարողութեամբ, յարմար տեղ մը՝ ուր կարենան հաստատուի վերջին կերպարանափոխութիւնը կրելու. մար: Աւել ետքը, բոլոր կենք կպած կը մնան իրենց ծայրին, թաթերին կը փոխուի բռնանող (préhensile) զորքարաններու. լու. կաճմուածով բերան մը նորէն երեսն կ'ըլլէ. բայց այլ են եղբերիկներն չունին, և իրենց երկու աչքերուն զարմեւն կը յաշտորէ պտղին, ամենապարզ, կեւի մը նման աչք մը » (Տարլին. էջ 522):

3. Սլամանգը՝ նեռաքրքրական օրինակ մ'է: Գիտենք որ հասարակ առլանդիկ շերտիկիկ խոխիկներ ունի և կ'առաջ կ'անցնեն կեանքը: Արտադրյն առաւմանք, որ բարձր լեքանց վրայ կ'ապրի, ձագեր կ'ուտենայ, որոնք խոխի չունին և կ'առաջ չեն կրնար ապրիլ: Բայց այս ձագերն սաղմոսային վիճակէ կ'անցնեն, որուն մէջ շերտիկներ են և խոխիկներ ունին. և եթէ իրենց մօր մարմնէն զուր հանուին և ջրայ մէջ դրուին, հասարակ առլանդիկ շերտիկիկներուն պէս կը լողան: Այս խոխիկներ (branchiale) յօրինուածը, որ համեմատական չէ ոչ կենդանւոյն ապագայ կենքին, և ոչ ալ սաղմոսային կենքից պիտոյցին նման, ուրիշ նպատակ չունի բայց եթէ կրնին նախնական (ancestrale) ձեւերուն անցած զարգացման շրջաններէն կամ երեւոյթներէն մին (Դիտրուիսին M. Lewes):