УДК 517.9

Математика

Георгий СААКЯН

к.ф.м.н., доцент кафедры прикладной математики и информатики АрГУ

E-mail: ter_saak_george@mail.ru

О СВОЙСТВАХ НУЛЕЙ КОМПОНЕНТ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ ДВУМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Գ. Սահակյան

ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻ ԵՐԿՉԱՓ ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՄԱՍԵՌ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԼՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՄՊՈՆԵՆՏՆԵՐԻ ՁՐՈՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Աշխատանքում դիտարկվում են

$$\begin{cases} \dot{y}_2 = f(t)g(t)y_2, \\ \dot{y}_1 = -\frac{f(t)}{g(t)}y_1, \end{cases}$$

համակարգի լուծումների կոմպոնենտների զրոների հատկությունները՝ տրված $[a, b]$ հատվածի վրա այն պայմանով, որ $f, g \in C[a, b]$ և $f(t)$ և $g(t)$ ֆունկցիաները ունեն հաստատուն նշաններ՝ դիտարկվող հատվածի վրա:

Բանալի բառեր՝ դիֆերենցիալ հավասարումների երկչափ զծային համասեռ համակարգ, լուծումների կոմպոնենտների զրոները:

В настоящей работе рассматривается поведение нулей компонент решений системы

$$\begin{cases} \dot{y}_2 = f(t)g(t)y_2, \\ \dot{y}_1 = -\frac{f(t)}{g(t)}y_1, \end{cases}$$

на заданном отрезке $[a, b]$ при условии, что $f, g \in C[a, b]$ и функции $f(t)$ и $g(t)$ - знакопостоянны на рассматриваемом отрезке.

Ключевые слова: двумерная линейная однородная система дифференциальных уравнений, нули компонент решений.

G. Sahakyan

ABOUT PROPERTIES OF ZEROS OF COMPONENTS OF SOLUTIONS OF ONE TWO-DIMENSIONAL LINEAR SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

In this paper, we consider the behavior of the zeros of the components of solutions of the system

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = f(t)g(t)y_2, \\ \dot{y}_2 = -\frac{f(t)}{g(t)}y_1, \end{cases}$$

on a given segment $[a, b]$, provided that $f, g \in C[a, b]$ and both the functions $f(t)$ and $g(t)$ are constant signs on the considered segment.

Key words: Two-dimensional linear homogenous system of differential equations, zeros of the components of the solutions.

Рассматривается следующая двумерная линейная система дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = f(t)g(t)y_2, \\ \dot{y}_2 = -\frac{f(t)}{g(t)}y_1, \end{cases}$$

в предположении, что $f, g \in C[a, b]$ и функции $f(t)$ и $g(t)$ знакопостоянны на рассматриваемом отрезке. Для дальнейшего изложения нам понадобится следующая теорема (см. [1]-[3]).

Теорема 1. Пусть в системе

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = p(t)y_2, \\ \dot{y}_2 = r(t)y_1, \end{cases} \tag{2}$$

$p, r \in C^2[a, b]$, $p(t) > 0, r(t) < 0$,

$$P(t) = \sqrt{-\frac{p(t)}{r(t)}},$$

1. $p'(t) \leq 0, r'(t) \geq 0$, $(p'(t) \geq 0, r'(t) \leq 0)$,
2. $P'(t) \geq 0$ $(P'(t) \leq 0)$,
3. $(\ln P(t))^2 \geq 0$.

Тогда, если уравнения

$$\int_a^t \sqrt{-p(t)r(t)} dt = pk, k \in Z \tag{3a}$$

и

$$\int_a^t \sqrt{-p(t)r(t)} dt = \frac{\rho}{2} + \rho n, n \in \mathbb{Z} \quad (2b)$$

имеют корни на отрезке $[a, b]$, причем $n_1 = n_2 + 1$, где n_1 - число корней уравнения (2a), а n_2 - уравнения (2b), то число нулей первой компоненты всякого нетривиального решения системы (1.1) на $[a, b]$ совпадет с числом корней уравнения (2a) или будет отличаться на единицу.

Если обозначить

$$M = \int_a^b q(t) dt,$$

где

$$q(t) = \sqrt{-p(t)r(t)},$$

то тогда, очевидно, что

$$n_1 = \frac{eM}{\rho} + 1, \quad n_2 = \frac{eM}{\rho} - \frac{1}{2} + 1.$$

Перейдем теперь к рассмотрению системы в предположении, что:

1. $f, g \in C^2[t_0, +\infty)$, $f(t) > 0$, $g(t) > 0$,
2. $f'(t) \geq 0$, $g'(t) \leq 0$,
3. $(f(t)g(t))''' \leq 0$,
4. $g'(t)g(t) - (g'(t))^2 \geq 0$.

В данном случае $p(t) = f(t)g(t)$, $r(t) = -\frac{f'(t)}{g(t)}$ и $P(t) = g(t)$. Следовательно, будем

иметь

1. $p'(t) = (f(t)g(t))' = f'(t)g(t) + f(t)g'(t) \geq 0$, $r'(t) = \frac{f(t)g'(t) - f'(t)g(t)}{g^2(t)} \leq 0$,
2. $P'(t) = g'(t) \leq 0$,
3. $(\ln P(t))'' = (\ln g(t))'' = \frac{g''(t)g(t) - (g'(t))^2}{g^2(t)} \geq 0$.

Таким образом имеют место условия теоремы 1 для любого отрезка $[a, b]$, согласно которой будем иметь: если уравнения

$$\int_a^t f'(t) dt = F(t) - F(a) = \rho k, k \in \mathbb{Z}, \quad (4a)$$

и

$$\int_a^t f(t) dt = F(t) - F(a) = \frac{\rho}{2} + \rho n, n \in \mathbb{Z}, \quad (4b)$$

имеют корни на отрезке $[a, b]$, причем $n_1 = n_2 + 1$, то число нулей первой компоненты всякого нетривиального решения системы (3) на $[a, b]$ совпадет с числом корней уравнения (4а), или будет отличаться на единицу. Здесь $F(t)$ - первообразная для функции $f(t)$.

Заметим, что число корней уравнения (4а) будет равно

$$n_1 = \frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} + 1 = \frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} + 1,$$

а число корней уравнения (4б)

$$n_2 = \frac{F(b) - F(a)}{\rho} - \frac{1}{2\mu} + 1.$$

Отсюда будет следовать, что равенство $n_1 = n_2 + 1$ будет иметь место, если

$$\frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} = \frac{F(b) - F(a)}{\rho} - \frac{1}{2\mu} + 1.$$

Последнее возможно, если

$$\frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} = \frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} + \frac{1}{2}. \tag{5}$$

Таким образом имеет место

Теорема 2. Пусть система (3) удовлетворяют условиям:

1. $f, g \in C^2[t_0, +\infty), f(t) > 0, g(t) > 0$
2. $f'(t) \neq 0, g'(t) \neq 0,$
3. $(f(t)g(t))''' \neq 0,$
4. $g'(t)g(t) - (g'(t))^2 \neq 0,$

и $F(t)$ - первообразная для функции $f(t)$. Если

$$\frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} = \frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} + \frac{1}{2},$$

то тогда число нулей первой компоненты всякого нетривиального решения системы (3) на отрезке $[a, b]$ будет равно $\frac{F(b) - F(a)}{\rho} \frac{1}{\mu} + 1$ или отличаться на единицу.

Заметим, что, условие (5), в частности, будет иметь место, если $\frac{F(b) - F(a)}{\rho}$ является целым числом. Из предыдущих рассуждений также следует, что если рассмотреть систему

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = mp(t)y_2, \\ \dot{y}_2 = -\frac{m}{p(t)}y_1, \end{cases} \quad (6)$$

при условии, что $p(t)$ удовлетворяет условиям теоремы 2 и $m > 0$ выбрано так, чтобы число $\frac{lm}{p}$ оказалось бы целым, то число нулей первой (второй) компоненты всякого нетривиального решения системы (6) на отрезке длины l будет равно $\frac{lm}{p} + 1$ или отличаться на единицу. Таким образом можно построить систему (6) так, чтобы на любом отрезке длины l и заданном числе $n \in \mathbb{N}$ число нулей первой компоненты всякого нетривиального решения системы (6) было бы не меньше n . Для этого достаточно потребовать выполнение условий

$$\frac{lm}{p} + 1 = n + 1 \quad \text{или} \quad \frac{lm}{p} = n.$$

Покажем на примере, как можно смоделировать такую систему. Предположим, что $l = p$ и $n = 2$. В данном случае

$$\frac{lm}{p} = 2,$$

откуда найдем

$$m = 2.$$

В качестве функции $p(t)$ возьмем, например, функцию $p(t) = t + 1$. Очевидно, что функция $p(t)$ удовлетворяет условиям теоремы 2 при $t_0 = -1$, и, следовательно, число нулей первой компоненты всякого нетривиального решения системы

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = 2(t+1)y_2, \\ \dot{y}_2 = -\frac{2}{t+1}y_1, \end{cases}$$

на любом отрезке $[a, b] \subset [-1, +\infty)$ длины p будет больше или равно двух. Заметим, что при этом число нулей второй компоненты будет больше или равно 1. Ниже, на рисунке 1 приводится графическая интерпретация частного решения системы (6) на отрезке $[p, 2p]$ при начальных условиях $y_1(0) = -1$, $y_2(0) = 1$ (на рисунке y_0 соответствует первой компоненте, а y_1 - второй), построенная в среде Mathcad.

Рис. 1

Можно предложить и другой способ построения подобных систем, используя лишь степенные функции, при условии, что задан отрезок $[a, b]$. Итак, предположим, что нам задан отрезок $[a, b]$, $a > 0$ и требуется построить систему (1) так, чтобы первая компонента произвольного нетривиального решения системы (1) имела бы не меньше заданного числа нулей n . Определим используемые функции, например, следующим образом:

$$q(t) = t^k, \quad p(t) = t, \quad r(t) = -t^{2k-1}, \quad t > 0, \quad k \geq 1.$$

Покажем, что имеют место условия теоремы 1. Имеем

1. $p, r \in C^2[a, b]$, $p(t) > 0$, $r(t) < 0$,
2. $p'(t) = 1 > 0$, $r'(t) = -(2k - 1)t^{2k-2} \leq 0$,
3. $P'(t) = \frac{p(t)}{r(t)} = (t^{1-k})' = (1 - k)t^{-k} \leq 0$.
4. $(\ln P(t))' = \frac{k - 1}{t^2} \geq 0$

Тогда будем иметь

$$M = \int_a^b q(t) dt = \frac{t^{k+1}}{k+1} \Big|_a^b = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

Из этого соотношения следует, что надо подобрать значение k так, чтобы выполнялось равенство

$$n + 1 = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{p(k+1)} \frac{1}{b} \quad \text{и} \quad \frac{M}{p} < \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{p(k+1)} \frac{1}{b}. \tag{7}$$

Покажем на конкретном примере как это можно проделать. Предположим, что $a = 0$, $b = 3$, $n = 2$. Тогда условия (7) примут вид

$$\frac{3^{k+1}}{p(k+1)} \frac{1}{3} \geq 3 \quad \text{и} \quad \frac{3^{k+1}}{p(k+1)} < \frac{3^{k+1}}{p(k+1)} \frac{1}{3}.$$

Нетрудно путем подбора найти, что этому неравенству удовлетворяет, например, $k = 2.2$. Система (1) при этом будет иметь вид

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = ty_2, \\ \dot{y}_2 = -t^{3.4}y_1, \end{cases} \quad (8)$$

Ниже, на рисунке 2, приводится графическая интерпретация частного решения системы (8) при начальных условиях $y_1(0) = -1, y_2(0) = 1$ (на рисунке y_0 соответствует первой компоненте, а y_1 - второй).

Рис. 2

Аналогичным рассуждениями можно показать, что если принять $k = 3$, то первая компонента нетривиального решения системы

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = t^5 y_2, \\ \dot{y}_2 = -t y_1, \end{cases} \quad (9)$$

будет иметь на отрезке $[0, 3]$ как минимум

$$\frac{e^{3^4} - 1}{e^{4\rho} - 1} = 5$$

нулей. Ниже, на рисунке 3, приводится график частного решения системы (9) на отрезке $[0, 3]$ при начальных условиях $y_1(0) = -1, y_2(0) = 1$.

Рис. 3

Литература

3. **Саакян Г.Г.**, *О нулях решений некоторых линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка на конечном интервале.* American Scientific Journal, N 2 (2) , 2016, Vol.2, стр. 88-92.
4. **Саакян Г.Г.**, *Об осцилляции одной двумерной системы дифференциальных уравнений на конечном интервале.* Фонд содействия научному развитию “Novation”, Болгария, Варна, N2, 2016, стр. 149-153.
5. **Саакян Г.Г.**, *On a criterion for oscillation and non-oscillation of two-dimensional linear homogenous system of differential equations.* Slovak international scientific journal, N 2, 2016, p. 48-51.

Հոդվածը տպագրության է երաշխավորել ԱրՊՀ մաթեմատիկայի ամբիոնը :