

УДК 517.4

Математика

О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ОДНОЙ МЕТРИКИ

Р. Мусаелян

В работе рассматривается метрика

$$ds^2 = dx^2 + \alpha^2 dy^2 + \beta^2 dz^2 \quad (1)$$

заданная, вообще говоря, на всей плоскости переменных, причем функция $B(x, y) = \alpha^2 dy^2 + \beta^2 dz^2 > 0$ в любой точке области определения.

Ставится задача: найти уравнение геодезических линий в рассматриваемой метрике, если это возможно.

Отметим, что ранее было доказано (см [1]), что метрика (1) заданная на всей плоскости переменных (x, y) , имеющая отрицательную гауссову кривизну, регулярно и изометрически погружается в E^3 . По этому результату метрика (1) погружается в E^3 в виде регулярной поверхности тогда и только тогда, когда $\alpha^2 dy^2$ квадратичный трехчлен. Кроме того, с помощью дериационных формул Гаусса-Вейнгартена (см [2]) получена поверхность, несущая метрику (1). Далее, для облегчения вычисления предполагалось, что $\alpha^2 dy^2 = x^2$. При подходящем выборе постоянных интегрирования, параметрические уравнения поверхности имели вид:

$$X(x, y) = x \cos y, \quad Y(x, y) = x \sin y, \quad Z(y) = \int \beta dy \quad (2)$$

В связи со сходством с геликоидом, поверхность (2) в упомянутой работе называлась геликоидообразной поверхностью.

В настоящей работе пытаемся найти уравнение геодезических линий в метрике (1), если это возможно. Пусть искомое уравнение геодезической линии будет $y = y(x)$. Из курса дифференциальной геометрии известно (см [2]), что геодезические линии в метрике (1) определяются интегрированием дифференциального уравнения второго порядка. Это уравнение называется дифференциальным уравнением геодезических линий и имеет следующий вид

$$y'' = -\frac{B'_x(x, y)}{2} y'^3 - \frac{B'_y(x, y)}{2B(x, y)} y'^2 - \frac{B'_x(x, y)}{B(x, y)} y' \quad (3)$$

Напомним, что $B(x, y) = \alpha^2 dy^2 + \beta^2 dz^2$.

Уравнение (3), подстановкой $P(y) = y'(x)$ преобразуется к следующему виду

$$P'(y)P(y) = -\alpha^2 \frac{\beta' \beta}{\alpha^2 \beta^2 + \beta^2} P^3 - \frac{2\alpha \alpha'}{\alpha^2 \beta^2 + \beta^2} P^2$$

Из этого уравнения следует: либо $P(y) = y'(x) = 0$, либо

$$P' \overline{\varphi} = -\alpha \overline{\varphi}' \overline{P}^2 \overline{\varphi} - \frac{\beta \overline{\varphi} \overline{\beta}' \overline{\varphi}}{B \overline{\varphi}, y} P \overline{\varphi} - \frac{2\alpha \overline{\varphi} \overline{\varphi}'}{B \overline{\varphi}, y} \quad (4)$$

Первое уравнение имеет решение $y \overline{\varphi} = c = const$. Ясно, что $y \overline{\varphi} = c$ геодезические линии в метрике (1). Дифференциальное уравнение (4) общее уравнение Риккати (см [3]). Оно, как известно, при произвольных коэффициентах, не интегрируется в конечном виде. Однако при некоторых подходящих коэффициентах дифференциальное уравнение типа (4) интегрируется в конечном виде (см [3]). Ищем решение уравнения (4) в виде

$$P \overline{\varphi} = g \overline{\varphi}, y \overline{tgf \overline{\varphi}, y} \quad (5)$$

Так как (5) решение уравнения (4), то

$$g'_y \overline{\varphi}, y \overline{tgf \overline{\varphi}, y} + \frac{g \overline{\varphi}, y \overline{f'_y \overline{\varphi}, y}}{\cos^2 f \overline{\varphi}, y} = -\alpha \overline{\varphi}' \overline{\varphi} \overline{g}^2 \overline{\varphi}, y \overline{tg^2 f \overline{\varphi}, y} - \frac{\beta \overline{\varphi} \overline{\beta}' \overline{\varphi}}{B \overline{\varphi}, y} g \overline{\varphi}, y \overline{tgf \overline{\varphi}, y} - \frac{2\alpha \overline{\varphi} \overline{\varphi}'}{B \overline{\varphi}, y}$$

Используя известное тригонометрическое тождество, из последнего получаем относительно функций $g \overline{\varphi}, y$ и $f \overline{\varphi}, y$ следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned} g \overline{\varphi}, y \overline{f'_y \overline{\varphi}, y} &= -g^2 \overline{\varphi}, y \overline{\varphi} \overline{\varphi}' \overline{\varphi}, \\ g'_y \overline{\varphi}, y &= -\frac{\beta \overline{\varphi} \overline{\beta}' \overline{\varphi}}{B \overline{\varphi}, y} g \overline{\varphi}, y \\ \alpha \overline{\varphi}' \overline{\varphi} \overline{g}^2 \overline{\varphi}, y &= \frac{2\alpha \overline{\varphi} \overline{\varphi}'}{B \overline{\varphi}, y} \end{aligned} \quad (6)$$

Система (6) имеет следующее решение:

$$\begin{aligned} g \overline{\varphi}, y &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\alpha^2 \overline{\varphi} + \beta^2 \overline{\varphi}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{B \overline{\varphi}, y}} \\ f \overline{\varphi}, y &= -\int \frac{\sqrt{2\alpha \overline{\varphi} \overline{\varphi}'}}{\sqrt{B \overline{\varphi}, y}} dy - C_1 \overline{\varphi} \end{aligned}$$

Следовательно,

$$P(\varphi) = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{B(\varphi, y)}} \operatorname{tg} \left(\int \frac{\sqrt{2} \alpha(\varphi) \varphi'}{\sqrt{B(\varphi, y)}} dy + C_1 \right)$$

будет решением уравнения (4).

Так как $P(\varphi) \neq 0$ есть решение уравнения (4), то из равенства

$$x = \int \frac{dy}{P(\varphi)} + C_2$$

получается и решение исходного уравнения.

Լիտերատուրա

1. Мусаелян Р.Ц., Погружение в E^3 некоторого класса метрик переменной отрицательной кривизны. Информационные Технологии и Управление, 3-1, Ереван, 2006.
2. Погорелов А.В., Лекции по дифференциальной геометрии. Харьков, 1967.
3. Камке Э., Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Москва, 1971.

Մի մետրիկայի գեոդեզիական գծերի մասին
Ռ.Մուսաելյան

Ամփոփում

Աշխատանքում դիտարկվում է $ds^2 = dx^2 + \varphi^2(\varphi) \beta^2(\varphi) dy^2$ մետրիկան և նրանում գեոդեզիական գծերը: Գեոդեզիական գծերի դիֆերենցիալ հավասարումը ընդհանուր դեպքում չի ինտեգրվում: Նշված չափում հաջողվում է ինտեգրել համապատասխան դիֆերենցիալ հավասարումը:

About Geodesic Lines on some Metrics

R.Musaelyan

Summary

The article deals with $ds^2 = dx^2 + \varphi^2(\varphi) \beta^2(\varphi) dy^2$ metrics on the whole plane of variable, geodesic lines in the given metrics.

Having a specific surface, we introduce an equation of geodesic lines. The equation of geodesic lines is integrated in a finite form in a particular case.