

ԲԱԼԿԼԱԶԳԻՆԵՐ /FABACEAE/ ԸՆՏԱՆԻՔԻ COLUTEA, ASTRAGALUS, GENISTA ՑԵՆԵՐԻ
ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ

Կ. Վ. Բալայան

ԼՂՀ ֆլորայի ուսումնասիրության և պահպանության անհրաժեշտությունն անմիջականորեն բխում է շրջակա միջավայրի պահպանության գլոբալ հիմնախնդիրներից: Ընդ որում, բուսական աշխարհների պահպանության հիմնական խնդիրը բուսական աշխարհի տեսակային բազմազանության ամբողջության ապահովումն է: Սույն աշխատանքում ներկայացվում է ծածկասերմերի /Angiospermae/ գերիշխող ընտանիքներից մեկի՝ բակլազգիների/Fabaceae/ ընտանիքին պատկանող Պայթակենի/Colutea/, Գազ/ Astragalus/, Դեղնածաղիկ/Genista/ գեների տեսակային բազմազանությունը և տարածվածությունը ԼՂՀ-ում:

Նշված ընտանիքին պատկանող գեների տեսակային կազմի վերլուծության համար հիմք են հանդիսացել մեր կողմից կատարված բուսաբանական ուսումնասիրությունները, դաշտային հետազոտություններն ու բուսանմուշների հերբարիումային հավաքները, որոնք ներկայացված են զբանգված են ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության բաժնում:

Բակլազգիների / Fabaceae, Leguminosae/ ընտանիքն ընդգրկում է շուրջ 500 գեղի պատկանող ավելի քան 12 հազ. տեսակներ, որոնք տարածված են երկրագնդի ամենատաքեր բուսաշխարհագրական մարզերում: Կովկասում հանդիպում են շուրջ 550 տեսակ, որոնք տերևաթափ և մշտադալար ծառեր, թփեր, կիսաթփեր ու լիաներ են, միամյա, բազմամյա խոտաբույսեր/1/:

Սույն աշխատանքում նշված Պայթակենի գեղն ընդգրկում է մոտ 15 տեսակ՝ տարածված Հարավային Եվրոպայում և Ասիայում:



Նկ.1 Պ. կիլիկյան/C. cilicica Boiss et Bal./


Պայթակենի/Colutea/ տեսակներն աճում է պայթակենում 3 տեսակ՝ Պ.արևելյան/C.orientalis Mill./, Պ.կիլիկյան/C. cilicica Boiss. et Bal. /, Պ. կոմարովի/ C. Komarovii Takht. // 2/:

ԼՂՀ տարածքում մեր կողմից կատարված բուսաբանական ուսումնասիրությունների և դաշտային հետազոտությունների ընթացքում գրանցվել է Պ. կիլիկյան/C. cilicica Boiss. et Bal./ տեսակը/Նկ.1/, որը տարածված է հանրապետության ստորին և միջին լեռնային գոտիներում: Բուսանմուշները հավաքվել են Հաղորթի, Ասկերանի, Մարտունու, Ծուշիի շրջանների տարածքներից, մշակվել, որոշվել և հերբարիումային նյութը ներկայացվել է ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության

ինստիտուտի բարձրակարգ բույսերի կարգաբանության բաժին:

Պայթակենին տերևաթափ թուփ է, կենտ փնտրած և տերևներով: Ծաղիկները ծոցային են, խոշոր, դեղին՝ հավաքված ճղկույզներում: Ծաղիկները բացվում են մայիս-օգոստոս ամիսներին: Պտուղն ունի է՝ բշտիկանման, կիսաթափանցիկ և բազմաանոթ: Պտուղները հասունանում են հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին: Պայթակենին չորադիմացկուն է, լուսասեր և ջերմասեր: Աճում է չոր, քարքարոտ լեռնալանջերին:

Հայաստանի բուսական աշխարհում տարածված հանդիպող զգալի /Astragalus/ ավելի քան 100 տեսակներից 15-ը հանդիսանում են թփեր, երեմն՝ կիսաթփեր, որոնք մասնակցում են արիդային գոտու դեմոդոֆորայի ձևավորմանը /2/: Գազերը չափազանց չորադիմացկուն են, լուսասեր, հողի նկատմամբ քիչ պահանջկոտ: Հիմնականում տարածված են չոր լեռնալանջերին, բերդոշ են լեռնաչորասեր բուսական տարբեր խմբավորումների կազմում /3/:



Նկ.2 Գ. մանրագլխիկ
A. microcephalus Wild/

արդյունաբերության մի շարք ճյուղերի համար: Ագտագործվում է նաև բժշկության մեջ/ 4/:

Հայաստանի և Ադրբեջանի ֆլորայում հայտնի են Դեղնածաղիկ կամ Օրոճ /*Genista*/ գեղին պատկանող 2 տեսակ՝ *O. ներկատու*/*G. tinctoria*/ Նկ. 3/ և *O. անդրկովկասյան*/*G. transcaucasica*/ Նկ. 4/: Նշված տեսակները տարածված են նաև ԼՂՀ տարածքում /Հաղրուջի, Քաշաթաղի, Շուշիի շրջաններ/: Հանդիպում են հանրապետության ստորին և միջին լեռնային գոտիներում: Աճում են անտառների բացատներում, թփուտներում, գետերի և գետակների ափերին: Ներկատու /պարունակում են դեղին ներկանյութեր/ և դեղատու են, ինչպես նաև գեղագարդիչ/5/:



Նկ.3 Օ. ներկատու
G. tinctoria

Резюме

В данной работе представлен видовой состав и распространение в НКР Пузырник/*Colutea*/, Астрagal /*Astragalus*/, Дрок /*Genista*/ родов одного из преобладающих семейств покрытосеменных – семейства бобовых/*Fabaceae*/.

Գրականություն

1. И. И. Карягин, Флора Азербайджана, 5 том, Баку, 1954.
2. Ճ. Հ. Վարդանյան, Ծառագիտություն, Եր., էջ 167-1762005
3. Ս. Ա. Բալոյան, Հայաստանի կենսաբազմազանություն, Եր., 1999:
4. Տ. Մ. Սյվազյան, Հայաստանի բնաշխարհ, Եր., 2006:
5. Я. Мацку, И. Крейча, Атлас лекарственных растений, Братислава, 1972.