

**ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԳՈՐԾ ՏԱՎԱՐԻ ԵՎ ՀԵՐԵՖՈՐԴ ՑԵՂԻ ՀԵՏ ՏՐԱՄԱՍԱԶՈՒՄԻՑ
ՍՏԱՑՎԱԾ ԽՍՈՆԱՑԵՂ ՄԱՏՂԱՇԻ ՄՄԱՅԻՆ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ս.Ա. Շահնազարյան
Գյուղատնտեսական ամբիոն**

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մասյին բալանսում մեծ տնտակարար կշիռ կազմում տավարի միսը, որին բաժին է ընկնում ամբողջ մսի արտադրության շուրջ 40%-ը: Տավար մսի արտադրության գլխավոր ձեցերվը համարվում է մատղաշի աճեցումը և բուսումը, որը կազմում սպանդային գլխաքանակի շուրջ 70%-ը: Մասյին մթերատվության ավելացման և նրա որակ լավացման աղբյուրներից մեկը կարող է լինել արդյունաբերական տրամախաչման կիրառումը, օգտագործելով մասնագիտացված մասյին ուղղության ցեղերը: Այս կապակցությամբ լայն է կիրառում է ստացել հերեֆորդ ցեղի արդյունաբերական տրամախաչումը կաթնային և կաթնամսային ուղղության ցեղերի հետ:

Ռուստովցևի և Բ.Բ.Չերկաշենկոյի հետազոտություններում հերեֆորդի խառնածինները ըստ աճի ինտենսիվության և կերահատուցման, գերազանցել են մաքրացնող կարմիր տափաստանային ցեղի իրենց հասակակիցներին 11%-ով: Գ.Բ.Բախտովի, Ա. Գ.Կուրչակովի, Լ.Ն. Կազակովի ուսումնասիրությունների արդյունքներով հերեֆորդ ցեղի խառնածինները գերազանցել են բնատուժյան ցեղի իրենց հասակակիցներին՝ ըստ աճի ինտենսիվության և կերահատուցման 8%-ով: Կարմիր տափաստանային ցեղի կովերի և հերեֆորդ ցեղի ցուլերի միջև արդյունաբերական տրամախաչման արդյունավետության մասին են նշում Ա. Գ. Ումբրոդովիչը և Ա. Կ. Նովիկովը:

Հայաստանի պայմաններում Վ. Բ. Ուկլանյանի և Ռ. Տ. Սարգսյանի կողմից տարված հետազոտությունների արդյունքներով, կովկասյան գորշ և հերեֆորդ ցեղերի տրամախաչումից ստացված խառնածին ցուլիկները ըստ աճի ինտենսիվության և կերահատուցման գերազանցել են մայրական ցեղին՝ համապատասխանաբար 15,5 և 14,4 %-ով: Դրա հետ կապված մեր կողմից ուսումնասիրություններ են կատարվել կովկասյան գորշ ցեղի հետ նրա տրամախաչումից ստացված մասյին ու բուսման հատկանիշների ուղղությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի պայմաններում:

Գիտահետազոտական փորձում ընդգրկված են եղել երկու խումբ անասուններ, 12-ական գլուխ յուրաքանչյուրում (6-ական էգ և արու), որոնք ըստ անալոգների հաշվի առնելով հասակը, կենդանի քաշը ծնված ժամանակ, սեռը, բաժանել են փորձնական և ստուգիչ խմբերի: Ստուգիչ խմբում ընդգրկվել են կովկասյան գորշ ցեղի մատղաշները, փորձնական խմբում՝ նրա և հերեֆորդ ցեղի տրամախաչումից ստացված խառնածինները: Բոլոր անասունները եղել են կապովի, մսուրային պահվածքի պայմաններում: Կներակրումը եղել է խմբային: Կատարվել է ամենօրյա կների ծախսերի հաշվարկ: Գիտատնտեսական փորձը ընդգրկել է 6-18 ամսական հասակը: Փորձի ընթացքում կներքի ընդհանուր ծախսը փորձնական խմբում 1 գլխի հաշվով կազմել է 2186 կ. միավոր, ստուգիչում 2206 կ. միավոր: Ընդ որում երկու խմբերի կներաբաժնի կառուցվածքում մեծ տնտակարար կշիռ են կազմել կուպիտ և հյուսիսի կներքը, որոնց բաժին է ընկել կներաբաժնի ընդհանուր սննդաբարության 63,6%, իսկ խտացված կների ծախսը կազմել է 36,4%: Երկու խմբերի մատղաշների աճի ինտենսիվության համեմատական ուսումնասիրման համար, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին, ինչպես նաև 6, 12, 18 ամսական հասակում կատարվել է անհատական կշռումներ, որոնց արդյունքները գնադրված են թիվ 1 աղյուսակում:

Աղյուսակ 1. Փորձնական կենդանիների կենդանի քաշի դինամիկան

հասակը (ամիս)	N	Ստուգիչ (կովկ. գորշ)		II	փորձն. (կովկ. գորշ հերեֆ.)	
		M±m	CV		M±m	CV
6	12	122,3±3,06	8,28	12	131,1±3,73	9,83
12	12	239,7±6,79	9,81	12	249±7,62	10,59
18	11	376,6±7,58	6,66	11	408±13,09	10,62

Ինչպես վկայում են աղյուսակ 1-ի տվյալները բոլոր հասակային շրջաններում փորձնական խմբի անատունները ըստ աճի ինտենսիվության գերազանցել են ստուգիչին: Տարբերությունը խմբերի միջև նդել է ավելի ակնհայտ 18 ամսական հասակում, որի դեպքում փորձնական խմբում միջին կենդանի քաշը կազմել է 408 կգ, ստուգիչ խմբում 376,6>0,95: Իսկ ընդհանուր առմամբ աճի ինտենսիվությունը տարբեր փորձնական խմբերի մոտ փորձի ընթացքում ընթացել է անհավասարաչափ, որի մասին են վկայում թիվ 2 աղյուսակի տվյալները:

Աղյուսակ 2 Միջին օրական քաշաճները և աճի գործակիցները տարբեր հասակային շրջաններում

Խմբերը	Միջին օրական քաշաճը (գ) նշված շրջանում		Աճի գործակիցները կ-ի քաշի համեմ. 6 ամս. հասակում	
	6-12 ամսական	12-18 ամսական	6-12 ամսական	12-18 ամսական
Ստուգիչ	652	760	1,96	3,08
Փորձնական X (կ/գ-հ-ֆորդ)	654	883	1,89	3,11
Փորձնական խումբը	100,3	116,2	--	--
Ստուգիչի համեմատությ. %				

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ի տվյալներից, ավելի բարձր ինտենսիվությամբ բնութագրվել են երկու խմբի անատունները 12-18 ամսական հասակում: Նշված ժամանակահատվածում միջին օրական քաշաճը փորձնական խմբում կազմել է 883գ, ստուգիչում 760գ, կամ փորձնական խմբի անատունները ըստ աճի ինտենսիվության գերազանցել են ստուգիչին 16,2%, այսինքն կերակրման և խնամքի լավ պայմանները նպաստել են հետերոգիսի դրսևորմանը խառնածինների մոտ, որը չի նկատվել փաղ հասակային շրջաններում, մասնակիորեն 6-12 ամսական հասակում կերակրման միջին չափանիշի պայմաններում:

Փորձի ընթացքում տարբեր պատճառներով երկու գլուխ անատուններ փորձից դուրս են եկել մեկնական՝ յուրաքանչյուր խմբից: Ծախսված կերների տվյալների հիման վրա որոշել ենք կերահատուցումը քաշաճով, ըստ որի, 1կգ քաշաճի վրա կովկասյան գորշ ցնդի անատունները ծախսել են 8,67 կերամիավոր, հերմիֆորդ խառնածինները 7,89 կերամիավոր կամ փորձնական խմբի անատունների մոտ կերահատուցումը քաշաճով 9,9 %-ով բարձր է եղել ստուգիչի համեմատ:

Սպանդային և մսային հատկանիշների ուսումնասիրման նպատակով փորձի վերջում բոլոր անատունները ենթարկվել են սպանդի, Ստեփանակերտի մսի կոմբինատում, որոնց արդյունքները գնդակված են թիվ 3 աղյուսակում.

Աղյուսակ 3 Ստուգիչ սպանդի արդյունքներ

Ցուցանիշները	Կովկասյան գորշ	Խառնածինները (կ/գորշ հերմիֆորդ)
Անաս. թիվը, գլխ.	11	11
նախատախնդ. կենդանի քաշը, կգ		
24 ժ քաղցած պահելուց հետո	352,1	383,5
Մսնդիքի քաշը, կգ	193,7	210,1
Ներքին ճարպի քաշը, կգ	10,4	13,7
Մաշնդային քաշը, կգ	204,1	223,3
Մաշնդային նլքը, %	57,97	58,36
Կաշվի քաշը, կգ	23,5	26,6
Ելքը նախատախնդային քաշին%	6,66	6,94

լիռնալի գիտական և արհեստիկ ուսումնասիրություն է ծանցվածքով սովորական կազմակերպությունը: Այս նպատակով մսի կոմբինատում կատարվել է նման հետազոտություն 6 անասունի հաշվով, 3-ական գլուխ յուրաքանչյուրում (աղյուսակ 4)

Աղյուսակ 4 Մսի մորֆոլոգիական կազմը

Խմբեր	Մսային ինդեքսը	Աջ կենի մանդիքի քաշը (կգ)	Մկանային հյուսվածքը		Ոսկորները		Ջլերը		Կորուստը	
			քաշը (կգ)	%	քաշը (կգ)	%	քաշը (կգ)	%	քաշը (կգ)	%
Կովկ. գորշ	4,49	96	76,3	79,5	17,0	17,7	2,4	2,5	0,3	0,3
Խառնած (կովկ. գորշ հեռնի.)	4,95	106,5	86,2	80,92	17,4	16,4	2,5	2,35	0,36	0,34

Հերմֆորդի խառնածինների մանդիքում մկանային հյուսվածքի % կովկասյան գորշի համեմատությամբ 1,42 % և համապատասխանաբար ոսկորները փչ՝ 1,3 %: Մսի ինդեքսը ստուգիչ խմբում կազմել է 4,49, փորձնական՝ 4,95:

Խառնածինների միսը եղել է ավելի լիարժեք, նրանում լավ է արտահայտված եղել ճարպի պարունակությունը և մսի մարմարայնությունը:

Կատարած հետազոտությունների արդյունքները հնարավորություն են տալիս նրաշխարհագրորդ հարթավայրային, նախալեռնային և միջին լեռնային գոտու տնտեսություններում կովկասյան գորշ գնդի ցածր մթերատու կովերը (15-20%) տրամախաչել մասնագիտացված մսային ուղղության ցեղեր հերմֆորդի հետ, որը նպաստում է մսային մթերատվության բարձրացմանը 9 %-ով և կերահատուցման լավագույնը 10%-ով:

Ամփոփում

Կատարվել է արդյունաբերական տրամախաչում տավարի կովկասյան գորշ ցեղի կովերի և հերմֆորդ մսային ուղղությամբ ցեղի ցուլերի միջև:

Տրամախաչման արդյունքներով հաստատվել է, որ հերմֆորդի խառնածինները ըստ ավելի ստեղծականության գերազանցել են կովկասյան գորշ ցեղի իրենց հասակակիցներին 9 %-ով, լիարժեքությամբ կները՝ 10%-ով:

Резюме

На статью: Мясная продуктивность молодняка кавказской бурой породы и ее помесей герефордской в условиях Нагорного Карабаха. Проведено промышленное скрещивание кавказской бурой породы со специализированной мясной породой герефорд.

По результатам исследований установлено, что герефордские помеси по интенсивности роста превосходили кавказскую бурую породу на 9 % в лучше оплачивали корм на 10%.

Գրականություն

1. Ն. Ֆ. Ռոստովցև, Ի. Բ. Չերկաշենկո Արդյունաբերական տրամախաչումը տավարաբուծությունում Մ. 1971
2. Ա. Ֆ. Ումիրբովիչ, Ա.Ի. Նովիկով Կարմիր տափաստանային ցեղի կովերի տրամախաչումը հերմֆորդ ցեղի ցուլերի հետ: Ամս. «Անասնաբուծություն», թիվ3, 1976թ.
3. Վ.Բ. Ոսկանյան, Ռ. Տ. Սարգսյան-Կովկասյան գորշ ցեղի կովերի և մսային ուղղության ցեղեր ցուլերի տրամախաչման համեմատական արդյունավետությունը: ՀԳՀԻ աշխատությունների, հատ. XII 1974թ.