

MYOTIS BECHSTEINII- ՆՈՐ ՏԵՍԱԿԸ ԱՐՑԱՍԻ ՖԱՌՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ (ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ)

Վ. Տ. Հայրապետյան
Լինսաբանության ամբիոն

Արցախի խորոպտերաֆաունայի հարթաքթերի ընտանիքին ավելացնել ևս մեկ տեսակ՝ Myotis bechsteinii Kuhl. 1818 :

Արցախի տերիոֆաունայում ձեռքաբերվողների (Chiroptera) կարգը ներկայացված է մեծ բազմազանությամբ: Նրանք հանդիսանում են տարբեր լանդշաֆտային գոտիների, 300-ից մինչև 2200մ ծովի մակերևույթից բարձրությունների, բնակիչներ: Այսօր ապացուցված է, որ սրանք չափազանց օգտակար գազանիկներ են, որովհետև ոչնչացնում են անտառների, այգիների, մարգագետինների և կուլտիվացված ցանքատարածքների առավել վնասատու հանդիսացող միջատներին:

Լինսային Ղարաբաղի խորոպտերաֆաունան ներկայացված է երեք ընտանիքներով՝ պալատաքթեր-Rhinolophidae՝ եինգ տեսակներով, բուլդոգակերպներ-Mollosidae՝ մեկ տեսակով և հարթաքթեր կամ սովորական չղջիկներ -Vespertilionidae՝ 19 տեսակներով:

Այսպիսով, ամփոփելով ձեռքաբերվողների վերաբերյալ մինչ օրս եղած տեղեկությունները /1,2/, կարելի է խոսել հանրապետությունում հանդիպող սրանց 25 տեսակների վերաբերյալ: Եվս երկուսի կարգավիճակը գտնվում է պարզաբանման գործընթացում:

Ինչ վերաբերում է հարթաքթի չղջիկների ընտանիքի Myotis ցեղին պատկանող՝ Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկի- Myotis bechsteinii հայտնաբերմանը, ապա դա փաստագրված է Իվանյան /Մոջավլու / գյուղի մոտակայքում մեր կողմից բռնված չորս անհատներով և Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական բոլեջի տնօրեն՝ Ա.Լ.Ջիվանշիրյանի կողմից մեկ անհատով՝ բռնված Բերքածորի /Հասանաբաղ/ ուսումնափորձնական տնտեսությունում /Յավրույան, Հայրապետյան, 2003/ :

Հիմնվելով վերոշարադրածի վրա, առաջարկում ենք Արցախի խորոպտերաֆաունայի հարթաքթերի ընտանիքի 19 տեսակներին ավելացնել ևս մեկը՝ Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկին- Myotis bechsteinii Kuhl. 1818.

Ամփոփում

ԼՂՀ-ում ձեռքաբերվողների կարգը (Chiroptera) ներկայացված է երեք ընտանիքներով՝ պալատաքթեր-Rhinolophidae (եինգ տեսակ), հարթաքթեր-Vespertilionidae (տասնինն տեսակ), բուլդոգակերպներ- Mollosidae (մեկ տեսակ):

Խորոպտերոգիական հետազոտության արդյունքում ԼՂՀ ֆաունայում հայտնաբերվել է հարթաքթերի ընտանիքի մեկ նոր տեսակ՝ Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ- Myotis bechsteinii:

Резюме

Отряд рукокрылых (Chiroptera) НКР представлен тремя семействами: подковоносые-Rhinolophidae (пять видов), гладконосые или обыкновенные летучие мыши- Vespertilionidae (девятнадцать видов), бульдоговые- Mollosidae (один вид).

В результате продолжительных исследований нами был выявлен новый для фауны НКР вид Myotis bechsteinii.

Գրականություն

1. Даль С.К., Животный мир Армянской ССР, Ереван, 1954.
2. Кузякин А.П., Летучие мыши, Москва, 1950.
3. Է.Գ.Յավրույան, Վ.Տ.Հայրապետյան, Ղարաբաղի վայրի կայանատները, ք.Ստեփանակերտ, 2003, բաժին I: