Զ Ե Կ Ո Ւ Յ Ց Ն Ե Ր
Д О К Л А Д Ы

XXXI, № 1

1960

Խմբագրական կոլեգիա

Գ. Ս. ԴԱՎԹՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս,
Վ. Մ. ԹԱՌԱՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԳԱ քրթակից-անդամ,
Վ. Հ. ՀԱՄԲԱՐՉՈՒՄՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԳԱ ակադե-
միկոս, Վ. Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ (պատ. խմբագրի
տեղակալ), Ս. Ս. ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՀՍՍՌ ԳԱ
ակադեմիկոս, Ա. Գ. ՆԱԶԱՐՈՎ, ՀՍՍՌ ԳԱ
ակադեմիկոս, Մ. Մ. ՋՐԲԱՇՅԱՆ, ՀՍՍՌ
ԳԱ ակադեմիկոս (պատ. խմբագիր):

Редакционная коллегия

В. А. АМБАРЦУМЯН, академик АН
АрмССР, Г. С. ДАВТЯН, академик АН
АрмССР, М. М. ДЖРБАШЯН, академик
АН АрмССР (отв. редактор), В. О.
КАЗАРЯН (зам. отв. редактора), С. С.
МКРТЧЯН, академик АН АрмССР, А. Г.
НАЗАРОВ, академик АН АрмССР, В. М.
ТАРАЯН, чл.-корресп. АН АрмССР.

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մարեմարիկա

Ա. Ա. Թալալյան և Է. Մ. Քեհեյան—Միավոր շրջանում միջին բազմանդամային մոտարկման մասին 3

Առաձգականության թեսուրյուն

Բ. Լ. Աբրահամյան—Կորագիծ անկյունակի տեսքով լայնական կտրվածք ունեցող պրիզմատիկ ձողերի ոլորումը 9

Ֆիզիկա

Թ. Լ. Ասարիանի, Վ. Մ. Քրիշչյան և Խ. Հ. Շահխաբունյան—Կոսմիկական ճառագայթման μ -մեզոնների բևեռացումը 15

Ասերոֆիզիկա

Խ. Հ. Սահակյան—Գալակտիկաների դեֆորմացիան բախման հետևանքով 19

Դինամիկական օդերևութաբանություն

Խ. Ն. Զեյբունյան—Փոքր մասշտաբի կոնվեկցիայի տեսութայան մասին 29

Դեղագործական բիոֆիա

Ա. Լ. Մնշոյան, ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս, Հ. Լ. Պապայան և Ն. Մ. Սհանջյանյան—Հիտադոտություն տեղակայված քաղախաթթուների ածանցյալների բնագիտություն: Հաղորդում XXI 37

Հանրաբանություն

Շ. Հ. Ամիրյան—Ոսկու հանքավայրերից մեկի միներալոգիայի շուրջը 43

Սերաթիզաֆիա

Կ. Հ. Մկրտչյան—Նոր տվյալներ Լոռու սինկլինորիումի տրանսգրեսիվ շերտախմբի վերին հասակի մասին 49

Ա. Ն. Նուգարյան—Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՌ Հրազդանի շրջանի ալերոլիտային ապարների հատակի մասին 53

Ֆիզիոլոգիա

Գ. Ն. Գրիգորյան—Ողնուղեղի ետևի սյունների մորֆոլոգիայի և ֆունկցիայի հարցի շուրջը 57

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Математика	
<i>А. А. Талалян и Э. М. Кегеян</i> — О средней полиномиальной аппроксимации в единичном круге	3
Теория упругости	
<i>Б. Л. Абрамян</i> — Кручение призматических стержней с поперечным сечением в виде криволинейного уголка	9
Физика	
<i>Т. Л. Асатиани, В. М. Крицян и Р. О. Шархатунян</i> — Поляризация μ^+ -мезонов космического излучения	15
Астрофизика	
<i>Р. А. Саакян</i> — О деформации галактик при столкновениях	19
Динамическая метеорология	
<i>Х. Н. Зейтунян</i> — К теории конвекции малого масштаба	29
Фармацевтическая химия	
<i>А. Л. Мнджоян</i> , академик АН Армянской ССР, <i>Г. Л. Папоян</i> и <i>Н. Н. Оганджанян</i> — Исследование в области производных замещенных уксусных кислот. Сообщение XXI	37
Минералогия	
<i>Ш. О. Амирян</i> — К минералогии золоторудных месторождений	43
Стратиграфия	
<i>К. А. Мкртчян</i> — Новые данные о верхнеэоценовом возрасте трансгрессивной свиты лорийского синклинория Армянской ССР	49
<i>А. Е. Назарян</i> — Новые данные о возрасте алевролитовых пород Разданского района Армянской ССР	53
Физиология	
<i>Г. Е. Григорян</i> — К морфофункциональной организации задних столбов спинного мозга	57

МАТЕМАТИКА

А. А. Талалян и Э. М. Кегеян

О средней полиномиальной аппроксимации в единичном круге

Представлено академиком АН Армянской ССР А. Л. Шагиняном 29.1 1960

Обозначим через D круг $|z| < 1$ в комплексной плоскости.

Известно, что если G область типа Каратеодори, т. е. область, граница которой совпадает с границей дополнительной области, содержащей бесконечно далекую точку, то в классе $H_2(G)$, т. е. в классе аналитических в области G функций $f(z)$, для которых

$$\iint_G |f(z)|^2 d\sigma < \infty, \quad (1)$$

где $d\sigma$ — элемент площади, возможна полиномиальная аппроксимация в среднем, т. е.

$$\inf_{\{P\}} \iint_G |f(z) - P(z)|^2 d\sigma = 0 \quad (2)$$

(см., например, ⁽¹⁾).

Далее А. Л. Шагиняном ⁽²⁾ было доказано, что если ограничиться только теми полиномами, которые имеют фиксированные значения в заданном конечном числе точек границы, то в областях типа Каратеодори опять имеет место аппроксимация вида (2).

В связи с этим, в настоящей заметке рассматривается следующая задача.

Пусть $f(z)$ произвольная функция из класса $H_2(D)$, а $\varphi(\theta)$ произвольная другая действительная и измеримая функция, заданная на отрезке $[0, 2\pi]$ (заметим, что $\varphi(\theta)$ может равняться бесконечности на множестве положительной меры).

Ищутся полиномы $P_n(z)$, для которых

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_D |f(z) - P_n(z)|^2 d\sigma = 0$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} P_n(e^{i\theta}) = \varphi(\theta)$$

почти всюду на интервале $(0, 2\pi)$.

Предварительно докажем следующую теорему.

Теорема 1. Если $f(z) \in H_2(D)$ произвольная функция, а $\varphi(\theta) \in L_2(0, 2\pi)$ произвольная другая действительная функция, то для любого $\varepsilon > 0$ существует полином $P(z)$, такой, что

$$1) \iint_D |f(z) - P(z)|^2 d\sigma < \varepsilon$$

$$2) \text{mes } E(|\varphi(\theta) - \text{Re}P(e^{i\theta})| > \varepsilon) < \varepsilon$$

При доказательстве этой теоремы используется следующая лемма, доказанная в (3).

Лемма 1: Если на отрезке $\Delta = [ab]$ заданы функции $\psi_0(x)$, $\psi_1(x) \dots \psi_n(x)$, которые принадлежат пространству $L_2(a, b)$, то для любых положительных η и $\delta < 1$ можно найти функцию $f(x) \in L_2(a, b)$ такую, что

$$1) \text{mes } E\{f(x) \neq 0\} \leq \delta(b-a)$$

$$2) \int_{\Delta} f^2(x) dx \leq \frac{1}{\delta} \int_{\Delta} \psi_0^2(x) dx$$

и, наконец,

$$3) \left| \int_{\Delta} \psi_0(x) \psi_k(x) dx - \int_{\Delta} f(x) \psi_k(x) dx \right| < \eta$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

Легко видеть, что из этой леммы непосредственно следует

Лемма 1': Пусть $\psi_0(\theta), \psi_1(\theta), \dots, \psi_n(\theta)$ произвольные действительные функции из класса $L_2(0, 2\pi)$. Тогда для любых положительных чисел $\delta < 1$ и η существует в классе $L_2(0, 2\pi)$ функция $\psi(\theta)$, обладающая следующими свойствами:

$$1) \text{mes } E(\psi_0 \neq \psi) \leq \delta 2\pi$$

$$2) \left| \int_0^{2\pi} \psi(\theta) \psi_k(\theta) d\theta \right| < \eta$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

$$3) \|\psi\|^2 \leq \frac{4}{\delta} \|\psi_0\|^2$$

где $E(\psi_0 \neq \psi)$ — множество тех точек θ отрезка $(0, 2\pi)$, для которых $\psi_0(\theta) \neq \psi(\theta)$, а $\|\psi\|$ — норма функции ψ в пространстве $L_2(0, 2\pi)$.

Очевидно, если положим $\psi = \psi_0 - f$, где f функция, удовлетворяющая условиям леммы 1 (при этом полагается $(a, b) \equiv (0, 2\pi)$) то ψ будет удовлетворять условиям леммы 1'.

Переходя к доказательству теоремы, заметим прежде всего, что существует полином $S(z)$ такой, что

$$\iint_D |f(z) - S(z)|^2 d\sigma < \frac{\varepsilon}{4}. \quad (3)$$

Обозначим через

$$\psi_0(\theta) = \varphi(\theta) - \operatorname{Re} S(e^{i\theta}). \quad (4)$$

Докажем, что существует полином $Q(z)$, обладающий следующими свойствами:

$$1) \iint_D |Q(z)|^2 d\sigma < \frac{\varepsilon}{4}$$

$$2) \operatorname{mes} E(|\psi_0(\theta) - \operatorname{Re} Q(e^{i\theta})| > \varepsilon) < \varepsilon.$$

Ясно, что при наличии такого многочлена $Q(z)$, многочлен $P(z) = Q(z) + S(z)$ в силу (3) и (4) будет обладать следующими свойствами

$$1) \iint_D |f(z) - P(z)|^2 d\sigma = \iint_D |(f(z) - S(z)) - Q(z)|^2 d\sigma <$$

$$< (\|f - S\| + \|Q\|)^2 < \left(\frac{\sqrt{\varepsilon}}{2} + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{2} \right)^2 = \varepsilon$$

$$2) \operatorname{mes} E(|\varphi(\theta) - \operatorname{Re} P(e^{i\theta})| > \varepsilon) =$$

$$= \operatorname{mes} E(|\psi_0(\theta) - \operatorname{Re} Q(e^{i\theta})| > \varepsilon) < \varepsilon$$

т. е. теорема будет доказана.

Для построения полинома $Q(z)$ возьмем положительное целое число n_0 и положительное число η , удовлетворяющие неравенствам

$$\frac{16\pi \|\psi_0\|^2}{n_0} < \frac{\varepsilon^2}{8} \quad (5)$$

$$\eta < \sqrt{\frac{\pi\varepsilon}{8(n_0+1)}} \quad (6)$$

В лемме 1' возьмем вместо ψ_0 функцию, определенную равенством (4), а за функции $\psi_1(\theta), \psi_2, \dots, \psi_n(\theta)$ возьмем первые $(2n_0 + 1)$ функции тригонометрической системы

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin \theta}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos \theta}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin n_0 \theta}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos n_0 \theta}{\sqrt{\pi}}, \dots$$

Из этой леммы следует, что существует функция $\psi(\theta)$, такая, что

$$1) \operatorname{mes} E(\psi \neq \psi_0) \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad (7)$$

$$2) \left| \int_0^{2\pi} \psi(\theta) \cos k\theta d\theta \right| < \eta, \quad \left| \int_0^{2\pi} \psi(\theta) \sin k\theta d\theta \right| < \eta \quad (8)$$

$$k = 0, 1, \dots, n_0$$

$$3) \|\psi\|^2 < \frac{16\pi \|\psi_0\|^2}{\varepsilon} \quad (9)$$

(в лемме 1' вместо δ взято $\frac{\varepsilon}{4\pi}$).

Так как $\psi(\theta) \in L_2(0, 2\pi)$, то существует число N такое, что при $n > N$ для всех частных сумм n -го порядка ряда Фурье функции $\psi(\theta)$ имеем

$$\int_0^{2\pi} \left| \psi(\theta) - \left(\frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\sqrt{\pi}} \cos k\theta + \frac{b_k}{\sqrt{\pi}} \sin k\theta \right) \right|^2 d\theta < \frac{\varepsilon^3}{2}, \quad (10)$$

где

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \psi(\theta) d\theta, \quad a_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} \psi(\theta) \cos k\theta d\theta, \quad (11)$$

$$b_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} \psi(\theta) \sin k\theta d\theta.$$

Обозначим через

$$Q(z) = \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{k=1}^n \left(\frac{a_k}{\sqrt{\pi}} - i \frac{b_k}{\sqrt{\pi}} \right) z^k.$$

Из (10) имеем

$$\int_0^{2\pi} |\psi(\theta) - \operatorname{Re}Q(e^{i\theta})|^2 d\theta < \frac{\varepsilon^3}{2}. \quad (12)$$

С другой стороны

$$\begin{aligned} \iint_D |Q(z)|^2 d\sigma &= \iint_D Q(z) \overline{Q(z)} d\sigma = \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k^2 + b_k^2}{k+1} = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n_0} + \sum_{n_0+1}^n. \end{aligned}$$

В силу (6), (8) и (11) будем иметь

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n_0} \frac{a_k^2 + b_k^2}{k+1} < \frac{\eta^2 (n_0 + 1)}{\pi} < \frac{\varepsilon}{8}.$$

Далее, из неравенства Бесселя из (5) и (9) вытекает

$$\sum_{n_0+1}^n \frac{a_k^2 + b_k^2}{k+1} < \frac{1}{n_0} \|\psi\|^2 < \frac{16\pi \|\psi_0\|^2}{n_0 \cdot \varepsilon} < \frac{\varepsilon}{8}.$$

Так что окончательно получаем

$$\iint_D |Q(z)|^2 d\sigma < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Но из (12) вытекает, что

$$\text{mes} (|\psi(\theta) - \text{Re}Q(e^{i\theta})| > \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда, учитывая (7), получаем

$$\text{mes} (|\psi_0(\theta) - \text{Re}Q(e^{i\theta})| > \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Теорема доказана.

Теперь легко доказать, что задача, сформулированная вначале настоящей статьи, имеет положительное решение, а именно, справедлива

Теорема 2: Если $f(z) \in H_2(D)$ произвольная функция, а $\varphi(\theta)$ произвольная другая измеримая функция, то существует последовательность многочленов $P^{(k)}(z)$ такая, что

$$1) \lim_{k \rightarrow \infty} \iint_D |f(z) - P^{(k)}(z)|^2 d\sigma = 0$$

$$2) \lim_{k \rightarrow \infty} \text{Re}P^{(k)}(e^{i\theta}) = \varphi(\theta)$$

почти всюду на интервале $(0, 2\pi)$.

Обозначим через

$$\varphi_k(\theta) = \begin{cases} \varphi(\theta) & \text{если } |\varphi| \leq k \\ k & \text{если } |\varphi| > k \end{cases}$$

и возьмем последовательность положительных чисел ε_k , где

$$\sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (13)$$

Согласно теореме 1, для каждого ε_k существует полином $P_{(\cdot)}^{(k)}$ такой, что

$$\iint_D |f(z) - P_{(\cdot)}^{(k)}|^2 d\sigma < \varepsilon_k \quad (14)$$

и

$$\text{mes } E (|\varphi_k(\theta) - \text{Re}P^{(k)}(e^{i\theta})| > \varepsilon_k) < \varepsilon_k. \quad (15)$$

Обозначим через

$$F_k = [0, 2\pi] - E(|\varphi_k(\theta) - \operatorname{Re} P^{(k)}(e^{i\theta})| > \varepsilon_k) \quad (16)$$

и

$$E_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{k=n}^{\infty} E_k. \quad (17)$$

Из (13), (15) и (16) следует, что

$$\operatorname{mes} E_0 = 2\pi.$$

Легко видеть, что при $\theta \in E_0$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \operatorname{Re} P^{(k)}(e^{i\theta}) = \varphi(\theta).$$

Если в теореме 2 возьмем $\varphi(\theta) \equiv +\infty$, получим

Следствие: Для каждого $f(z) \in H_2(D)$ существует последовательность многочленов $P_{(z)}^{(k)}$, такая, что

$$1) \lim_{k \rightarrow \infty} \iint_D |f(z) - P_{(z)}^{(k)}| dz = 0.$$

$$2) \lim_{k \rightarrow \infty} |P^{(k)}(e^{i\theta})| = \infty.$$

п. в. на $(0, 2\pi)$.

Институт математики и механики
Академии наук Армянской ССР

Ա. Ա. ՅԱԼԱԼՅԱՆ և Է. Մ. ՔԵԶԵՅԱՆ

Միավոր շրջանում միջին բազմանդամային մոտարկման մասին

Ներկա հոդվածում հիմնականում ապացուցվում է հետևյալ արդյունքը.

Թեորեմ.— Ինչպիսին էլ լինի $|\xi| = 1$ շրջանագծի վրա տրված $\varphi(\xi)$ իրական և չափելի ֆունկցիան (որը կարող է հավասար լինել անվերջի դրական չափի բազմադրյան վրա), և ինչպիսին էլ լինի միավոր շրջանում միջին բազմակուսիտվ ինտեգրելի $f(z)$ ֆունկցիան, միշտ հնարավոր է գտնել $\{P_{(z)}^{(k)}\}$ բազմանդամներ, որոնց համար

$$1. \lim_{k \rightarrow \infty} \iint_{|z| < 1} |f(z) - P_{(z)}^{(k)}|^2 dz = 0.$$

$$2. \lim_{k \rightarrow \infty} \operatorname{Re} P^{(k)}(\xi) = \varphi(\xi).$$

համարյա ամենուրեք $|\xi| = 1$ շրջանագծի վրա:

ЛИТЕРАТУРА — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ А. И. Маркушевич, Теория аналитических функций, стр. 428. ² А. Л. Шагинян, ДАН АрмССР, т. XVI, № 1 (1953). ³ С. Качмаж, Г. Штейнгауз, Теория ортогональных рядов, стр. 374.

Б. Л. Абрамян

Кручение призматических стержней с поперечным сечением в виде криволинейного уголка

(Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР С. А. Амбарцумяном 8. III 1960)

В статье рассматривается кручение призматического стержня с поперечным сечением в виде криволинейного уголка (фиг. 1), образованного координатными линиями в эллиптических координатах. Аналогичная задача для прямолинейного уголка решена в работе (3).

Эллиптические координаты использованы в работе А. Соколова (1), который еще до Гринхилля (2) решил задачу о кручении стержня с сечением, образованным двумя конфокальными эллипсами.

В эллиптических координатах α, β , связанных с декартовыми прямоугольными координатами x и y соотношениями

$$x = c \operatorname{ch} \alpha \sin \beta \tag{1}$$

$$y = c \operatorname{sh} \alpha \cos \beta,$$

Фиг. 1.

где $2c$ —межфокусное расстояние, функция напряжений при кручении $U(\alpha, \beta)$ в области поперечного сечения стержня удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial \beta^2} = -c^2 (\operatorname{ch} 2\alpha + \cos 2\beta), \tag{2}$$

а на контуре области сечения обращается в нуль.

Решение задачи ищем в виде (5)

$$U(\alpha, \beta) = \begin{cases} U_1(\alpha, \beta) & \alpha \leq \alpha_2 \\ U_2(\alpha, \beta) & \beta \leq \beta_2 \end{cases} \tag{3}$$

Функции U_1 и U_2 удовлетворяют уравнению (2) и следующим контурным условиям и условиям сопряжения*

* На возможность решения задачи в такой постановке указал мне академик АН АрмССР М. М. Джрбашян.

$$U_1(\alpha, \beta_3) = U_1(\alpha_1, \beta) = U_1(\alpha, \beta_1) = 0 \quad (4)$$

$$U_1(\alpha_2, \beta) = \begin{cases} 0 & \beta \geq \beta_2 \\ U_2(\alpha_2, \beta) & \beta \leq \beta_2 \end{cases} \quad (5)$$

$$U_2(\alpha_1, \beta) = U_2(\alpha, \beta_1) = U_2(\alpha_3, \beta) = 0 \quad (6)$$

$$U_2(\alpha, \beta_2) = \begin{cases} 0 & \alpha \geq \alpha_2 \\ U_1(\alpha, \beta_2) & \alpha \leq \alpha_2 \end{cases} \quad (7)$$

Представляя функции U_1 и U_2 в виде

$$U_1(\alpha, \beta) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(\beta) \sin \mu_k (\alpha - \alpha_1) \quad \mu_k = \frac{k\pi}{\alpha_2 - \alpha_1} \quad (8)$$

$$U_2(\alpha, \beta) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k(\alpha) \sin \gamma_k (\beta - \beta_1) \quad \gamma_k = \frac{k\pi}{\beta_2 - \beta_1} \quad (9)$$

и следуя Г. А. Гринбергу ⁽⁴⁾, для определения функций $f_k(\beta)$ и $\varphi_k(\alpha)$ получим следующие обыкновенные дифференциальные уравнения

$$\begin{aligned} f_k''(\beta) - \mu_k^2 f_k(\beta) &= \frac{2\mu_k}{\alpha_2 - \alpha_1} (-1)^k U_1(\alpha_2, \beta) - \\ &- \frac{2\mu_k c^2}{\alpha_2 - \alpha_1} \frac{\operatorname{ch} 2\alpha_1 + (-1)^{k+1} \operatorname{ch} 2\alpha_2}{4 + \mu_k^2} - \\ &- \frac{2c^2}{k\pi} [1 + (-1)^{k+1}] \cos 2\beta, \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} \varphi_k''(\alpha) - \gamma_k^2 \varphi_k(\alpha) &= \frac{2\gamma_k}{\beta_2 - \beta_1} (-1)^k U_2(\alpha, \beta_2) + \\ &+ \frac{2\gamma_k c^2}{\beta_2 - \beta_1} \frac{\cos 2\beta_1 + (-1)^{k+1} \cos 2\beta_2}{4 - \gamma_k^2} - \frac{2c^2}{k\pi} [1 + (-1)^{k+1}] \operatorname{ch} 2\alpha. \end{aligned} \quad (11)$$

Решения этих уравнений имеют вид

$$f_k(\beta) = \begin{cases} f_k^{(1)}(\beta) & \beta \geq \beta_2 \\ f_k^{(2)}(\beta) & \beta \leq \beta_2 \end{cases} \quad (12)$$

$$\varphi_k(\alpha) = \begin{cases} \varphi_k^{(1)}(\alpha) & \alpha \geq \alpha_2 \\ \varphi_k^{(2)}(\alpha) & \alpha \leq \alpha_2 \end{cases}, \quad (13)$$

где

$$\begin{aligned} f_k^{(1)}(\beta) &= A_k^{(1)} \operatorname{sh} \mu_k \beta + B_k^{(1)} \operatorname{ch} \mu_k \beta + \\ &+ \frac{2c^2}{k\pi (4 + \mu_k^2)} \{ [\operatorname{ch} 2\alpha_1 + (-1)^{k+1} \operatorname{ch} 2\alpha_2] + [1 + (-1)^{k+1}] \cos 2\beta \}, \end{aligned} \quad (14)$$

$$f_k^{(2)}(\beta) = A_k^{(2)} \operatorname{sh} \mu_k \beta + B_k^{(2)} \operatorname{ch} \mu_k \beta + \frac{2c^2}{k\pi(4 + \mu_k^2)} \{ |\operatorname{ch} 2x_1 + (-1)^{k+1} \operatorname{ch} 2x_2| + |1 + (-1)^{k+1}| \cos 2\beta \} + \frac{2\mu_k}{\alpha_2 - \alpha_1} (-1)^{k+1} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{\varphi_p(\alpha_2) \sin \gamma_p(\beta - \beta_1)}{\gamma_p^2 + \mu_k^2} \quad (15)$$

$$\varphi_k^{(1)}(x) = C_k^{(1)} \operatorname{sh} \gamma_k x + D_k^{(1)} \operatorname{ch} \gamma_k x - \frac{2c^2 \cos 2\beta_1 + (-1)^{k+1} \cos 2\beta_2}{k\pi(4 - \gamma_k^2)} - \frac{2c^2 [1 + (-1)^{k+1}]}{k\pi \gamma_k (4 - \gamma_k^2)} \{ \gamma_k \operatorname{ch} 2x - 2 \operatorname{sh} 2x_2 \operatorname{sh} \gamma_k(x - x_2) - \gamma_k \operatorname{ch} 2x_2 \operatorname{ch} \gamma_k(x - x_2) \} \quad (16)$$

$$\varphi_k^{(2)}(x) = C_k^{(2)} \operatorname{sh} \gamma_k x + D_k^{(2)} \operatorname{ch} \gamma_k x - \frac{2c^2 \cos 2\beta_1 + (-1)^{k+1} \cos 2\beta_2}{k\pi(4 - \gamma_k^2)} - \frac{2c^2 [1 + (-1)^{k+1}]}{k\pi \gamma_k (4 - \gamma_k^2)} \{ \gamma_k \operatorname{ch} 2x - 2 \operatorname{sh} 2x_1 \operatorname{sh} \gamma_k(x - x_1) - \gamma_k \operatorname{ch} 2x_1 \operatorname{ch} \gamma_k(x - x_1) \} + \frac{2\gamma_k}{\beta_2 - \beta_1} (-1)^{k+1} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{f_p(\beta_2) \sin \mu_p(x - \alpha_1)}{\mu_p^2 + \gamma_k^2} \quad (17)$$

Кроме условий

$$f_k^{(1)}(\beta_3) = f_k^{(2)}(\beta_1) = 0 \quad (18)$$

$$\varphi_k^{(1)}(x_3) = \varphi_k^{(2)}(x_1) = 0,$$

вытекающих из (4) и (6), для обеспечения непрерывности функций $f_k(\beta)$ и $\varphi_k(x)$ в соответствующих интервалах должны быть выполнены и следующие условия:

$$f_k^{(1)}(\beta_2) = f_k^{(2)}(\beta_2), \quad \varphi_k^{(1)}(x_2) = \varphi_k^{(2)}(x_2) \quad (19)$$

$$f_k^{(1)' }(\beta_2) = f_k^{(2)' }(\beta_2), \quad \varphi_k^{(1)' }(x_2) = \varphi_k^{(2)' }(x_2). \quad (20)$$

Удовлетворив условиям (18) и (19) и исключая в выражениях (16) и (17) коэффициенты $A_k^{(i)}$, $B_k^{(i)}$, $C_k^{(i)}$ и $D_k^{(i)}$, для функций $f_k^{(i)}(\beta)$ и $\varphi_k^{(i)}(x)$ получим следующие выражения:

$$f_k^{(1)}(\beta) = B_k^{(1)} \frac{\operatorname{sh} \mu_k(\beta_3 - \beta)}{\operatorname{sh} \mu_k \beta_3} + \frac{2c^2 \operatorname{ch} 2x_1 + (-1)^{k+1} \operatorname{ch} 2x_2}{k\pi(4 + \mu_k^2)} \left(1 - \frac{\operatorname{sh} \mu_k \beta}{\operatorname{sh} \mu_k \beta_3} \right) + \frac{2c^2}{k\pi} [1 + (-1)^{k+1}] \frac{\cos 2\beta - \cos 2\beta_3 \operatorname{sh} \mu_k \beta \operatorname{csch} \mu_k \beta_3}{4 + \mu_k^2} \quad (21)$$

$$f_k^{(2)}(\beta) = B_k^{(2)} \frac{\operatorname{sh} \mu_k(\beta_3 - \beta_2) \operatorname{sh} \mu_k(\beta - \beta_1)}{\operatorname{sh} \mu_k \beta_3 \operatorname{sh} \mu_k(\beta_2 - \beta_1)} + \frac{2c^2 \operatorname{ch} 2x_1 + (-1)^{k+1} \operatorname{ch} 2x_2}{k\pi(4 + \mu_k^2)} \left[1 - \right.$$

$$\begin{aligned}
& - \left. \frac{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1)} - \frac{\operatorname{sh} \mu_k \beta_2 \operatorname{sh} \mu_k (\beta - \beta_1)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1) \operatorname{sh} \mu_k \beta_3} \right] + \\
& + \frac{2c^2}{k\pi} [1 + (-1)^{k+1}] \frac{1}{4 + \mu_k^2} \left[\cos 2\beta - \cos 2\beta_1 \frac{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1)} - \right. \\
& \quad \left. - \cos 2\beta_3 \frac{\operatorname{sh} \mu_k \beta_2 \operatorname{sh} \mu_k (\beta - \beta_1)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1) \operatorname{sh} \mu_k \beta_3} \right] + \\
& + \frac{2\mu_k}{\alpha_2 - \alpha_1} (-1)^{k+1} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{\varphi_p(\alpha_2) \sin \gamma_p (\beta - \beta_1)}{\gamma_p^2 + \mu_k^2}. \quad (22)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varphi_k^{(1)}(x) = & D_k^{(1)} \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (\alpha_3 - x)}{\operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3} - \frac{2c^2 [\cos 2\beta_1 + (-1)^{k+1} \cos 2\beta_2]}{k\pi (4 - \gamma_k^2)} \left(1 - \right. \\
& \left. - \frac{\operatorname{sh} \gamma_k x}{\operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3} \right) - \frac{2c^2 [1 + (-1)^{k+1}]}{k\pi \gamma_k (4 - \gamma_k^2)} \left[\gamma_k (\operatorname{ch} 2x - \operatorname{ch} 2\alpha_3 \frac{\operatorname{sh} \gamma_k x}{\operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3}) + \right. \\
& \left. + \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (\alpha_3 - x)}{\operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3} (2 \operatorname{sh} 2\alpha_2 \operatorname{sh} \gamma_k \alpha_2 - \gamma_k \operatorname{ch} 2\alpha_2 \operatorname{ch} \gamma_k \alpha_2) \right], \quad (23)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varphi_k^{(2)}(x) = & D_k^{(1)} \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (\alpha_3 - x_2) \operatorname{sh} \gamma_k (x - x_1)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1) \operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3} - \\
& - \frac{2c^2 [\cos 2\beta_1 + (-1)^{k+1} \cos 2\beta_2]}{k\pi (4 - \gamma_k^2)} \left[1 - \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1)} - \right. \\
& \left. - \frac{\operatorname{sh} \gamma_k x_2 \operatorname{sh} \gamma_k (x - x_1)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1) \operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3} \right] - \frac{2c^2 [1 + (-1)^{k+1}]}{k\pi \gamma_k (4 - \gamma_k^2)} \left\{ \gamma_k [\operatorname{ch} 2x - \right. \\
& \left. - \operatorname{ch} 2\alpha_3 \frac{\operatorname{sh} \gamma_k x_2 \operatorname{sh} \gamma_k (x - x_1)}{\operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3 \operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1)} - \operatorname{ch} 2\alpha_1 \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1)} \right] + \\
& + \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x - x_1) \operatorname{sh} \gamma_k (\alpha_3 - x_2)}{\operatorname{sh} \gamma_k \alpha_3 \operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1)} [2 \operatorname{sh} 2\alpha_2 \operatorname{sh} \gamma_k \alpha_2 - \gamma_k \operatorname{ch} 2\alpha_2 \operatorname{ch} \gamma_k \alpha_2] \left. \right\} + \\
& + \frac{2\gamma_k}{\beta_2 - \beta_1} (-1)^{k+1} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{f_p(\beta_2) \sin \mu_p (x - x_1)}{\mu_p^2 + \gamma_k^2}. \quad (24)
\end{aligned}$$

Удовлетворив теперь условиям (20) и переходя от неизвестных $B_k^{(1)}$ и $D_k^{(1)}$ к X_k и Y_k , где

$$\begin{aligned}
X_k = & k (-1)^{k+1} f_k^{(1)}(\beta_2) \\
Y_k = & k (-1)^{k+1} \varphi_k^{(1)}(x_2)
\end{aligned} \quad (25)$$

для определения последних получим следующие бесконечные системы линейных уравнений:

$$\left. \begin{aligned} X_k &= \sum_{p=1}^{\infty} a_{kp} Y_p + P_k \\ Y_k &= \sum_{p=1}^{\infty} b_{kp} X_p + Q_k \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

где введены следующие обозначения:

$$\left. \begin{aligned} a_{kp} &= \frac{2\mu_k \operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1) \operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_2)}{(\beta_2 - \beta_1) \operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_1) \cdot (\gamma_p^2 + \mu_k^2)} \\ b_{kp} &= \frac{2\gamma_k \operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1) \operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_2)}{(x_2 - x_1) \operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_1) \cdot (\mu_p^2 + \gamma_k^2)} \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

$$\begin{aligned} P_k &= \frac{2c^2 [\operatorname{ch} 2\alpha_2 + (-1)^{k+1} \operatorname{ch} 2\alpha_1]}{\pi (4 + \mu_k^2)} \left[1 - \frac{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_1)} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_2)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_1)} \right] + \frac{2c^2 [1 + (-1)^{k+1}]}{\pi (4 + \mu_k^2)} \left[\cos 2\beta_2 - \right. \\ &\quad \left. - \cos 2\beta_3 \frac{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_2 - \beta_1)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_1)} - \cos 2\beta_1 \frac{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_2)}{\operatorname{sh} \mu_k (\beta_3 - \beta_1)} \right], \end{aligned} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} Q_k &= - \frac{2c^2 [\cos 2\beta_2 + (-1)^{k+1} \cos 2\beta_1]}{\pi (4 - \gamma_k^2)} \left[1 - \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_1)} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_2)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_1)} \right] - \frac{2c^2 [1 + (-1)^{k+1}]}{\pi (4 - \gamma_k^2)} \left[\operatorname{ch} 2\alpha_2 - \right. \\ &\quad \left. - \operatorname{ch} 2\alpha_3 \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x_2 - x_1)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_1)} - \operatorname{ch} 2\alpha_1 \frac{\operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_2)}{\operatorname{sh} \gamma_k (x_3 - x_1)} \right]; \end{aligned} \quad (29)$$

Системы (26) вполне регулярны, так как из (27) имеем

$$\sum_{p=1}^{\infty} |a_{kp}| < \frac{1}{2} \quad \text{и} \quad \sum_{p=1}^{\infty} |b_{kp}| < \frac{1}{2}. \quad (30)$$

При этом использованы значение суммы

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a} \left(\operatorname{cth} a\pi - \frac{1}{a\pi} \right) \quad (31)$$

и неравенство

$$\frac{\operatorname{sh} (z_2 - z_1) \operatorname{sh} (z_3 - z_2)}{\operatorname{sh} (z_3 - z_1)} < \frac{1}{2} \quad z_3 > z_2 > z_1. \quad (32)$$

Легко видеть, что свободные члены систем (26) ограничены сверху и стремятся к нулю при $k \rightarrow \infty$.

Соотношениями (21)–(24), (8) и (9) функция напряжений $U(a, \beta)$ в области поперечного сечения стержня определяется полностью.

Пользуясь этими выражениями, жесткость при кручении и касательные напряжения определяются по формулам

$$C = G c^2 \int_{\Omega} \int U(\alpha, \beta) (\operatorname{ch} 2\alpha + \cos 2\beta) d\alpha d\beta \quad (33)$$

$$\left. \begin{aligned} \tau_{\alpha z} &= -G \tau g \frac{\partial U}{\partial \beta} \\ \tau_{\beta z} &= -G \tau g \frac{\partial U}{\partial \alpha} \end{aligned} \right\} g = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{2}{\operatorname{ch} 2\alpha + \cos 2\beta}} \quad (34)$$

где G —модуль сдвига, τ —угол закручивания на единицу длины стержня, а Ω —область поперечного сечения стержня.

Аналогичным способом можно получить решения для задач о кручении и изгибе призматических стержней с поперечными сечениями в виде эллипсов с выточками, с разрезами и полостями.

Институт математики и механики
Академии наук Армянской ССР

F. L. UFRUZUUSYAN

Կորագիծ անկյունակի ետսինով լայնական կտրվածք ունեցող պրիզմատիկ ձողերի ոլորումը

Հոդվածում զիտարկվում է լիսլտական կոորդինատային գծերով կազմված կորագիծ անկյունակի տեսքի լայնական կտրվածքով պրիզմատիկ ձողերի ոլորումը:

Քննարկ լուծումը բերված է զծային հավասարումների անվերջ սխտեմների լուծման: Յույց է տրված, որ այդ սխտեմները լիովին ռեզոլյար են և ունեն վերին սահմանափակված ադատ անդամներ, որոնք ղերոյի են ձգտում երբ $k \rightarrow \infty$:

Հոդվածում շարադրված ձևով կարելի է ստանալ նաև երկայնական ախոսներ, կտրվածքներ և փորվածքներ ունեցող էլիսլտի ձևի լայնական կտրվածքներով պրիզմատիկ ձողերի ոլորման և ձռման խնդիրների լուծումները:

ЛИТЕРАТУРА — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ А. П. Соколов, Математический сборник, т. IX, вып. II, отд. I, 1878, 288—339. ² А. Гринхалл, Fluid motion between confocal elliptic and confocal ellipsoids. Quart. Journ. of Math., vol. 16, 1879, 227—256. ³ Н. Х. Арутюнян, ИММ, т. XIII, вып. 1 (1949), 107—112. ⁴ Г. А Гринберг, Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. Изд. АН СССР, 1948. ⁵ Л. В. Канторович, В. И. Крылов, Приближенные методы высшего анализа. М., 1949, стр. 662.

Т. Л. Асатиани, В. М. Кришян и Р. О. Шархатунян

Поляризация μ^+ -мезонов космического излучения

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. И. Алиханяном 26. I 1960)

Теоретический расчет, проведенный в работах (1, 2), и наиболее точный расчет в работе (3) показали, что μ -мезоны космических лучей частично поляризованы. В работах (2, 4) экспериментально определялась степень поляризации μ -мезонов космических лучей и в согласии с теоретическим расчетом оказалась порядка 25%.

В настоящей работе определялась поляризация μ^+ -мезонов, останавливающихся в латунном поглотителе.

Измерялась угловая асимметрия электронов распада, испущенных при остановке μ -мезонов в пластинах камеры Вильсона*.

Работа проводилась на высоте 960 м над уровнем моря. Схема установки дана на фиг. 1.

Фиг. 1.

Ряды счетчиков Гейгера-Мюллера C_1 , C_2 , C_3 включались на совпадения, ряд „А“ — на антисовпадения.

* В работе использовалась прямоугольная камера, сконструированная Кирилловым-Угрюмовым.

Камера срабатывала от остановок μ -мезонов, выделяемых анти-совпадениями C_1, C_2, C_3-A .

В камере располагались 7 латунных пластин, толщиной 4 мм каждая.

Входной импульс μ -мезонов определялся легким строительным веществом 40 г/см^2 над установкой и свинцовым фильтром— 102 г/см^2 между рядами C_1 и C_2 .

Таким образом, импульс μ -мезонов при входе в камеру оказался $\sim 0,37$ Бэв/с. Из полученных фотографий отбирались распады, происходящие при остановках μ -мезонов в пластинах 2—6: дно камеры и свинцовый фильтр, помещенный непосредственно под камерой и над антисовпадательным рядом устранял опасность попадания электронов распада в антисовпадательный ряд.

Необходимым условием при идентифицировании случаев распада являлось—ионизационная остановка μ^+ -мезона с последующим распадом на позитрон, с необходимым градиентом по ионизации между остановившимся μ^+ -мезоном и позитроном. Все случаи обрабатывались на стереокомпараторе. Проверялось сшивание треков μ^+ -мезона и позитрона и определялась глубина места распада в пластине. Типичные случаи распада в верхнюю и нижнюю полусферу приведены на фиг. 2 и 3.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

Было наблюдеено 735 случаев распада, из них 389 случаев—с вылетом позитрона вверх и 346 случаев—с вылетом вниз.

Таким образом, отношение числа позитронов, вылетевших вверх к числу позитронов, вылетевших вниз, $\frac{N_{\text{вверх}}}{N_{\text{вниз}}} = 1,12 \pm 0,06$ (ошибка вероятная).

Замена углов позитронов распада по отношению к вертикали на углы по отношению к направлению μ -мезона при входе в камеру не

меняет полученное отношение (что естественно при столь малом телесном угле : 34° в одной проекции и 12° в другой). Это отношение соответствует степени поляризации μ -мезонов

$$\eta = 0,27 \pm 0,11^*,$$

что согласуется со значением η полученным в предыдущих работах.

Авторы выражают благодарность А. И. Алиханяну и И. И. Гольдману за интерес к работе и обсуждения, К. Я. Краснолобу, С. Г. Атанесяну за участие в измерениях.

Физический институт Академии наук
Армянской ССР

Թ. Լ. ԱՍՍԹԻԱՆԻ, Վ. Մ. ՔՐԻՇՉՅԱՆ և Ռ. Ն. ՇԱՀԽԱԹՈՒՆՅԱՆ

Վտամբկական ճառագայթման μ^+ -մեզոնների բեռացումը

Ճ մմ հաստությու՛ն ունեցող արույրի թիթեղներով Վիլսոնի կամերայի օգնությամբ չափված է $\sim 0,37 \frac{B^{38}}{C}$ իմպուլս ունեցող μ^+ -մեզոնների այդ թիթեղներում արո՛հումից առաջացած պոզիտրոնների անկյունային անհամաչափությունը և որոշված է μ -մեզոնների բեռացումը:

Դիտված 735 տրոհման դեպքերից 389 դեպքերում պոզիտրոնն արձակվել է դեպի վերին կիսաոլորտը (N_d), իսկ մնացած 346 դեպքերում՝ դեպի ներքին կիսաոլորտը (N_n):

Սյուտեղից հարարերությունը

$$N_d / N_n = 1,12 \pm 0,06,$$

որը համապատասխանում է μ -մեզոնների բեռացման աստիճանին

$$\eta = 0,27 \pm 0,11:$$

Ստացված η -ի մեծությունը լավ համընկնում է նախորդ աշխատանքների ար՛դյունքների հետ:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ И. С. Хайкави, Phys. Rev. 108, 1533 (1957). ² Д. М. Фаулер, Х. Примакоф и Р. Д. Сард, Nuovo Cimento Vol. 9 1027 (1958). ³ И. И. Гольдман, ЖЭТФ, 34, 1017; (1958). ⁴ Д. В. Кларк, Д. Хергил, Phys. Rev. 108, 1538, (1957). ⁵ Б. А. Долгошеин, Б. И. Лучков, ЖЭТФ, 36, 610 (1959).

* Величина η определялась по расчету, проделанному для работы (⁵), где использовалась камера Вильсона с пластинами той же толщины.

АСТРОФИЗИКА

Р. А. Саакян

О деформации галактик при столкновениях

(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 21. X 1959)

Плотные скопления галактик типа скоплений Coma и Corona Borealis включают в себе много галактик типа SO, которые не содержат темной материи, а также не имеют спиральных ветвей. Предполагается, что эти галактики по преимуществу состоят из звездного населения второго типа. Свойства таких галактик по Спитцеру и Бааде ⁽¹⁾ объясняются тем, что галактики в плотных скоплениях часто сталкиваются, проходят друг через друга. Вследствие столкновения двух галактик, когда одна из них проходит через другую, они лишаются пылевой материи, которая при столкновении выбрасывается из галактик. После столкновения у них уже не могут образоваться спиральные ветви, так как по мнению Спитцера и Бааде звезды спиральных ветвей образуются из диффузной материи. Однако возникает вопрос, если галактики типа SO пережили столкновение, то почему в строении этих галактик не наблюдается последствий столкновения? Указанные авторы пытаются объяснить это тем, что при прохождении галактик друг через друга в распределении и кинематике звезд почти не происходит изменений. Системы звезд почти не деформируются.

При далеком прохождении двух галактик приращение скорости звезды относительно центра своей галактики можно выразить через:

$$\Delta v_r = \frac{2GM}{v} \left| \frac{\vec{r}_0}{r_0^2} - \frac{\vec{r}_1}{r_1^2} \right|, \quad (1)$$

где M — масса проходящей галактики, G — гравитационная постоянная, v — относительная скорость галактик, r_0 — наименьшее расстояние звезды m от центра проходящей галактики и r_1 — взаимное расстояние центров двух галактик в момент наибольшего сближения.

Однако надо отметить, что при выводе формулы (1) перемещением звезды m по отношению к центру своей галактики за время взаимодействия пренебрегают, а импульс, полученный звездой m от проходящей галактики за время сближения, считают направленным по r_0 . Это можно признать хорошим приближением при далеком прохождении двух га-

лактик, при близком же прохождении и особенно при столкновении (прохождении насквозь) галактики с гигантской галактикой эти допущения не верны, так как в этих случаях расстояние звезды m от центра своей галактики за время сближения так сильно изменяется, что этим изменением нельзя пренебрегать, а импульс, полученный звездой от проходящей галактики за время прохождения, не направлен по r_0 .

Спитцер и Бааде, принимая формулу (1), преобразуют первый член правой части следующим образом:

$$\Delta v = \frac{2GM}{vr_0} = \frac{2v_c^2(r_0)}{v}, \quad (2)$$

где $v_c(r_0)$ — скорость кругового движения звезды в галактике на расстоянии r_0 от центра, принимая, что масса галактики сосредоточена в центре галактики.

Основываясь на данных наблюдений, они считают, что для всех расстояний от центра галактики в галактиках-карликах можно принимать $v_c = 100 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, а в галактиках-гигантах $v_c = 300 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$. Для сред-

них галактик они брали $v_c = 200 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$. Пользуясь формулой (2) и

принимая $v = 2400 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, они получили

$$\Delta v = \frac{2v_c^2}{v} = 33,3 \frac{\text{км}}{\text{сек}}.$$

Затем принимая, что центры галактик при наибольшем сближении находятся на расстоянии $r_1 = 2a_1$, а звезда m на расстоянии a_1 от центра своей галактики, для приращения скорости относительно центра они получают:

а) когда звезда находится между центрами галактик:

$$\Delta v_r = \frac{2GM}{a_1} - \frac{2GM}{2a_1} = 17 \frac{\text{км}}{\text{сек}}; \quad (3)$$

б) когда звезда не находится между центрами галактик, но находится на продолжении линии, соединяющей центры:

$$\Delta v_r = \frac{2GM}{2a_1} - \frac{2GM}{3a_1} = 6 \frac{\text{км}}{\text{сек}}. \quad (4)$$

Исходя из этих результатов они считают, что большая часть звезд должна получать приращения скорости порядка $8 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$. Спитцер и Ба-

аде признают, что вычисления, сделанные ими, грубы, однако они считают, что полученные значения скорее преувеличены. Во-первых, масса проходящей галактики считалась сосредоточенной в ее центре, во-

вторых, вычисленные приращения скорости получены только для случаев, когда направление относительной скорости галактик перпендикулярно к плоскости орбиты. В случаях, когда v не перпендикулярно плоскости орбиты, Δv_r будет меньше. Учитывая эти обстоятельства, они считают, что Δv_r будет порядка примерно $3 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$.

Таким образом, они пришли к выводу, что приращения скорости звезды относительно центра галактики на противоположных сторонах галактики суть малые величины по сравнению с самими скоростями звезд в галактике*. Отсюда следует, что столкновение галактик мало влияет на распределение звезд в галактиках.

Однако заметим, что при определении Δv_r они принимали, что расстояние звезд до центра своей галактики $r_{(0)} = r_0$, но если взять $r_{(0)} > r_0$, то очевидно: $\Delta v_r > 17 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$ и в случае столкновения любой

галактики с галактикой средних размеров, $17 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$ не будет верхним

пределом Δv_r . Затем из вычислений, сделанных Спитцером и Бааде, невозможно понять, для каких расстояний r_0 , r_1 и при какой массе проходящей галактики вычислены Δv_r и Δv . Так, например, можно показать, что при $M = 0,7 \cdot 10^{11}$ солнечных масс⁽¹⁾ вычисления, выполненные Спитцером и Бааде, сделаны не для такого расстояния, при котором галактики сталкиваются, а, наоборот, соответствуют расстоянию между центрами, при котором они все еще находятся на значительном расстоянии друг от друга. В самом деле, принимая $M = 0,7 \cdot 10^{11}$ солнечных масс, $v = 2400 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, $\Delta v = 33 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, из (2) находим: $r_0 \cong 8000$

парсек. Таким образом, считая, что радиус средней эллиптической галактики не больше 5000 пс, получаем, что звезда первой галактики, при сближении со второй галактикой, находилась вне границ последней ($8120 > 5000$).

Из определения Δv следует, что указанные авторы пользуются законами Кеплера, однако наблюдения показывают, что в центральных частях галактик, особенно эллиптических, движение звезд вокруг центра галактик совершается по закону вращения твердого тела и только во внешних частях движение совершается по законам Кеплера⁽²⁾.

Теоретически эти законы можно вывести следующим образом.

* Заметим, что даже приращение скорости звезды $\Delta v_r = 17 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$ не настолько малая величина, чтобы она мало влияла на распределение звезд в галактиках. Подробное обсуждение показывает, что такие величины приращения скорости сильно влияют на распределение звезд в галактиках. На этом мы здесь не будем останавливаться. Это является предметом другой работы.

По (3) в случае, когда галактика имеет ось и плоскость симметрии и кроме равномерного распределения массы в галактике имеется и центральное сгущение массы, движение во внутренних частях галактики в плоскости симметрии определяется уравнением:

$$\frac{d^2r}{dt^2} = \frac{h^2}{r^3} - \frac{3GMk_1}{2a^3e^2} \left[\frac{1}{e} \arcsine - \sqrt{1-e^2} \right] - \frac{kGM}{r^2}, \quad (5)$$

где h — постоянная площадей, M — масса галактики, a — большая полуось, e — эксцентриситет галактики, $k + k_1 = 1$.

В случае круговой орбиты имеем:

$$v = \frac{h}{r}, \quad \frac{d^2r}{dt^2} = 0. \quad (6)$$

Подставив значение h из (5) в (6) находим:

$$v^2 = \frac{3Gk_1M}{2a^3e^2} \left[\frac{1}{e} \arcsine - \sqrt{1-e^2} \right] r^2 + \frac{kGM}{r}. \quad (7)$$

Если звезда находится в центральных частях галактики, можно приближенно принять, что $k = 0$, $k_1 = 1$, тогда из (7):

$$v^2 = \frac{3GM}{2a^3l^2} \left[\frac{1}{e} \arcsine - \sqrt{1-e^2} \right] r^2, \quad (8)$$

а когда звезда находится во внешних частях галактики и эксцентриситет мал, можно приближенно принять: $k = 1$, $k_1 = 0$, тогда из (7) находим:

$$v^2 = \frac{GM}{r}. \quad (9)$$

Таким образом получается, что для определения массы галактики через скорость звезды можно пользоваться формулой (8), когда звезда находится в центральных частях галактики; формулой (9), когда звезда находится во внешних частях галактики, а в промежуточных случаях надо пользоваться формулами подобными (7). Поэтому при определении Δv надо исходить из значения массы галактики, а не из значения скорости звезды в центральных частях галактики, так как для определения массы галактики через скорость этих звезд требуются дополнительные данные.

Определим приращение скорости звезды, когда одна галактика проходит через другую. Рассмотрим следующие случаи. Расстояние звезды от центра галактики равно 5000 пс. Звезда при сближении двух галактик находилась или между их центрами или на линии, соединяющей центры галактик. r_0 и r_1 даны в табл. 1, $M = 10^{11}$ солнечных масс, $v = 2400 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$.

Предположив, что масса проходящей галактики сосредоточена в ее центре, мы составили табл. 1. Однако в действительности масса

галактики распределена во всем ее объеме. Показано, что во всех галактиках при отдалении от центра галактики плотность массы уменьшается. Поэтому для определения приращения скорости звезды, когда галактики столкнутся, надо учесть это обстоятельство.

Об импульсе, полученном звездой, когда две шарообразные галактики сталкиваются. Как известно, импульс, полученный звездой, выражается через:

$$\Delta p = \int_{-\infty}^{\infty} f(r) dt, \quad (10)$$

где $f(r)$ — действующая на звезду сила, а dt — дифференциал времени.

Если звезда галактики 1 находится внутри галактики 2, то ускорение, получаемое этой звездой от стороны галактики 2, будет:

$$f(r) = \frac{GM(r)}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}, \quad (11)$$

где $M(r)$ — масса, заключенная внутри сферы с радиусом r вокруг центра второй галактики.

Из (10) и (11), для приращения скорости звезды, находим:

$$\Delta v = G \int_{-\infty}^{\infty} \frac{M(r) \vec{r}}{r^3} dt. \quad (12)$$

Считая, что при сближении галактик расстояние звезды от центра своей галактики не изменяется, а галактика 2 относительно галактики 1 движется прямолинейно, находим:

$$\Delta v = 2Gr_0 \int_0^{\infty} \frac{M(r)}{r^3} dt, \quad (13)$$

где r_0 — самое короткое расстояние между центрами звезды и галактики 2.

Предполагая, что относительное движение галактик прямолинейное и равномерное, мы можем написать:

$$dt = \frac{dy}{v}, \quad (14)$$

где v — относительная скорость галактик, y — линия, по которой галактика 2 движется относительно галактики 1.

Очевидно в этом случае имеем:

$$r^2 = y^2 + r_0^2, \quad (15)$$

Таблица 1

r_0	r_1	Δv_r
500 пс	5500 пс	700 км
6000	5500	57 сек
1000	6000	300
7000	6000	9
2000	7000	129
9000	7000	11.3

откуда

$$ydy = r dr. \quad (16)$$

Подставив значение y из (15) в (16), откуда значение dy в (14), а откуда значение dr в (13), находим:

$$\Delta v = \frac{2Gr_0}{v} \int_{r_0}^{\infty} \frac{M(r) dr}{r^2 \sqrt{r^2 - r_0^2}}. \quad (17)$$

Интервал (r_0, ∞) разделим на две части: (r_0, a) и (a, ∞) , где a — радиус галактики 2.

В интервале (a, ∞) для приращения скорости звезды имеем:

$$\Delta v_1 = \frac{2GM r_0}{v} \int_a^{\infty} \frac{dr}{r^2 \sqrt{r^2 - r_0^2}} = \frac{2GM}{v r_0} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{a^2}} \right]. \quad (18)$$

В интервале (r_0, a) для приращения скорости, находим:

$$\Delta v_2 = \frac{2Gr_0}{v} \int_{r_0}^a \frac{M(r) dr}{r^2 \sqrt{r^2 - r_0^2}} = \frac{2G}{v r_0} \int_{r_0}^a M(r) d \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{r^2}},$$

откуда после интегрирования получим:

$$\Delta v^2 = \frac{2G}{v r_0} \left[M \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{a^2}} - \int_{r_0}^a \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{r^2}} dM(r) \right]. \quad (19)$$

Из (18) и (19) находим:

$$\Delta v = \frac{2G}{v r_0} \left[M - \int_{r_0}^a \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{r^2}} dM(r) \right]. \quad (20)$$

Для значения $dM(r)$ имеем:

$$dM(r) = 4\pi \rho r^2 dr, \quad (21)$$

где ρ плотность в объеме $4\pi r^2 dr$.

Подставив значение $dM(r)$ из (21) в (20), находим:

$$\Delta v = \frac{2G}{v r_0} \left[M - 4\pi \int_{r_0}^a \rho r^2 \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{r^2}} dr \right]. \quad (22)$$

Примем согласно (5), что плотность в шарообразной системе имеет вид:

$$\rho = \frac{k \pi^{1/2} e^{-\frac{3h^2 GM}{a}}}{h^3 (1 + \omega^2 r^2)} e^{-\frac{4}{3} Gh^2 \pi \bar{\rho} r^2}, \quad (23)$$

где k , h и ω — постоянные величины, $\bar{\rho}$ — среднее значение плотности.

Для максвеловского распределения скоростей имеем: $\omega = 0$,

$$h^2 = \frac{1}{2 \sigma^2}, \quad (24)$$

где σ дисперсия скоростей. Учитывая также, что

$$\bar{\rho} = \frac{3M}{4\pi a^3}, \quad (25)$$

получаем

$$\rho = \rho_0 e^{-b r^2}, \quad (26)$$

где

$$b = \frac{GM}{2a^3 \sigma^2}. \quad (27)$$

Подставив значение ρ из (26) в (22), находим:

$$\Delta v = \frac{2G}{v r_0} \left[M - 4\pi \rho_0 \int_{r_0}^a \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{r^2}} e^{-b r^2} r^2 dr \right], \quad (28)$$

ρ_0 определяется из

$$\rho_0 = \frac{M}{4\pi \int_0^a e^{-b r^2} r^2 dr}. \quad (29)$$

Подставив значение ρ_0 из (29) в (28), находим:

$$\Delta v = \frac{2GM}{v r_0} \left[1 - \frac{\int_{r_0}^a \sqrt{1 - \frac{r_0^2}{r^2}} e^{-b r^2} r^2 dr}{\int_0^a e^{-b r^2} r^2 dr} \right], \quad (30)$$

где $r_0 < a$, а при $r_0 \geq a$ имеем:

$$\Delta v = \frac{2GM}{v r_0}. \quad (31)$$

Если для данных M и a известно σ , тогда b определяется из (27), а Δv из (30).

После численного интегрирования по (30), при значениях: $M = 10^{11}$ солнечных масс, $v = 2000 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, $a = 4000 \text{ пс}$, $\sigma = 100 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, получим, при

$r_0 = 500 \text{ пс}$ $\Delta v = 200 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, а при $r_0 = 1000 \text{ пс}$ $\Delta v = 220 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$.

При $r(0) = 4000 \text{ пс}$ (расстояние звезды от центра своей галактики) для ускорения звезды относительно центра своей галактики при этих

данных находим: при $r_0 = 500$ пс $\Delta v_r = 89 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$, а при $r_0 = 1000$ пс

$\Delta v_r = 120 \frac{\text{км}}{\text{сек}}$. Эти данные помещены в табл. 2.

Таблица 2

r_0	r_1	Δv	Δv_r
500 пс	4500 пс	200 $\frac{\text{км}}{\text{сек}}$	89 $\frac{\text{км}}{\text{сек}}$
5000	4500		11 $\frac{\text{км}}{\text{сек}}$
1000	5000	220	120
6000	5000		16,5

Когда направление v не перпендикулярно плоскости орбиты рассматриваемых звезд, то по Спитцеру и Бааде, как указывалось выше, Δv_r будет меньше, чем в приведенных выше примерах. Однако надо отметить, что это замечание не всегда правильно. Так, например, как видно из (1), в том случае, когда r_0 и r_1 имеют

одно и то же направление, Δv_r не зависит от направления v .

Очевидно, что при встрече двух галактик, среднее Δv_r всех звезд галактики будет меньше, чем среднее Δv_r звезд, находящихся в плоскости, проходящей через центр галактики, к которой направление v перпендикулярно. Однако необходимо подчеркнуть, что для перераспределения звезд в галактике играет роль не среднее приращение скоростей звезд, а индивидуальные приращения, особенно большие приращения скоростей звезд. Поэтому усреднение не имеет здесь большого смысла.

С другой стороны, для определения Δv_r также нет смысла взять массу средней галактики, имея в виду, что различия в массах галактик весьма велики. Особенно большое перераспределение звезд в галактике может происходить, когда она встретится с большой галактикой.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что данные, находящиеся в табл. 2, не являются верхними границами приращения скоростей при сближении двух галактик.

Данные табл. 2 показывают, что, при столкновении с гигантской галактикой, распределение звезд в звездной системе сильно изменяется, так как при этом скорости звезд в галактиках получают значительные приращения. Очевидно, что при столкновении галактик, особенно, когда компактная гигантская галактика проходит через среднюю или маленькую, некоторая часть звезд из последних систем может покинуть свою систему, а возможно стать членом проходящей галактики.

Все это позволяет сделать вывод, что столкновение галактик с гигантскими галактиками поля должно приводить к существенным изменениям в системах, участвующих в столкновении. Поскольку богатые скопления галактик всегда содержат некоторое число подобных гигантских и сверхгигантских объектов, то эффект столкновений заслуживает дальнейшего изучения.

Выражаю глубокую благодарность академику В. А. Амбарцумяну за замечания при выполнении этой работы.

Бюраканская астрофизическая обсерватория
Академии наук Армянской ССР

Ռ. Ն. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Պալակտիկաների գեֆորմացիան բախման հետևանքով

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գալակտիկաների կույտերում գալակտիկաների բախում հնարավոր է: Պալակտիկաների բախման հետևանքով նրանցում կարո- են հանդես գալ նոր երևույթներ: Սպիրոյերը և Բուադեն քննարկելով գալակտիկաների բախման հարցը, եկել են այն եզրակացության, որ գալակտիկաների բախման հետևանքով վերջիններիս մեջ աստղերի վերարաշխում չի կատարվում: Այս աշխատանքում ցույց է տրված, որ նրանց եզրակացությունը ճիշտ չէ: Պարզվում է, որ գալակտիկաների բախման հետևանքով նրանցում կարող են աստղանալ աստղերի զգալի տեղաբաշխում: Հատկապես այդ երևույթները խիստ արտահայտիչ կլինեն, երբ հսկա գալակտիկան բախվի փոքր կամ միջակ գալակտիկայի հետ:

ЛИТЕРАТУРА — ՎՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ Л. Спитцер и В. Бааде, Арж, 113, 2, 413, 1950. ² Н. У. Мэйел и Л. Аллер, Арж, v, 95, 2, 5, 1942. ³ С. Чандрасекар, Принципы звездной динамики, М., 1948. ⁴ Т. Пейдж, Арж, 116, 63, 1952. ⁵ К. Ф. Огородников, Динамика звездных систем, М., 1958.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ

Х. Н. Зейтунян

К теории конвекции малого масштаба

(Представлено академиком АН Армянской ССР Н. Х. Арутюняном 9. XII 1959)

В настоящей работе, используя идею А. А. Дородницына, решается пространственная нелинейная, нестационарная задача о свободной термической конвекции малого масштаба над пересеченной, термически неоднородной местностью, в поле силы Кориолиса с учетом условия теплового баланса на поверхности почвы. Причем вместе с полями температуры и скоростей рассматривается и поле влажности, так как известно, что свободная конвекция представляет наибольший интерес благодаря связанным с ней изменениям температуры и особенно влажности.

Предполагая, что рельеф достаточно плавный, чтобы можно было применить теории пограничного слоя, и отталкиваясь от общей системы уравнений термогидродинамики атмосферы, произведем упрощения теории конвекции (1) и теории пограничного слоя.

Тогда придем к следующей системе уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= -RT \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{p}{P} \right) + \lambda \sin \alpha \vartheta + 2\omega \sin \varphi v + \frac{\partial}{\partial z} v \frac{du}{\partial z}, \\ \frac{dv}{dt} &= -RT \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{p}{P} \right) + \lambda \sin \beta \vartheta - 2\omega \sin \varphi u + \frac{\partial}{\partial z} v \frac{\partial v}{\partial z}, \\ 0 &= -RT \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{p}{P} \right) + \lambda \cos \alpha \cos \beta \vartheta, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\vartheta}{dt} &= -\mu (u \sin \alpha + v \sin \beta + w \cos \alpha \cos \beta) + \frac{\partial}{\partial z} k \frac{\partial \vartheta}{\partial z}, \\ \frac{dq}{dt} &= +\varepsilon (u \sin \alpha + v \sin \beta + w \cos \alpha \cos \beta) + \frac{\partial}{\partial z} k \frac{\partial q}{\partial z}, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \sigma w,$$

$$\frac{\partial \vartheta^*}{\partial t} = \nu^* \frac{\partial^2 \vartheta^*}{\partial z^2} \quad (z < 0),$$

где

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}; \quad \lambda = \frac{g}{T};$$

$$\mu = \gamma_a + \frac{dT}{dz}; \quad \varepsilon = -\frac{dQ}{dz}; \quad \sigma = \frac{g}{RT} + \frac{d \ln T}{dz}.$$

Здесь x, y, z — ортогональные криволинейные координаты; ось x направлена вдоль линии рельефа, z — вверх; t — время; u, v, w — составляющие скорости ветра вдоль осей x, y, z , соответственно; ϑ, p, q — отклонения температуры, давления и влажности от T, P и Q — значений этих элементов в покоящейся атмосфере; R — газовая постоянная для воздуха; g — ускорение силы тяжести; ω — угловая скорость вращения земли; φ — географическая широта места; γ_a — сухоадиабатический градиент; $\alpha(x), \beta(y)$ — углы между горизонтальной плоскостью и осями координат x, y , соответственно; ν, k, ν^* — коэффициенты турбулентной вязкости, турбулентной теплопроводности и температуропроводности почвы; ϑ^* — температура почвы.

В качестве граничных условий примем „прилипание“ и условие теплового баланса у земли

$$\text{при } z = 0 \quad u = v = w = 0; \quad \vartheta = \vartheta^*, \quad q = \bar{b} s \vartheta;$$

$$\lambda^* \frac{\partial \vartheta^*}{\partial z} + \bar{\lambda} \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial z} + \frac{L}{c_p} \frac{\partial q}{\partial z} \right) + \bar{a} \vartheta^* = (1 - \Gamma) r(t), \quad (2)$$

а также затухание свободной конвекции с высотой

$$\text{при } z = +\infty \quad u = v = \vartheta = p = q = 0,$$

$$\text{при } z = -\infty \quad \vartheta^* = 0. \quad (3)$$

В качестве начального условия положим, что в начальный момент свободная конвекция отсутствует, т. е.

$$\text{при } t = 0 \quad u = v = \vartheta = q = \vartheta^* = 0. \quad (4)$$

Здесь $\bar{a}$ и $\bar{b}$ — постоянные величины; $s = s(x, y)$ — будет равно единице над водной поверхностью и будет правильной дробью над поверхностью почвы (²); λ^* и $\bar{\lambda}$ — коэффициенты теплопроводности почвы и воздуха; L — скрытая теплота парообразования; c_p — коэффициент теплоемкости воздуха; Γ — альбеда подстилающей поверхности; $r(t)$ — приходящая к земле длинноволновая и солнечная радиация.

Перейдем теперь к решению задачи, предварительно положив

$$\nu = k = \text{const}, \quad \lambda = \text{const}, \quad \mu = \text{const}^{(x)}, \quad \varepsilon = \text{const}, \quad \sigma = 0;$$

кроме того, пренебрегаем в четвертом и пятом уравнениях системы (1) членом $w \cos \alpha \cos \beta$ по сравнению с членами $u \sin \alpha$ и $v \sin \beta$.

Введем теперь, основываясь, в частности, на условиях (3) и (4), вместо z новую независимую переменную

(x) Стратификация атмосферы в состоянии равновесия, учитываемая в нашей задаче параметром $\mu = \gamma_a + dT/dz$, существенно влияет на характер явления. Этот параметр равновесного состояния будем считать заданной величиной.

$$\zeta = \frac{z}{2\sqrt{vt}}, \quad \left(\zeta^* = \frac{z}{2\sqrt{v^*t}} \right) \quad (5)$$

и заменим

$$\begin{aligned} \vartheta &= \tau^2 \cdot \Theta(x, y, \zeta, \tau), & q &= \tau^2 \cdot \omega(x, y, \zeta, \tau), \\ \vartheta^* &= \tau^2 \cdot \Theta^*(x, y, \zeta^*, \tau), & u &= \tau^4 \cdot \varphi(x, y, \zeta, \tau), \\ v &= \tau^4 \cdot \psi(x, y, \zeta, \tau) & w &= 2v^{1/2}\tau^5 \cdot \sigma(x, y, \zeta, \tau), \end{aligned} \quad (6)$$

где

$$\tau = \sqrt{t}.$$

После соответствующих преобразований уравнения (1) можно записать в виде (давление исключено^(x))

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \varphi}{\partial \zeta} - 8\varphi - 2\tau \frac{\partial \varphi}{\partial \tau} - 8\lambda v^{1/2} \cos \beta \frac{\partial}{\partial x} \left(\cos \alpha \int_{\infty}^{\zeta} \Theta d\zeta \right) \tau + \\ & + 4\lambda \sin \alpha \Theta + 8\omega \sin \varphi \tau^2 \psi = -4\tau^6 \left(\varphi \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \psi \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \sigma \frac{\partial \varphi}{\partial \zeta} \right), \\ & \frac{\partial^2 \psi}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \psi}{\partial \zeta} - 8\psi - 2\tau \frac{\partial \psi}{\partial \tau} - 8\lambda v^{1/2} \cos \alpha \frac{\partial}{\partial y} \left(\cos \beta \int_{\infty}^{\zeta} \Theta d\zeta \right) \tau + \\ & + 4\lambda \sin \beta \Theta - 8\omega \sin \varphi \tau^2 \cdot \varphi = -4\tau^6 \left(\varphi \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi \frac{\partial \psi}{\partial y} + \sigma \frac{\partial \psi}{\partial \zeta} \right), \quad (7) \\ & \frac{\partial^2 \Theta}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \Theta}{\partial \zeta} - 4\Theta - 2\Theta \frac{\partial \Theta}{\partial \tau} - 4\mu \tau^4 (\sin \alpha \varphi + \sin \beta \psi) = \\ & = -4\tau^6 \left(\varphi \frac{\partial \Theta}{\partial x} + \psi \frac{\partial \Theta}{\partial y} + \sigma \frac{\partial \Theta}{\partial \zeta} \right), \\ & \frac{\partial^2 \omega}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \omega}{\partial \zeta} - 4\omega - 2\tau \frac{\partial \omega}{\partial \tau} + 4\varepsilon \tau^4 (\sin \alpha \varphi + \sin \beta \psi) = \\ & = -4\tau^6 \left(\varphi \frac{\partial \omega}{\partial x} + \psi \frac{\partial \omega}{\partial y} + \sigma \frac{\partial \omega}{\partial \zeta} \right), \\ & \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \sigma}{\partial \zeta} = 0, \\ & \frac{\partial^2 \Theta^*}{\partial \zeta^{*2}} + 2\zeta^* \frac{\partial \Theta^*}{\partial \zeta^*} - 4\Theta^* - 2\tau \frac{\partial \Theta^*}{\partial \tau} = 0, \quad (\zeta^* < 0). \end{aligned}$$

На основании полученных уравнений (7) можно заключить, что весьма удобно отыскивать решение в виде рядов по восходящим сте-

(x) После отыскания ϑ возмущение давления p можно вычислить путем квадратуры. В дальнейшем уравнение для p не рассматривается.

нениям τ . Действительно, при этом нелинейные члены, стоящие в правых частях уравнений, не скажутся на первых шести членах разложения, которые, следовательно, определяются из линейных уравнений. Кроме того, коэффициенты такого ряда последовательно определяются друг за другом.

Итак, зададим функцию $r(\tau)$ в виде

$$r(\tau) = \frac{\bar{\lambda}}{2\sqrt{z}} \sum_{n=0}^{\infty} r_n \tau^{n+1}, \quad (8)$$

и, соответственно, будем искать решение в форме

$$\begin{aligned} \Theta(x, y, \zeta, \tau) &= \sum_{n=0}^{\infty} \Theta_n(x, y, \zeta) \tau^n, & \omega(x, y, \zeta, \tau) &= \sum_{n=0}^{\infty} \omega_n(x, y, \zeta) \tau^n, \\ \Theta^*(x, y, \zeta, \tau) &= \sum_{n=0}^{\infty} \Theta_n^*(x, y, \zeta) \tau^n, & \varphi(x, y, \zeta, \tau) &= \sum_{n=0}^{\infty} \varphi_n(x, y, \zeta) \tau^n, \\ \psi(x, y, \zeta, \tau) &= \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n(x, y, \zeta) \tau^n, & \sigma(x, y, \zeta, \tau) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sigma_n(x, y, \zeta) \tau^n. \end{aligned} \quad (9)$$

Тогда граничными условиями для $\Theta_n, \omega_n, \Theta_n^*, \varphi_n, \psi_n, \sigma_n$ будут при $\zeta=0$ $\varphi_n = \psi_n = \sigma_n = 0$; $\Theta_n = \Theta_n^*$; $\omega_n = b \cdot s \cdot \Theta_n$.

$$\frac{\lambda^*}{\bar{\lambda}} \sqrt{\frac{\nu}{\nu^*}} \frac{\partial \Theta_n^*}{\partial \zeta^*} - \left(\frac{\partial \Theta_n}{\partial \zeta} + \frac{L}{c_p} \frac{\partial \omega_n}{\partial \zeta} \right) + \frac{2\sqrt{z}}{\bar{\lambda}} \bar{a} \Theta_{n-1} = (1-\Gamma) r_n. \quad (10)$$

Подставляя ряды (9) в систему (7) и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях τ , мы получим бесконечную систему дифференциальных уравнений с бесконечным числом неизвестных:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varphi_n}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \varphi_n}{\partial \zeta} - 2(n+4) \varphi_n &= 8\lambda \nu^{1/2} \cos \beta \frac{\partial}{\partial x} \left(\cos \alpha \int_{\alpha}^{\zeta} \Theta_{n-1} d\zeta \right) - \\ &- 4\lambda \sin \alpha \Theta_n - 8\omega \sin \alpha \psi_{n-2} + 4 \sum_{k=0}^{n-6} \left(\varphi_k \frac{\partial \varphi_{n-6-k}}{\partial x} + \psi_k \frac{\partial \varphi_{n-6-k}}{\partial y} + \right. \\ &\left. + \sigma_k \frac{\partial \varphi_{n-6-k}}{\partial \zeta} \right), \end{aligned} \quad (11)$$

$$\frac{\partial^2 \psi_n}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \psi_n}{\partial \zeta} - 2(n+4) \psi_n = 8\lambda \nu^{1/2} \cos \alpha \frac{\partial}{\partial y} \left(\cos \beta \int_{\alpha}^{\zeta} \Theta_{n-1} d\zeta \right) -$$

$$- 4\lambda \sin \beta \Theta_n + 8\omega \sin \varphi \varphi_{n-2} + 4 \sum_{k=0}^{n-6} \left(\varphi_k \frac{\partial \psi_{n-6-k}}{\partial x} + \psi_k \frac{\partial \varphi_{n-6-k}}{\partial y} + \sigma_k \frac{\partial \psi_{n-6-k}}{\partial \zeta} \right), \quad (12)$$

$$\frac{\partial^2 \Theta_n}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \Theta_n}{\partial \zeta} - 2(n+2) \Theta_n = 4\mu (\sin \alpha \varphi_{n-4} + \sin \beta \psi_{n-4}) + 4 \sum_{k=0}^{n-6} \left(\varphi_k \frac{\partial \Theta_{n-6-k}}{\partial x} + \psi_k \frac{\partial \Theta_{n-6-k}}{\partial y} + \sigma_k \frac{\partial \Theta_{n-6-k}}{\partial \zeta} \right), \quad (13)$$

$$\frac{\partial^2 \omega_n}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial \omega_n}{\partial \zeta} - 2(n+2) \omega_n = 4\varepsilon (\sin \alpha \varphi_{n-4} + \sin \beta \psi_{n-4}) + 4 \sum_{k=0}^{n-6} \left(\varphi_k \frac{\partial \omega_{n-6-k}}{\partial x} + \psi_k \frac{\partial \omega_{n-6-k}}{\partial y} + \sigma_k \frac{\partial \omega_{n-6-k}}{\partial \zeta} \right), \quad (14)$$

$$\frac{\partial \sigma_n}{\partial \zeta} = - \left(\frac{\partial \varphi_n}{\partial x} + \frac{\partial \psi_n}{\partial y} \right), \quad (15)$$

$$\frac{\partial^2 \Theta_n^*}{\partial \zeta^{*2}} + 2\zeta^* \frac{\partial \Theta_n^*}{\partial \zeta^{*2}} - 2(n+2) \Theta_n^* = 0, \quad (\zeta^* < 0). \quad (16)$$

Для всех n из (16) найдется Θ_n^* ; аналогично этому для $n < 4$ из (13) и (14) найдутся Θ_n и ω_n , затем по значениям Θ_n из (11) и (12) найдутся φ_n и ψ_n , из (15) — σ_n .

Далее, пользуясь этими решениями, легко найдем неизвестные последующих номеров. Начиная с $n \geq 6$, появляются нелинейные члены, как произведения уже найденных ранее линейных членов в виде известной правой части уравнений.

Таким образом, решение системы (11)–(16) с краевыми условиями (10) мы начнем с уравнения

$$\frac{\partial^2 Z_n}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial Z_n}{\partial \zeta} - 2(n+2j) Z_n = 0 \quad (j = 1, 2).$$

Общее решение ⁽³⁾ этого уравнения можно записать в виде

$$Z_n(x, y, \zeta) = c_1 L_{n+2j}(\zeta) + c_2 P_{n+2j}(\zeta), \quad (17)$$

где c_1 и c_2 — постоянные интегрирования, зависящие от x и y . Функции $L_n(\zeta)$ введены в работе ⁽⁴⁾ и имеют вид:

$$L_n(\zeta) = \frac{A_n}{n!} \int_{-\infty}^{\zeta} (\zeta - t)^n \exp(-t^2) dt, \quad (18)$$

$$(A_n = 2nA_{n-2}, \quad A_0 = -\frac{2}{\sqrt{\pi}}, \quad A_1 = 2).$$

$P_n(\zeta)$ — полиномы связаны с полиномами Чебышева-Эрмита следующим образом:

$$P_n(\zeta) = \frac{H_n(i\zeta)}{i^n 2^n n!}. \quad (19)$$

Используя решение (17) в последующих номерах, для тех же функций φ_n , ψ_n , Θ_n и ω_n будем иметь неоднородное уравнение следующего вида:

$$\frac{\partial Z_n^2}{\partial \zeta^2} + 2\zeta \frac{\partial Z_n}{\partial \zeta} - 2(n+2j)Z_n = \sum_{i=0}^m \alpha_i(x, y) L_i(\zeta) + F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta), \quad (20)$$

где $F_{n-6}^{(z_n)}$ — известные функции.

Если обозначить через $f_n(x, y)$ температуру подстилающей поверхности, то решение уравнения (20) при краевых условиях:

$$\begin{aligned} Z_n &= f_n(x, y) \text{ при } \zeta = 0; \\ Z_n &= 0 \text{ при } \zeta = +\infty. \end{aligned}$$

будет иметь вид:

$$\begin{aligned} Z_n(x, y, \zeta) &= f_n(x, y) L_{n+2j}(\zeta) + \sum_{i=0}^m \frac{\alpha_i(x, y)}{2(i-n-2j)} [L_i(\zeta) - L_{n+2j}(\zeta)] + \\ &+ \frac{A_{n+2j-1} 2^{n+2j} \left(\frac{n+2j}{2}\right)!}{A_{n+2j}} \left[P_{n+2j}(\zeta) \int_{\zeta}^{\infty} e^{\zeta^2} L_{n+2j}(\zeta) F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta) d\zeta + \right. \\ &+ \left. L_{n+2j}(\zeta) \int_0^{\zeta} e^{\zeta^2} P_{n+2j}(\zeta) F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta) d\zeta \right] - \frac{A_{n+2j-1}}{A_{n+2j}} L_{n+2j}(\zeta) \times \\ &\times \int_0^{\infty} e^{\zeta^2} L_{n+2j}(\zeta) F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta) d\zeta, \quad (21) \end{aligned}$$

(при четном n).

$$\begin{aligned} Z_n(x, y, \zeta) &= f_n(x, y) L_{n+2j}(\zeta) + \sum_{i=0}^m \frac{\alpha_i(x, y)}{2(i-n-2j)} [L_i(\zeta) - L_{n+2j}(\zeta)] - \\ &- 2^{n+2j-1} \left(\frac{n+2j-1}{2}\right)! \left[P_{n+2j}(\zeta) \int_{\zeta}^{\infty} e^{\zeta^2} L_{n+2j}(\zeta) F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta) d\zeta + \right. \\ &+ \left. L_{n+2j}(\zeta) \int_0^{\zeta} e^{\zeta^2} P_{n+2j}(\zeta) F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta) d\zeta \right], \quad (22) \end{aligned}$$

(при нечетном n).

Причем для φ_n и ψ_n имеем $f_n(x, y) = 0$, для Θ_n имеем $f_n(x, y) = \Theta_n(x, y, 0)$, а для $\omega_n - f_n(x, y) = \bar{b}s\Theta_n(x, y, 0)$.

Заметим, что $F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta) \equiv 0$ для всех $n < 6$ и только начиная с $n = 6$ появляются $F_{n-6}^{(z_n)}$ — как известные функции,

Пользуясь решением для φ_n и ψ_n и краевым условием (10), находим из (15):

$$\tau_n(x, y, \zeta) = - \left(\frac{\partial}{\partial x} \int_0^\zeta \varphi_n d\tau + \frac{\partial}{\partial y} \int_0^\zeta \psi_n d\tau \right). \quad (23)$$

Остается теперь определить $f_n(x, y)$, $\alpha_i(x, y)$ и $F_{n-6}^{(z_n)}(x, y, \zeta)$ для всех случаев, тогда задача решается до конца. Для этого необходимо определить распределение температуры по поверхности почвы.

Например, исключая с помощью уравнения теплового баланса (10) из решения (22) неизвестную температуру подстилающей поверхности, получим:

$$f_n(x, y) = \frac{A_{n+1}}{\Lambda(x, y), A_{n+2}} \left\{ (1 - \Gamma) r_n - \frac{2v^{1/2}}{\bar{\lambda}} \bar{a} f_{n-1}(x, y) + \right. \\ \left. + \sum_{i=0}^m \frac{1}{2(i-n-2)} \left(\frac{A_{n+2}}{A_{n+1}} - \frac{A_i}{A_{i-1}} \right) \left[\alpha_i'(x, y) + \frac{L}{c_p} \alpha_i''(x, y) \right] + \right. \quad (24) \\ \left. + \int_0^\infty e^{\zeta^2} L_{n+2}(\zeta) \left[F_{n-6}'^{(z_n)}(x, y, \zeta) + \frac{L}{c_p} F_{n-6}''^{(z_n)}(x, y, \zeta) \right] d\zeta \right\} \quad (\text{при нечет-}$$

ном n), где

$$\Lambda(x, y) = \frac{\lambda^*(x, y)}{\bar{\lambda}} \sqrt{\frac{v}{v^*(x, y)}} - \left(1 + \frac{L}{c_p} \bar{b}s(x, y) \right);$$

$F_{n-6}'^{(z_n)}$, α_i' и $F_{n-6}''^{(z_n)}$, α_i'' — $F_{n-6}^{(z_n)}$, α_i для Θ_n и ω_n , соответственно.

Таким образом, формулы (21)—(24) дают полное решение поставленной задачи.

Мы надеемся отдельно дать результаты расчета примеров и сравнить эти результаты с наблюдениями (в особенности с наблюдениями над осадками).

В заключение искренне благодарю члена-корреспондента АН СССР И. А. Кибеля, под руководством которого выполнена настоящая работа.

Институт прикладной геофизики
Академии наук СССР

(х) Заметим, что в $F_{n-6}'^{(z_n)}$, α_i' и $F_{n-6}''^{(z_n)}$, α_i'' входят $f_{n-4}(x, y)$, $f_{n-6}(x, y)$, ... и т. л.

Փոքր մասշտաբի կոնվեկցիայի սեռաբյան մասին

Ներկա աշխատանքում լուծվում է փոքր մասշտաբի ազատ ջերմային կոնվեկցիայի ոչ զծային, տարածական և ոչ ստացիոնար խնդիրը, ոչ հարթ տեղի վրա: Հաշվի է առնվում կորիսիսի ուժի ազդեցությունը, ընդ որում ջերմաստիճանի և արագությունների գաղտերի հետ միատեղ դիտվում է և խոնավության գաղտը, քանի որ ազատ կոնվեկցիան ներկայացնում է մեծ հեռաբարձություն ջերմաստիճանի և հատկապես խոնավության փոփոխությունների դեպքում:

Պարզեցնելով մթնոլորտի թերմոհիդրոդինամիկայի ընդհանուր հավասարումների սխեմեմը սահմանային շերտի և կոնվեկցիայի տեսությունների հիման վրա, ստանում ենք (1) հավասարումների սխեմեմը (2) — (4) եզրային և նախնական պայմաններով: (5) — (6) ձևափոխություններից հետո այդ սխեմեմը բերվում է (7) տեսքին: Ելնելով (8)-ի տեսքից, լուծումը որոնվում է (9) — ր տեսքով: Վերջնական ձևով ստացվում է (11) — (16) հավասարումների սխեմեմը (10) պայմաններով: Այս սխեմեմի լուծումը բերվում է ոչ համասեռ, երկրորդ կարգի սովորական դիֆերենցիալ հավասարման լուծմանը:

(21) — (24) բանաձևերը տալիս են խնդրի լուծումը:

ЛИТЕРАТУРА — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ Н. Е. Кочин, И. А. Кибель и Н. В. Розе, Теоретическая гидромеханика, т. I, ГИТТЛ, стр. 545, 1955. ² И. А. Кибель, Введение в гидродинамические методы краткосрочного прогноза погоды, ГИТТЛ, М., 1957. ³ А. М. Мхитарян, Изв. АН АрмССР (сер. физ.-мат. н.), 1 (1955). ⁴ Л. Н. Гутман, Инж. сб., т. 15 (1953).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, академик АН Армянской ССР, Г. Л. Папаян и
 Н. М. Оганджаниян

Исследование в области производных замещенных
 уксусных кислот

Сообщение XXI. Некоторые сложные эфиры тропина

(Представлено 3. II 1960)

Многие алкалоиды, нашедшие применение в практической ме-
 дицине, обладают поливалентным действием. Так, например, атропин
 наряду с выраженными холинолитическими свойствами, обладает спс-
 собностью расширять зрачок, подавлять слюноотделение и т. д.

Разносторонние фармакологические свойства природных соеди-
 нений послужили основой для изыскания их синтетических замени-
 телей с целью получения по возможности более селективно действу-
 ющих лекарственных средств. Строение атропина с одной стороны и
 ацетилхолина с другой привели к синтезу большого числа холиноли-
 тиков ряда аминоэфиров двух-, трехзамещенных уксусных кислот, не-
 которые представители которых, как, например пропиван (1), тразен-
 тин (2), парпанит (3) и другие, обнаруживают в выраженной форме
 отдельные свойства атропина.

Таблица 1

R	Выход в %	Температура плавления в °C			Анализ в %					
		хлоргидрат	йодметилат	йодэтилат	Cl		J			
					вычислено	найдено	йодметилат		йодэтилат	
							вычислено	найдено	вычислено	найдено
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-$	71,0	110—112	253—254	182—184	10,51	10,28	28,66	28,33	27,78	27,51
$\text{CH}_3\text{O}-$	76,0	203—205	255—257	250—252	11,39	11,12	30,45	30,15	29,46	29,23
$\text{CH}_3\text{O}-$	65,3	125—127	258—260	188—190	11,39	11,75	30,45	30,67	29,46	29,17
$\text{CH}_3\text{O}-$ $\text{CH}_3\text{O}-$	69,8	132—134	260—261	208—210	10,30	10,73	28,41	28,55	27,54	27,34
$\text{CH}_3\text{O}-$ $\text{CH}_3\text{O}-$ $\text{CH}_3\text{O}-$	64,5	188—190	257—259	250—252	9,55	9,77	26,62	26,82	25,86	26,08

70,3	184—185	290*
73,7	116—118	248—250
66,2	166—168	244—245
62,7	190—191	222—223
77,5	200—201	288—290

* При этой температуре происходит обугливание.

300*	10.15	10.06	27.91	27.69	27.08	26.80
175—177	10.51	10.73	28.66	28.38	27.78	27.49
220—222	9.22	9.45	25.86	25.62	25.14	25.40
175—177	8.58	8.81	24.47	24.35	23.82	23.95
270—272	9.60	9.96	26.73	26.97	25.97	26.19

Однако, наряду с синтезом и исследованием большого числа аминоэфиров, содержащих алифатические аминоспирты различного строения, сравнительно мало изучены аминоэфиры, содержащие гетероциклические аминоспирты. Даже тропин, входящий в состав атропина, мало использован в синтезах селективно действующих холинолитиков.

Известные на сегодня эфиры тропина — тропацин (4), тропококаин (5) и другие не достаточно характеризуют

значение тропина как аминоспирта. По-видимому отсутствие доступного производственного метода синтеза тропина препятствует его широкому применению в исследовательских работах.

Вопрос использования тропина и других гетероциклических спиртов, по нашему мнению, приобретает решающее значение, так как направленность действия зависит как от удачного сочетания в общей структуре отдельных фрагментов молекулы, так и от состава и строения каждого фрагмента в отдельности.

В настоящей работе мы осуществили синтез эфиров тропина с некоторыми из тех кислот, которые в сочетании с диэтиламиноэтанолом привели к применяемым в практике сильным холинолитическим препаратам. Надо полагать, что подобный синтез расширит наши представления о существенном значении состава и строения аминоспирта в биологической активности полученных соединений и, одновременно, позволит при дальнейшем исследовании их свойств выяснить зависимость от строения использованных кислот.

Так, были получены 3-метокси, 4-метокси, 3,4-диметокси, 3, 4, 5-триметоксибензойные, фенилциклопентанкарбонный, фенилпропилуксусный, фенилметилэтилуксусный, дифенилметилуксусный, дефенилпропилуксусный, флуорен 9-карбонный эфиры тропина.

Аналитические данные и температура плавления солей полученных соединений приведены в табл. I.

Элементарный анализ синтезированных соединений произведен сотрудниками аналитического отдела нашего института С. Н. Тонканын и Л. С. Аракелян.

Экспериментальная часть. В колбу, емкостью 200 мл помещают 0,05 моля (9,8 г) хлорангидрида фенилпропилуксусной кислоты, растворенного в 40 мл сухого бензола, и постепенно при охлаждении добавляют 7,0 г (0,05 моля) тропина, растворенного в 30 мл сухого бензола. Смесь нагревают на водяной бане в течение 6—8 часов и после охлаждения обрабатывают эфирным раствором хлористого водорода для полного перевода образующегося аминоэфира в соответствующий хлоргидрат.

Выпавший осадок отсасывают, тщательно промывают сухим эфиром и перекристаллизовывают из ацетона, осаждая эфиром.

Хлоргидрат тропинового эфира фенилпропилуксусной кислоты— белое кристаллическое вещество; т. пл. 110—112°.

Для фармакологических испытаний были приготовлены также соответствующие йодметилаты и йодэтиллаты действием алкилиодитов на эфирный раствор аминоэфира.

Аналогично были синтезированы и остальные тропиновые эфиры.

Вывод: С целью изучения значения состава и строения аминоспирта в зависимости от строения использованных кислот, были синтезированы не описанные в литературе десять тропиновых эфиров указанных кислот и были приготовлены соответствующие им хлоргидраты, йодметилаты и йодэтиллаты.

Институт тонкой органической химии
Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ. ՄԵՋՈՅԱՆ, Զ. Լ. ՊԱՄՍՅԱՆ ԵՎ Ն. Մ. ՕՉԱՆՋԱՆՅԱՆ

ՀԵՏԱԳՈՏՈՐՅՈՒՆԻ ԵՆԳԱԿԱՎՎԱԾ ԲԱԳՄԻԱՐՐՈՒՆԵՐԻ ԱԾԱՆԳՅԱԼՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հաղորդում XXI, Տրոպինի մի բանի ամինոներներ:

Ինչպես միացութիւնների բիոլոգիական բաղադրամասի ուսումնասիրութիւնները ցույց են տւել, որ նրանցից շատերը ունեն պոլիփալենտ հատկութիւններ: Այսպես՝ հայտնի զեղանյութ ատրոպինը, բացի բոլինոլիտիկ ազդեցութիւնից, ներդրածում է նաև գեղձարտադրութեան վրա, լայնացնում է աչքի բերանը և այլն: Սա, իհարկէ անցանկալի երևույթ է: Այդ պատճառով բաղադրով ուսումնասիրութիւններ են կատարուել ստանալու միացութիւններ, որոնք օժտուած լինեն ընտրողաբար ազդող հատկութիւններով: Այս աշխատանքները հանգեցրել են ամբողջ շարք միացութիւնների սինթեզին, որոնց առանձին ներկայացուցիչները, օրինակ՝ պրոպիլանը (1), տրադենտինը (2), պարպանիտը (3) և մյուսները օժտուած են ատրոպինի այս կամ այն հատկութիւններով և կիրառութիւն են ստացել բժշկութեան մեջ:

Վերոհիշյալ միացութիւնների, որոնք փոխարկյալ բացախաթթուների ամինոներ են, սինթեզներում մեծ մասամբ կիրառուել են ալիֆատիկ ամինոսպիրտներ: Այդ տեսակետից համեմատաբար քիչ են օգտագործուել տարբեր կառուցվածքի նետերոցիկլիկ ամինոսպիրտներ: Նույնիսկ ատրոպինի կառուցվածքի մեջ մտնող բիցիկլիկ ամինոսպիրտ տրոպինը քիչ է օգտագործուել ընտրողաբար ազդող բիոլոգիական միացութիւնների սինթեզներում: Մինչդեռ նետերոցիկլիկ ամինոսպիրտների օգտագործումը սինթեզներում ունի իր առանձնահատուկ նշանակութիւնը՝ քանի որ միացութիւնների բիոլոգիական ազդան ուղղութիւնը կախած է ինչպես ամբողջ մոլեկուլում նրա առանձին մասերի հաջող դասավորումից, այնպես էլ այդ մասերի բաղադրութիւնից և կառուցվածքից:

Ներկա հազորդման մեջ բերվում է որոպինի ամինոսթերոնների սինթեզ այն թթու-
աների հետ, որոնց զուգորդումը ալիֆատիկ ամինոսպիրտ դիէթիլամինոսթանոլի հետ
հանգեցրել է բժշկական պրակտիկայում կիրառութուն զտած որոշ թվով ուժեղ խոլինո-
լիտիկներին:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

- ¹ Б. Н. Гальперн, *P. Bio Arch. intern. Pharmacodynamie*, 59, 149 (1937). (С. А. 32, 9260^o (1938). U. S. 2, 219, 796, oct., 29 (1941), (С. А. 35, 1071¹ (1941)).
- ² К. Мишер, К. Гофман, U. S. 2, 143, 491, Jan. 10 (1939) (С. А. 33, 3077^o (1939)). Brit 483, 258, Apr. 14 (1938). (С. А. 32, 70555 (1938)); Д. Р. Джонсон с Р. М. Рейнольдс, *J. Pharmacol.* 59, 365 (1937), (С. А. 31, 5871¹ (1937)). ³ Р. Доменьёз, *Schw. med. Wschr.* 76, 1282 (1946). ⁴ М. Д. Машковский, *Фармакол. токсикол.* XVI, № 5, 3 (1953).
- ⁵ Р. Готлиб, *Arch. Exp. Path. Pharm.* 97, 113 (1923) (С. А. 17, 2454^o (1923)).

Ш. О. Амирян

К минералогии золоторудных месторождений

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяном 19. I 1960)

Описываемое месторождение находится в Армянской ССР.

В геологическом строении месторождения участвуют интрузивные, эффузивные и осадочные породы Сг₂—Тг возраста. Минерализация представлена оруденелыми зонами, жилами и прожилками.

В составе руд участвуют несколько десятков минералов (табл. 1), которые отлагались в различные стадии рудного процесса. На основании взаимоотношения рудных тел, минералогического состава, структурных и текстурных взаимоотношений руд, нами на месторождении выделяется несколько стадий минерализации:

- 1) дорудная кварцевая
- 2) кварц-пирит-арсенопиритовая
- 3) кварц-карбонат-сульфидная (золотоносная)
- 4) кварц-(халцедоновидный)-карбонат-золоторудная (с Ag, Bi и Te)
- 5) кварц-карбонат-сульфоантимонитовая
- 6) кварц-карбонатная безрудная.

Среди рудных минералов особый интерес представляют теллуриды Au, Ag, Ni, Bi, Cu, Pb, Hg.

В статье обобщены данные рентгеноструктурных, спектральных, химических анализов и микроскопических исследований. Указанными методами в рудах определены: креннерит, калаверит, сильванит, гессит, петцит, теллуровисмутит, тетрадимит, пильзенит (?), алтаит, нагнагит, мелонит, колорадоит, риккардит, вейссит и самородный теллур. Часть золота и теллуридов отлагалась в кварц-карбонат-сульфидную стадию минерализации, а основная часть в кварц-(халцедоновидный)-карбонат золотоносную стадию.

Минералогический состав руд описываемого месторождения

Первичные минералы				Вторичные минералы	
Рудные		Нерудные		часто встречающиеся	редко встречающиеся
часто встречающиеся	редко встречающиеся	часто встречающиеся	редко встречающиеся		
1	2	3	4	5	6
Хромит Пирит	Магнетит Ильменит	Кварц Анкерит	Барит Магнезит	Окислы и гидроокислы железа	Медь сам. Куприт
Арсенопирит Пирротин Кубанит Сфалерит Халькопирит Бл. руды Марказит Линнеит	Гематит Кобальтин Никелин Рутил Раммельсбергит Виоларит Геокронит	Кальцит Халцедон Родонит Родохрозит	Доломит Сидерит	Монтанит Скородит Ковеллин Малахит Азурит Гарниерит Кварц Опал	Эритрин Борнит Аннабергит Бисмит Хризопраз Диксит Брусит Керолит

Теллуриды описываемого месторождения

Название и формула минерала	R* (в %)	ΔR	Поведение при скрещенных николях	Цвет	Твердость**
1	2	3	4	5	6
Калаверит $AuTe_2$	~ 61 для желтых лучей	+ слабо	+ слабо	белый с желтоватым оттенком	Микротвердость: $H_{ср I} = 61,2$ $H_{ср II} = 92$
Креннерит (Au, Ag) Te_2	~ 51 для зеленых лучей, 57— желтых, 59— красных	+ слабо, в иммерсии повышается	Заметно (в светло-серых—желтовато-коричневых тонах)	Кремово-белый	Микротвердость: $H_{ср I} = 36,7$ $H_{ср II} = 62,5$
Сильванит Au_3Te_4	43—60	+ отчетливое	+ сильно (в светло-серых, белых—коричнево-синих тонах)	Кремово-белый	$H >$ чем у алтанта, теллу- ровисмутита, тетрадимита, $<$ чем у крен- нерита, мело- нита, калаве- рита
Гессит A_2Te	~ 41 для желтых лучей	+ в иммерсии	+ отчетливо (в коричневом темно-синем тоне.--)	Светло-серый с коричневым оттенком	Микротвердость: $H_{ср} \sim 37$
Петцит (Ag, Au) $_2Te$	~ 40 для зеленых лучей	—	—	Галенито-белый, по сравнению с гесситом голубоват.	Микротвердость: $H_{ср} \sim 51$

* R измерена фотометрическим окуляром с оптическим клином И. С. Волынского в воздухе (ИМГРЭ)

** Микротвердость измерялась на приборе ПМТ—3 (ИМГРЭ).

1	2	3	4	5	6
Полидимит Золото Тетрадимит Теллуrowис- мутит (Зо- дит) Гессит Алтаит Нагнаит Пильзенит (?) Креннерит Антимонит Галенит	Глаукоdot Миллерит Петцит Висмутит Купровисму- тит Теллур са- мородный Леллингит Смальтин Бравоит Хлоантит Сильванит Калаверит Мелоит Станнин Буланжерит Бурнонит Колорадоит Эмплектит			Магнезит Хлорит Халькозин Непунт Халцедон Каолинит Серицит Фуксит Бисмутит Пситомелан	Сепиолит Заратит Золото Серебро Эммонсит Валентинит Сенармон- тит Кермезит Хризоколла Риккардит Вейссит

Таблица 2

Отношение к реактивам	Формы выделений и другие характерные признаки	Ассоциация с дру- гими минералами	Данные химических, спектральных*** и рент- генометрических**** анализов
7	8	9	10
HNO ₃ , царская водка +, FeCl ₃ + слабо.	Пластинчатые и таб- литчатые	Галенит, булан- жерит, теллуриды, золото	Микроспектральными анализами: Au и Te (много), Ag, Bi, Pb и Sb (следы).
HNO ₃ , FeCl ₃ , KOH +.	Пластинчатые, зерни- стые; спайность в 2-х направлениях. При разрушении образует- ся Au.	Теллуриды, Au, бравоит	Спектральными и мик- роспектральными ана- лизами: Au, Ag, Te (много); Bi, Hg, Sb, Pb, (следы) Cu
HNO ₃ , царская водка +.	Пластинчатые и призм- матические (двойники)	Теллуриды, Au, иногда Py, Cr, asp, Po	Микроспектральным путем установлено Au, Ag, Te.
HNO ₃ , FeCl ₃ , HCl, KOH +.	Зернистые агрегаты. В промежутках зерен тонкие выделения пет- цита и Au.	Теллуриды, Au, Py, Cr, Po, gn, бравоит	Микроспектральными анализами Ag, Te; Химическим путем Ag (много)
HNO ₃ , HCl, FeCl ₃ +.	Изометрические	Теллуриды, Py, Cr, gn, Po, тгк., Au.	Микроспектральным путем: Au, Ag, Te (много), Bi, Hg (следы).

*** Спектральные анализы проводились в ИГН АН АрмССР, а микроспектральные — в Лаборатории люминесцентного анализа ВСЕГЕИ.

**** Рентгенометрические анализы проводились в лабораториях ИМГРЭ и ИГН АН АрмССР.

1	2	3	4	5	6
Алтаит $PbTe$	~ 60 для желтых	—	—	Белый с нежным зе- леноватым оттенком	$H_{ср} = 54,5$
Нагиагит $Au(Pb, Sb, Fe)_6 (Te, S)_{11}$	~ 42	+ слабо	+ слабо (в се- рых тонах)	Светло- серый	$H_{ср} = 106,0$ $H_{ср II}^I = 118,5$
Колорадоит Ag_2Te	~ 38 для желтых лучей	—	—	Серый с корич- невым оттен- ком; с гесситом розово-коричн.	$H_{ср} \sim 59$
Теллуrowис- мутит Bi_2Te_3	~ 53 для зеленых лучей 55—желтых и красных.	+ слабо	+ отчетливо (в серовато- голубых—жел- товато-ко- ричневых то- нах)	Кремозо-белый с розовым от- тенком. В сра- стании с алта- итом розовый.	$H_{ср I} = 46,3$ $H_{ср II} = 60,2$
Тетрадимит Bi_2Te_2S	~ 52 для желтых лучей	+ слабо (в иммерсии)	+ слабо (в светлых— темно-серых тонах)	Белый, незначи- тельно кремо- вый, с теллуrow- висмутитом, се- ро-зеленоватый	$H_{ср I} = 54,8$ $H_{ср II} = 40,4$
Пильзенит (верлит) ? Bi_3Te_2 или $Bi_{2+x}Te_{3-x}$	~ 47 для желтых лучей	+ слабо	+ заметно (в серо-голу- бых—корич- невых то- нах)	Белый с ро- зовым от- тенком	$H_{ср I} = 65,4$ $H_{ср II} = 73,2$
Мелонит $NiTe_2$	56 для желтых лучей	+ заметное (в розовых тонах)	Отчетливо (в светло-жел- тых, коричне- нево—фиоле- товых тонах)	Кремозо- розовые	$H_{ср I} = 86,6$ $H_{ср II} = 161,0$
Риккардит Cu_4Te_3	Не измере- но. $> R$ сфа- лерита. $< R$ бл. руды	Сильно (в красных, фи- олетово-се- рых тонах)	+ сильно (в желтых—ко- ричнево- красных то- нах)	Пятнистый, пурпурно- красный се- ро-фиолето- вый, оран- жевый	Низкая
Вейссит Cu_5Te_3 или Cu_2Te	Не измере- но. $R > R$ сфале- рита, $\sim R$ бл. руды	+ слабо	+ заметно (в голубых то- нах)	Светло-се- рый с голу- боватым от- тенком	Низкая
Самородный теллур Te	R близок R теллуrow- висмутита (~ 56)	+ заметно	+ Сильно (в светлых свет- ло-коричне- вых-серых то- нах)	Кремозо-бе- лый с жел- тым оттен- ком	$H > H$ теллуrowис- мутита, тет- радимита, гессита

7	8	9	10
HNO_3 и $\text{HCl} +$	Изометрические зерна, зернистые агрегаты	Теллуриды, бурнонит, галенит, буланжерит, Pv , asp , cp , Sl , Po , Au .	Микрохимия на Pb и $\text{Te} +$; Микроспектральными анализами Pb , Te (много)
$\text{HNO}_3 +$ (медленно)	Пластинчатые, иногда изогнутые с прямоугольными очертаниями. Паркетобразные двойники.	Теллуриды, Pv , asp бурнонит gn , буланжерит, Po , бравонит, Au	Микрохимия на Pb , Sb , Fe и $\text{Te} +$; Микроспектральным путем: Pb , Au , Sb , Bi , Fe , Te .
HNO_3 , $\text{FeCl}_3 +$ царская водка +	Изометрические, без внутренних рефлексов	Теллуриды, золото	Микроспектральным и спектральным путем: Hg и Te .
HNO_3 , $\text{FeCl}_3 +$	Листоватые, пластинчатые, по спайности и краям развивается тетрадимит	Теллуриды, Au , Pv , Cr , Sl , asp .	Микрохимия на Bi и $\text{Te} +$; спектральными анализами: Bi , Te рентгенометрически +;
HNO_3 , $\text{FeCl}_3 +$	Пластинчатые, листоватые. Спайность совершенная	Теллуриды, Au . Иногда сульфиды.	Микрохимия на Bi , Te и $\text{S} +$; рентгенометрически группа теллуридов висмута.
HNO_3 , HCl , $\text{FeCl}_3 +$	Неправильные, пластинчатые	Теллуриды, золото.	Микроспектральным путем установлены: Ag , Bi , Te (много), Sb , Pb , As , Ni (следы)
HNO_3 , $\text{FeCl}_3 +$ HCl (слабо)	Короткопризматические листоватые: призматические выделения расположены под углом друг относительно друга	Теллуриды, золото, бравонит	Микрохимия на Ni и Te — рентгенометрически + спектральными анализами Ni и Te .
HCl , KCN и $\text{FeCl}_3 +$	Мелкие изометрические зерна	Теллуриды, Au , Cr , Pv , вторичные по теллуридам, халькопириту, пириту.	Микрохимия на Te и $\text{Cu} +$; Микроспектральным путем установлены: Cu , Te , Fe .
Почти все реактивы +	Мелкие неправильной формы	Теллуриды, Au , пирит, халькопирит, вторичные по Pv и Cr .	Микрохимия на Cu и Te положительна. Микроспектральными анализами Cu , Te и Fe .
HNO_3 , FeCl_3 , $\text{HgCl}_2 +$	Тонкозернистые агрегаты, самостоятельные зерна удлиненной формы, спайность в одном направлении	Теллуриды, блеклые руды, буланжерит, бурнонит, gn .	Микрохимия на $\text{Te} +$; Спектральными анализами Te .

В табл. 2 приводится описание всех теллуридов впервые, за исключением теллуровисмутита*. Мелонит, петцит, калаверит, креннерит, сильванит, пильзенит (?), колорадоит, вейссит в Зодских рудах впервые установлены автором**.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Շ. 2. ԱՄԻՐՅԱՆ

Ոսկու հանքավայրերից մեկի միներալոգիայի շուրջը

Հանքավայրի նրկրարանական կառուցվածքում մասնակցում են կավճի և երրորդական հասակի ինտրուզիվ, հրաբխածին և նստվածքային ապարները: Հանքայնացումը ներկայացված է գոնաներով, երակներով և երակիկներով:

Հանքանյութի կազմում մասնակցում են մի քանի տասնյակ միներալներ, որոնցից առանձնահատուկ նշանակություն ունեն Au, Ag, Cu, Bi, Pb, Ni, Hg-ի տելուրիդները: Հեղինակի կողմից հանքավայրում առանձնացվում է հանքայնացման վեց ստադիա՝

- 1) մինչ հանքային կվարցային.
- 2) կվարց-պիրիտ-արսենոպիրիտային.
- 3) կվարց-կարբոնատ-սուլֆիդային (ոսկեքեր).
- 4) կվարց (խալցեդոնանման) կարբոնատ-ոսկու (Bi և Te հետ).
- 5) կվարց-կարբոնատ-սուլֆոհանտի՛ոնիտային.
- 6) կվարց-կարբոնատ—ոչ հանքային:

Տելուրիդների նկարագրվող խումբը, զլխավորապես հանդես է գալիս չորրորդ ստադիայում և մասամբ էլ՝ երրորդում:

Հոգվածում ամփոփված են քիմիական, սպեկտրալ, միկրոսպեկտրալ, ռենտգենոմետրիական անալիզների և միկրոսկոպիկական ուսումնասիրությունների տվյալները (աղյուսակ № 2): Նշված մեթոդներով հեղինակի կողմից որոշված և բերված է հետևյալ տելուրիդների՝ ալթայիտի, մելոնիտի, կրեններիտի, սիլվանիտի, կալավերիտի, պետցիտի, հեսսիտի, նապիագիտի, ռիկարդիտի, վեյսիտի, կոլորադոիտի, տելուրոբիսմուտիտի, տետրադիմիտի, ընածին տելուրի և պիլզենիտի (?) նկարագրությունները:

ЛИТЕРАТУРА — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ И. С. Волынский, Определение рудных минералов под микроскопом, т. 3. Госгеолиздат, М., 1939. ² М. Н. Шорт, Микроскопическое определение рудных минералов, перевод с англ., ОНТИ, 1934. ³ P. Ramdohr, Die Erzminerale und ihre Verwachsungen, Berlin, 1955. ⁴ W. Uytendogaardt, Tables for microscopic identification of ore minerals. Princeton New Jersey, 1951. ⁵ R. M. Tompson, The telluride minerals and their occurrence in Canada. The American Mineralogist, Vol. 34, May-June, 1949.

* Этот минерал впервые был определен И. Г. Магакьяном как стибно-теллуровисмутит, детально описан и назван „Зодитом“ (И. Г. Магакьян, Сибно-теллуровисмутит Зодского золоторудного месторождения, Басаргечарский район АрмССР ДАН АрмССР, т. XXIII, № 5, 1956).

** О наличии тетрадимита, алганта, гессита, пагнагита, риккардита, самородного теллура в рудах упомянуто в статье Г. А. Твалчрелидзе, Золото-висмут-теллуровзая ассоциация Дамблудского и Зодского месторождений, Сборник трудов КИМС-а, 1959.

СТРАТИГРАФИЯ

К. А. Мкртчян

Новые данные о верхнеэоценовом возрасте трансгрессивной
свиты лорийского синклиория Армянской ССР

(Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР А. А. Габриеляном 6.XI 1959)

В последние годы в крупных палеогеновых синклиориях Армении рядом исследователей выделяется новая трансгрессивная свита, в большинстве случаев на основании стратиграфического ее положения относимая к верхнему эоцену (1, 2, 3).

Фаунистически эта свита хорошо охарактеризована в Даралагезе (4). В Центральной Армении (Севанская зона) возраст ее аргументирован в работах О. А. Саркисяна (2) и автора (1). Фации верхнеэоценовых отложений здесь отличаются чрезвычайным разнообразием, сложными взаимопереходами и представлены морскими прибрежными вулканогенно-осадочными и континентальными озерными и вулканогенными отложениями. При всей пестроте указанных отложений все же намечаются определенные лито-фациальные комплексы, отличающиеся от выше и ниже лежащих отложений и выдерживающиеся на больших площадях. Наиболее полный разрез их наблюдается в бассейне правых истоков р. Чанахчи (летники Сосни-урт г. Бор-Борг), где они снизу вверх представлены в следующем виде (фиг. 1).

1. Нижняя подсвита „Котрац“, сложенная разнообразными туфопесчаниками, мелкообломочными тонкослоистыми туфобрекчиями, прослоями и линзами нуммулитовых известняков, межформационными потоками пироксеновых порфиритов и санидиновых трахиандезитов, с базальными конгломератами в основании. Мощность подсвиты: 250—300 м.

2. Средняя подсвита „Блдан“, сложенная довольно однообразными туфобрекчиями среднего состава, биотитовыми и агломератовыми туфобрекчиями, биотитовыми „туфолавами“ (палеоингнимбриты типа арктических „туфолав“) с подчиненными им пачками туфопесчаников и внутриформационными потоками порфиритов в верхах. Мощность подсвиты 400—600 м.

3. Верхняя подсвита „Бор-Борг“, сложенная темно-серыми, коричневато-серыми пироксеновыми, плагиоклазовыми порфиритами, часто с кавернами, заполненными цеолитами, санидиновыми трахиан-

дезитами и др. В низах подсветы выделяется характерная, но локально развитая пачка „грубообломочная“, сложенная регрессивными туфоконгломератами, косослоистыми туфопесчаниками, глинистыми и углистыми сланцами с растительными остатками, с двумя горизонтами биотитовых кристаллических туфов (палеотипы туфов ереванского типа). Мощность подсветы в целом 600 м.

СВОДНАЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНКА
отложений верхнего эоцена
Базумского х-та и смежных районов

Фиг. 1.

Любопытно, что обильное содержание биотита в некоторых горизонтах пирокластических и др. образований верхнего эоцена является характерной особенностью регионального порядка (такое отмечено также для вулканогенно-обломочных образований верхнего эоцена Аджаро-Триалетии ⁽⁵⁾ и в известном смысле может служить возрастным критерием.

Регрессивной „грубообломочной“ пачкой отмечается переход морского режима осадконакопления в континентальный вследствие превышения темпов осадконакопления над темпами прогибаний.

Для более точного определения возраста описываемой свиты помимо приведенных ранее аргументов (1, 2) важное значение имеют фаунистические данные. Собранные нами фауна целиком происходит из нижней части свиты (подсвита „Котрац“), послойный разрез которой в верховьях р. Чанахчи, у летника „Сосни-урт“ сел. Туманян снизу вверх представлен следующим образом.

1. Над размытой поверхностью фиолетовых кератофиров верхней свиты среднего эоцена залегает базальный слой грязно-фиолетовых грубых туфопесчаников, представляющих смешанное образование продуктов разрушения и переотложения пород свиты кератофиров и туфогенного материала—10 м.

2. Тонкопереслаивающиеся ярко-зеленые и голубоватые слабоцементированные туфопесчаники—6,0 м.

3. Грязно-серые с зеленоватым оттенком, грубые, слегка известковистые туфопесчаники с редкой пелециподовой фауной—1,5 м.

4. Светло-зеленые, средне- и крупнозернистые слабо уплотненные туфопесчаники—1,0 м.

5. Грязно-серые, с зеленоватым оттенком, грубозернистые известковистые туфопесчаники с массовым скоплением пелециподовой фауны—3,0 м.

6. Тонкопереслаивающиеся темно-зеленые, желтовато-зеленые туфопесчаники с пелециподовой и редкой нуммулитовой фауной—4,5 м.

7. Фиолетовые, плотноцементированные известковистые туфопесчаники, у зальбандов гравелистые—0,5 м.

8. Песчанистые плотные, белесоватые известняки с нуммулитовой и редкой пелециподовой фауной—4,0 м.

9. Серо-зеленоватые песчанистые нуммулитовые известняки 1,7 м.

10. Темно-бурые до черного цвета песчанистые сланцы—0,3 м.

11. Белесоватый нуммулитовый известняк—1,0 м.

12. Плотные грубозернистые известковистые туфопесчаники—0,3 м.

13. Грязно-зеленоватые песчанистые нуммулитовые известняки—1,0 м.

14. Желтоватые слабоцементированные туфопесчаники—1,5 м.

15. Белесоватые плотные песчанистые нуммулитовые известняки—2,0 м.

16. Переслаивающиеся грубые туфопесчаники, песчанистые сланцы, шаровые туфопесчаники—3,0 м.

17. Грязно-зеленоватые рыхлые туфопесчаники—8,0 м.

18. Желтоватые рыхлые грубые туфопесчаники—4,0 м.

Верхняя часть разреза туфопесчанистых отложений подсвиты „Котрац“, выведенной мощностью 25-30 м, не обнажается. Далее следует:

19. Грубообломочные темно-серые туфобрекчии—30 м.

20. Темно-серые пироксеновые порфириты—50.

Среди нуммулитов из наших сборов А. Е. Птухьяном определены: *Nummulites perforatus* de Montf. и *N. incrassatus* de la Harpe. Среди пелециподовой фауны П. М. Асланяном при консультации И. А. Коробкова определены: *Chlamus subdiscorsis* d'Arch., *Chl. biaritzensis* d'Arch., *Chl. biaritzensis* d'Arch. var. *subtripartita* d'Arch., *Crassatella fashsi* Slodk., *Cr. ex gr. plumbea* Chemnitz. Кроме того, в шлифах из массивных нуммулитовых известняков обнаружена обильная микрофауна, среди которой Н. А. Саакян определены: *Rotalia ex gr. lithothamnica* Uhlig, *Globorotalia armenia* Sahakian, *G. crassaeformis*, *Bifirina valvulineria*, *Globigerina*, *Radiolaria*, *Asterigerina*, *Bolivina*, *Textularia*, *Nodosaria*, *Giroidina*, *Ammodiscus*, *Discocyclina*, которые в совокупности указывают на слои—переходные между средним и верхним

эоценом (оверзский ярус в понимании Буссака), которые в силу их геологического положения (основание новой трансгрессивной свиты) должны быть отнесены к верхнему эоцену. Такой вывод находится в полном согласии с данными по другим районам Армении (3,6). О верхнем возрастном пределе свиты в связи с отсутствием фаунистических данных можно судить лишь косвенными данными, в частности можно предполагать наличие здесь нижних горизонтов олигоцена. Указанному выводу не противоречат как региональные данные (5) так и данные о возрасте вышележащей ингрессивной Дилижанской свиты.

Управление геологии и охраны недр при
Совете Министров Армянской ССР

4. Հ. ՄԿՐՏՁՅԱՆ

Նոր սվյալներ Հոուս սինկլինորիումի սրահագրեսիվ շերտախմբի վերին էոցենյան հատակի մասին

Հոուս սինկլինորիումի և նրան հարակից շրջաններում լայն տարածում ունեցող հրաբխածին տրանսգրեսիվ շերտախումբը կազմված է միմյանց հետ բարդ ֆազիալ փոխանցումներ ունեցող հիմնային տուֆոլավաքարերից, տուֆոավապարերից, նրանց ենթակա նումուլիտային կրաքարերից, տուֆոքեկորային ապարներից, որոնց կազմում առանձնացվում են բիոտիտով շատ հարուստ տարրերակներ, այդ թվում՝ բիոտիտային «տուֆոլավաներ» և տուֆեր, հիմքային և որոշ ալկալայնութուն ունեցող լավաներից: Շերտախմբի մոտավորապես միջին մասում լոկալ տարածում ունի, այսպես կոչված «խոշորաքեկոր» ենթահատվածքը, որը նշում է նստվածքների կուտակման ծովային սեփմի փոխարինումը ցամաքայինով:

Շերտախմբի հիմքից հավաքած նումուլիտների և թերթախոկավորների բրածո մնացորդները, այլ տվյալների հետ միասին, թույլ են տալիս շերտախմբի հասակը որոշել որպես վերին էոցեն, որը իր վերին մասում կարող է պարունակել ստորին օլիգոցենի որոշ հորիզոններ:

ЛИТЕРАТУРА — ԿՐԸ Կ Ա Ն ՈՒ Ք Յ ՈՒ Ն

1 А. Т. Вегуни, К. А. Мкртчян, О верхнеэоценовой трансгрессии в Армении, Тр. УГиОН при СМ АрмССР, № 2, Ереван, 1959. 2 О. А. Саркисян, Изв. АН АрмССР, (сер. геол. и геогр. наук), т. XI, № 4, (1958). 3 А. Т. Вегуни, А. Е. Птухьян, Опыт расчленения верхнеэоценовых отложений бассейна р. Арпа по нуммулитам, Тр. УГиОН при СМ АрмССР, № 2, Ереван, 1959. 4 Б. Ф. Мефферт, Эоценовая фауна из Даралагеза в Армении, 1931. 5 П. Д. Гамкрелидзе, Геологическое строение Аджаро-Триалетской складчатой системы. Изд. АН ГрузССР, Тбилиси, 1949. 6 А. А. Габриелян, ДАН АрмССР, т. XXV, № 3 (1957).

СТРАТИГРАФИЯ

А. Е. Назарян

Новые данные о возрасте алевролитовых пород Разданского района Армянской ССР

(Представлено чл.-корресп. АН Армянской ССР А. А. Габриеляном 23. I 1960)

В стратиграфическом разрезе Цахкуняцского хребта отложения верхнего мела перекрываются свитой алевролитовых пород, представленных, в основном, туфогенными алевролитами, мергелистыми известняками, мергелями с прослойками маломощных плотных песчаных известняков и известковистых песчаников.

Раньше считали, что породы этой алевролитовой свиты постепенными переходами связаны с подстилающими красными известняками сенона и на этом основании возраст указанной свиты определяли как маастрихтский (1-3).

Наши исследования показали, что породы алевролитовой свиты залегают трансгрессивно на разных горизонтах отложений верхнего мела и содержат нуммулитовую фауну нижнеэоценового возраста.

Породы алевролитовой свиты в Цахкуняцском хребте обнажаются на правом берегу р. Раздан, в районах сс. Макраван, Агпара, Кахси и далее отдельными выходами севернее села Солак, где они прослеживаются от южного края с. Макраван в юго-западном направлении через Агпара до с. Кахси.

Наилучшие разрезы данной свиты обнажаются в районе села Агпара и севернее села Кахси, где трансгрессивное и несогласное налегание пород алевролитовой свиты на более древние отложения наблюдается наиболее отчетливо. Приводим описание указанных двух разрезов снизу вверх.

Агпаринский разрез

1. Базальные конгломераты, которые трансгрессивно и с угловым несогласием залегают над красными известняками верхнего мела. Гальки конгломератов содержат обломки древних метаморфических и интрузивных пород, а также обломки красных известняков верхнего мела. Цементом является алевритистый мергель. Мощность 30—35 м
2. Темно-серые туфогенные песчаники, песчаные мергели 3 м
3. Пласт песчаных, светло-серых мергелистых известняков 0,5 м
4. Туфогенные, серые песчаники 4 м
5. Темно-серые туфогенные алевролиты 5 м

6. Светло-серые, плотные, известковистые песчаники 3 м
7. Прослойки туфогенных, темно-серых алевролитов 0,75 м
8. Прослойки песчаных известняков светло-серого цвета 0,2 м
9. Темно-серые, темные туфогенные алевролиты 4 м
10. Светло-серые туфогенные песчаники 1 м
11. Темно-серые, бурые туфогенные алевролиты 3 м
12. Мелкозернистые, серые туфогенные песчаники, среди которых наблюдаются шарообразные отдельности 10 м
13. Серые туфогенные алевролиты которые прорываются дайкой порфиритового состава северо-восточного простирания. 4 м
14. Мелкозернистые, серые туфогенные песчаники 2 м
15. Темные туфогенные алевролиты 3 м
16. Порфириты, по составу и внешним признакам сходные с порфиритами вышеуказанной дайки 10 м
17. Туфопесчаники серого цвета 2 м
18. Туфогенные, темно-серые алевролиты 5 м
19. Серые мелкозернистые туфогенные песчаники 2 м
20. Темные туфогенные алевролиты 1 м
21. Пласт песчаных известняков светло-серого цвета 0,2 м
22. Пласт алевролитов темно серого, бурого цвета 0,5 м
23. Серые туфогенные известковистые песчаники 0,3 м
24. Темно-серые, почти черные туфогенные алевролиты 3 м
25. Мелкозернистые, плотные, серые известковистые песчаники, из которых мною и В. А. Аветисяном впервые собрана фауна нуммулитов, среди которых А. А. Габриеляном и С. М. Григорян определены следующие характерные для нижнего эоцена формы: *Nummulites planulatus* Lam., *Num. globulus* Leym. (A), *Num. atacicus* Leym. (A). Мощность известковистых песчаников 3 м
26. Темно-серые туфогенные алевролиты 10 м
27. Туфогенные, мелкозернистые, серые песчаники 2 м
28. Туфогенные, темные алевролиты 2,5 м
29. Мергелистые, желтые известняки 2 м
30. Пласт порфиритов серого цвета 3 м
31. Серые туфогенные песчаники 1 м
32. Пласт туфогенных темно серых алевролитов 1 м
33. Разрез венчается пачкой, мощностью около 40 м темносерых, плотных мергелистых известняков и желтых кирпично-желтых, иногда серых мергелей, которые покрываются современными делювиальными отложениями.

Кахсинский разрез

1. В основании разреза обнажаются мелкозернистые, серые, туфогенные песчаники, которые чаще переслаиваются маломощными прослойками туфогенных алевролитов. Видимая мощность этой пачки достигает 50 м
2. Темно-серые туфогенные алевролиты 5 м
3. Пачка известковистых, плотных, серых песчаников 2 м
4. Темно-серые, почти черные туфогенные алевролиты 3 м
5. Пласт мергелистых песчаников 2 м
6. Пачки темно-серых, туфогенных алевролитов 3,5 м
7. Довольно мощная пачка песчаных известняков, известковистых песчаников серого цвета 35 м
8. Темно-серые туфогенные алевролиты 3 м
9. Давольно мощная пачка пород, представленная чередующимися известковистыми мергелями, известковистыми песчаниками и туфогенными алевролитами. Мощность отдельных слоев колеблется от 15 см до 1,5 м. В

известковистых песчаниках нами собрана пуммулитовая фауна, характеризующая возраст этих пород как нижний эоцен. Общая мощность этой пачки 65—70 м

10. Выше по разрезу нижнеэоценовые породы трансгрессивно и с угловым несогласием перекрываются трахиандезитовой толщей плиоценового возраста.

Породы описанных разрезов в районах сс. Макраван, Агпара и Кахси образуют отчетливо выраженную синклинальную структуру, имеющую северо-западное простирание и осложненную несколькими мелкими антиклинальными и синклинальными складками того же простирания.

Таким образом, приведенные новые данные доказывают нижнеэоценовый возраст отложений алевролитовой свиты Цахкуняцкого кристаллического массива. По своему стратиграфическому положению и составу фауны, описанная свита соответствует нижнеэоценовым известнякам бассейна р. Веди и Севанского хребта (4, 5).

Ереванский государственный университет

Ա. Ե. ՆԱԶՍՐՅԱՆ

Նոր հվալներ Հայկական ՍՍՌ Հրազդանի քաղաքի ալեվրոլիտային ապարների հասակի մասին

Մախկունյանց լեռնաշղթայի ստրատիգրաֆիական կտրվածքում, վերին կավճի ապարները ծածկվում են ալեվրոլիտային ապարների մի շերտախմբով, որը ներկայացված է հիմնականում տուֆոզեն ալեվրոլիտներով, մերգելային կրաքարերով և մերգելներով: Ալեվրոլիտային ապարների այդ շերտախումբը սլարունակում է իր մեջ շափազանց ամուր, մոխրագույն գույնի, փոքր հաստության ավազաքարային կրաքարերի և կրաքարային ավազաքարերի բազմաթիվ կրկնվող ենթաշերտեր:

Հիշատակված շերտախմբի ապարները մերկանում են Մախկունյանց լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան մասի, Հրազդան գետի աջ ափում գտնվող, Մաքրավան, Աղփարա, Քախսի գյուղերի շրջաններում և առանձին ելքով Սուլակ գյուղից հյուսիս: Նրանք սկսած Մաքրավան գյուղի հարավային մասից, նեղ գոտիով ձգվում են հարավ-արևմուտյան ուղղությամբ Աղփարա գյուղով մինչև Քախսի գյուղը:

Առաջներում հաշվում էին, որ ալեվրոլիտային շերտախմբի ապարները, աստիճանական անցումով կապված են իրենց կողմից ծածկվող սենոնի կարմրագույն կրաքարերի հետ, և հիմք ընդունելով ստրատիգրաֆիական այդպիսի փոխհարաբերությունը նրանց հասակը վերագրում էին վերին կավճի մասսոբիստ հարկին [1, 2, 3]:

Այդ տեղամասում, մեր մանրակրկիտ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ալեվրոլիտային շերտախումբը, ոչ թե աստիճանական անցումով է կապված սենոնի հասակի կարմրագույն կրաքարերի հետ, այլ տեղադրված է նրանց տարբեր հորիզոնների վրա արանսդրեսիվ կերպով և իրեն հիմքում ունի հիմնային կոնգլոմերատների բավական հաստ շերտ, ավելի հին հասակի ապարների բեկորների սլարունակությունը:

Մաքրավան, Աղփարա և Քախսի գյուղերի շրջանում ալեվրոլիտային շերտախմբի ապարները կազմում են որոշակիորեն արտահայտված սինկլինալային մի ստրուկտուրա հյուսիս-արևմտյան տարածումով, որը բարդեցված է նույն տարածում ունեցող մի քանի անտիկլինալային և սինկլինալային ծալքերով:

Ալեվրոլիտային շերտախմբի համեմատականորեն լավ կտրվածքները մերկանում են Աղփարա գյուղից արևելք և Քախսի գյուղից հյուսիս ընկած տեղամասերում, ուր

որոշակիորեն դիտվում է այդ շերտախմբի աններդաշնակ և տրանսգրեսիվ տեղադրումն
ավելի հին հասակի նստվածքների վրա: Բացի դրանից ալերոլիտային ապարների շեր-
տախմբի մեջ գտնվող ավազաքարային-կրաքարերի և կրաքարային-ավազաքարերի են-
թաշերտերի միջից, մեր և Վ. Ա. Ավետիսյանի կողմից առաջին անգամ հավաքված նու-
մուլիտային ֆաունան, կրկին անգամ հիմք ծառայեց մեզ համար, չվերագրելու այդ
շերտախմբին վերին կավճի մաստրիխտի հարկին:

Հավաքված ֆաունայի ուսումնասիրութունը կատարել են պրոֆեսոր Ա. Հ. Գար-
րիելյանը և Ս. Մ. Դրիդորյանը, որոնք որոշել են հետևյալ ձևերը, բնորոշ ներքին էոցե-
նի հասակի համար *Nummulites planulatus* Lam; *Num. globulus* Leym (A); *Num. ata-*
cicus Leym (A):

Այսպիսով վերև հիշատակված նոր տվյալները ապացուցում են, որ Ծախուլունյանց
լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան մասում մերկացող ալերոլիտային շերտախմբի ապար-
ները ունեն ստորին էոցենյան հասակ և կապված են իրենցից ներքև գտնվող ապարների
հետ երկրաբանական ընդմիջումով: Իրեն ստրատիգրաֆիական դիրքով և պարունակած
ֆաունայի կազմով, նկարագրվող շերտախումբը համապատասխանում է Վեդի գետի ավա-
զանի և Սևանի լեռնաշղթայի ստորին էոցենյան կրաքարերին [4, 5]:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ В. Н. Котляр, Памбак. Геология, интрузивы и металлогения. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1958. ² К. Н. Паффенгольц, Геология Армении (на армянском языке с русским резюме), 1946. ³ А. Т. Асланян, Региональная геология Армении, Ереван, 1958. ⁴ А. А. Габриелян, Изв. АН АрмССР (серия геол. и геогр. наук), т. XI, № 2 (1958). ⁵ О. А. Саркисян, ДАН АрмССР, т. XXIX, № 3 (1959).

Г. Е. Григорян

К морфофункциональной организации задних столбов спинного мозга

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. К. Карапетяном 29. XII 1959)

В литературе, посвященной проблеме морфофизиологической структуры проводящих путей спинного мозга, имеются отдельные указания на то, что деструкция дорсальных канатиков у животных приводит к различной интенсивности нарушения сенсомоторных и условнорефлекторных функций в зависимости от области повреждения туловищного мозга.

Так, было обнаружено (1-3), что при хирургической травме пучков Голля и Бурдаха на уровне шейных сегментов нарушается локомоторная функция преимущественно передних конечностей, тогда как локомоторная функция задних конечностей нарушается в значительно меньшей степени.

Возникает вопрос, какова удельная роль „нежных“ и „клиновидных“ пучков различных сегментов грудного отдела спинного мозга по отношению к функциональной деятельности задних конечностей?

Для разрешения этой задачи мы пользовались методом повторной экстирпации задних столбов. Суть этого приема заключалась в том, что после первой спинальной операции, спустя некоторое время, производилась аналогичная операция выше или ниже первоначальной. Удаление задних столбов спинного мозга производилось по ранее описанному способу (4). В качестве экспериментального объекта служили собаки (в количестве—9) различного возраста, у которых по щадящей методике (5,6) исследовались условнодвигательные тонические рефлексы с задних конечностей. После завершения функциональных экспериментов спинной мозг каждого подопытного животного подвергался контрольной гистоморфологической обработке.

Ввиду однотипности полученных результатов в качестве иллюстрации приведем 2 примера.

У собаки № 16 в возрасте 2—3 лет выработка двигательных условных рефлексов производилась с левой задней конечности. Первая положительная реакция со стороны конечности появилась на четвертом сочетании „звонка“ с электрическим раздражением кожи лапы.

Тонический компонент появился на 25—30 сочетаниях. Упрочение условной тонической реакции наступило на 45—50 сочетаниях. Дифференцировка оказалась „нулевой“ с первого же применения зуммера (фиг. 1а).

Фиг. 1. Собака № 16, электрооборонительные двигательные условные рефлексы; а—до экстирпации задних столбов спинного мозга; б—на 5 день после первой спинальной операции; в—на 3 день после второй спинальной операции.

Обозначения сверху вниз: пневмограмма, запись движения задней конечности, отметка условного раздражения, отметка безусловного раздражения, отметка времени в секундах.

19.2.57 г. были экстирпированы задние столбы спинного мозга в области Th 8—9 позвонков на протяжении 20 мм. Спустя 5 дней после операции на первом же опыте условный положительный рефлекс оказался налицо. Однако форма его проявления претерпевала характерные изменения: на условный сигнал животное дергало лапой (фазическая реакция) после которого сгибало ногу и держало ее согнутой (тонический компонент (фиг. 1б)).

Спустя 2 недели после первой спинальной операции 5.3.57 г. было произведено повторное удаление дорсальных канатиков в области Th 3—4 позвонков на протяжении 20 мм. На третий день после второй операции в первом же опыте был зафиксирован положительный условный тонический рефлекс (фиг. 1в).

Таким образом, первичное повреждение задних столбов спинного мозга в области нижних грудных сегментов хотя и не приводит к выпадению локального двигательного условного рефлекса, но ослабляет, в некоторой степени, тонический компонент последнего. Однако со временем, применяя определенное количество сочетаний, снова появляется тоническая форма двигательного условного рефлекса. Повторное удаление пучков Голля и Бурдаха выше первоначальной операции на 4—5 позвонков не приводит к дополнительному нарушению тонического компонента двигательного условного рефлекса.

Послесмертное гистологическое исследование поврежденных участков спинного мозга животного показало, что операцией пол-

ностью и локально были экстирпированы задние столбы на всем протяжении операционного поля. Место удаленной ткани было заполнено рубцовой тканью (фиг. 2а, б).

Фиг. 2. Микрофото поперечных срезов поврежденного спинного мозга; а—собака № 16, место первой спинальной операции на уровне Th 8—9 позвонков. На препарате отсутствуют задние столбы. Препарат окрашен методом Вейгерта; б— место второй спинальной операции на уровне Th 3—4. На препарате отсутствуют задние столбы; окраска препарата гематоксилин-эозином; в— собака № 22, место первой спинальной операции на уровне Th 5—6. На препарате отсутствуют задние столбы; окраска препарата — методом Ганзена; г— место второй спинальной операции на уровне Th 10—11. На препарате отсутствуют задние столбы. Препарат окрашен гематоксилин-эозином.

У другой собаки № 22 в возрасте 6—7 месяцев выработка двигательных условных рефлексов началась спустя 5 дней после предварительного удаления задних столбов в области Th 5—6 позвонков на протяжении 20 м.м. Первые условные рефлексы в виде слабого дергания задней правой конечности отмечались на 5 сочетании. Тонический компонент появился на 20 сочетании; упрочение тонической реакции наступило после 45 сочетания (фиг. 3а).

Спустя 3 недели после первой спинальной операции 29.4.58 г. было произведено повторное удаление дорсальных канатиков в области Th 10—11 позвонков на протяжении 20 м.м. На следующий день после операции отмечалась довольно резкая декомпенсация координа-

ции движения задних конечностей. На второй день при первом же опыте по условным рефлексам оказалось, что хотя на условный положительный сигнал животное поднимало соответствующую лапу, однако, был резко расстроен тонический компонент рефлекса и не только на условный, но и на безусловный раздражитель. В результате

Фиг. 3. Собака № 22. Электрооборонительные двигательные условные рефлексы; а—после предварительной экстирпации задних столбов в области Th 5—6; б—на 4—5 день после второй операции на уровне Th 10—11; в—на 8—10 день после повторной спинальной операции.

этого животное за все время действия условного сигнала неоднократно подвергалось воздействию электрического тока (подкрепление). В последующие дни с применением соответствующего количества сочетаний наступила тоническая реакция сперва на безусловный раздражитель, когда животное на электрический ток сгибало лапу и держало ее на весу; условный тонический рефлекс в этот период был еще недостаточно прочным (фиг. 3б). На 50—60 сочетаниях появилась тоническая реакция и на условный сигнал (фиг. 3в).

Таким образом, повторное удаление дорсальных канатиков спинного мозга ниже первой операции на 5 позвонков приводило к заметному нарушению тонического компонента двигательного условного рефлекса.

Гистоморфологический анализ поврежденного спинного мозга показал тотальное и изолированное удаление нежных и клиновидных пучков как в области первой, так и во второй спинальной операции (фиг. 2в, г).

Теперь, чем объяснить то обстоятельство, что анатомическое разобщение путей проприоцепции—дорсальных канатиков, произведенное в различных отделах спинного мозга, результирует в неодинаковой степени нарушения тонического двигательного условного рефлекса задних конечностей? Почему перерезка задних столбов в шейных сегментах приводит к более слабому нарушению кинестетической рецепции задних лап, чем в средних и нижних грудных сегментах? Почему повторное повреждение пучков Голля и Бурдаха ниже первой

операции приводит к более резкой и длительной декомпенсации тонического двигательного рефлекса, чем когда идентичная операция производится выше первоначальной?

Следует отметить, что на эти вопросы в литературе мы не находили ответа. Исходя из этого, нами были предприняты специальные гистоморфологические исследования, с целью выяснения анатомической основы вышеописанных физиологических данных.

Были использованы 3 щенка в возрасте 1,5—3—6 месяцев. Спустя 10 дней после частичной экстирпации задних столбов в области Th 8—9 позвонков на протяжении 20 мм животные были забиты. Из различных отделов спинного мозга, начиная от места повреждения и выше до продолговатого мозга, брались отдельные кусочки и фиксировались для гистологической обработки по стандартному методу Марки.

Результаты этих экспериментов были следующие: во-первых, у всех животных контрольный гистологический анализ показал полное и локальное удаление задних столбов в области операции (фиг. 4а). Далее, характерной особенностью вторичной восходящей дегенерации являлось то, что на 1—2 сегмента выше места спинальной операции волокна дорсальных канатиков в значительном количестве оказались перерожденными. Кроме того, отмечалась большая концентрация дегенерированных волокон в области задне-бокового канатика спинного мозга, что соответствует месту проекции *tr. cortico spin. later.* и *tr. spino-cerebellaris dors.* Наконец, масса диссеминированных перерожденных „точек“ почти по всему поперечнику спинного мозга (фиг. 4б).

Дальнейшая картина локализации восходящих дегенерированных волокон заключалась в том, что на уровне передних грудных сегментов отмечалась максимальная кумуляция перерожденных волокон в зоне пучка Голля, занимающая более дорсальную часть задних столбов. Кроме того, были отчетливо выражены поврежденные очаги в задне-боковых отделах спинного мозга и вентральнее от передних рогов (фиг. 4в).

На уровне шейного утолщения, помимо изолированного перерождения волокон нежных пучков, отмечалась значительная дегенерация в области прохождения *tr. cortico-spinalis lat.* и *tr. spinocerebellaris dors. et vent.* (фиг. 4г).

Таким образом, полученные результаты в совокупности с ранее опубликованными данными (7,8) показывают, что у собак в возрасте 1,5—6 месяцев локальное удаление задних столбов спинного мозга в области грудных сегментов приводит к вторичному восходящему перерождению волокон нежных и клиновидных пучков не только выше места повреждения, но и волокон других трактов белого вещества спинного мозга, в частности, задне-бокового и переднего отделов последнего. Далее, по мере удаления от места деструкции спинного мозга в роstralном направлении, выраженный диссеминированный

характер перерождения аксонов постепенно переходит к более очаговому типу дегенерации в шейных отделах спинного мозга. Наконец, сопоставляя величину области, занимаемой перерожденными во-

Фиг. 4. Щенок № 2 в возрасте 1,5 месяцев). Микрофото поперечного среза поврежденного спинного мозга, обработанного методом Марки; а—место удаления задних столбов (Th 8—9). На препарате отсутствуют дорсальные канатики; б—поторечник среза выше на один сегмент от места повреждения (Th 7). Полное перерождение волокон задних столбов; в—область передних грудных сегментов (Th 3—4). Видно изолированное перерождение пучка Голля, а также очаги перерожденных волокон преимущественно в области задне-бокового и переднего трактов спинного мозга; г—область шейного утолщения (С 3—4). На препарате виден локальный перерожденный пучок Голля и значительные дегенерированные очаги в области задне-боковых отделов.

локнами пучков Голля на уровне нижних грудных сегментов с областью того же тракта с дегенерированными волокнами шейного отдела спинного мозга, можно отметить следующее, что по краниопетальному направлению идет постепенное суживание, „разгрузка“ зоны нежных пучков за счет уменьшения количества их волокон.

Последний факт и помогает теперь понять, почему повреждение дорсальных канатиков на уровне нижних грудных сегментов приводит к более резким нарушениям координации движения в задних конечностях, нежели когда аналогичное повреждение локализуется на уровне шейных сегментов спинного мозга. Более того, становится

ясным, почему повторная экстирпация пучка Голля ниже места первой операции приводит к более значительной дисфункции, чем когда она производится выше этого места.

Резюмируя вышеописанное, можно отметить следующее: функциональная индивидуальность пучка Голля в шейных, верхних и нижних грудных сегментах обусловлена его анатомической неравнозначностью в различных отделах спинного мозга. Чем ближе к люмбальному утолщению, тем больше количество волокон в составе нежных пучков и наоборот, по восходящему направлению количество волокон постепенно уменьшается.

Институт физиологии им. академика Л. А. Орбели
Академии наук Армянской ССР

Գ. Ե. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ուղևուղեղի ետևի սյուների մոտֆունկցիայի և ֆունկցիայի հարցի շուրջը

Կրականությունից հայտնի է, որ ողնուղեղի «նուրբ» և «սեղաձև» ուղիների հատումը պարանոցի շրջանում առաջ է բերում առավելապես առաջնային վերջավորությունների ֆունկցիաների խանգարում:

Օգտվելով ողնուղեղի ուղիների կրկնակի վնասման մեթոդիկայից, այսինքն, երբ առաջին օպերատիվ միջամտությունից որոշ մամանակ անց կատարվում է երկրորդը, ըստ տեղադրության ավելի առաջ կամ ետ սկզբնական վնասման տեղից, մեզ հաջողվեց ցույց տալ, որ երբ ողնուղեղային երկրորդ օպերացիան կատարվում է առաջինից մի քանի սեգմենտ ետ, ապա այդ դեպքում կոնքային վերջավորությունների ինչպես անոթայմանական այնպես էլ սլայմանական սեֆելիտոր ֆունկցիաները խանգարվում են անհամեմատ զգալի չափով, քան այն դեպքում, երբ երկրորդ ողնուղեղային միջամտությունը կատարվում է առաջինից վեր:

Հարց է ծագում ինչով կարելի է բացատրել այն, որ ողնուղեղի տարբեր հատվածների (պարանոցային, վերին և ստորին կրծքային) ետևի սյուներն ունեն ֆունկցիոնալ տարբեր նշանակություն:

Այս հարցին պատասխանելու համար մեր կողմից ձեռնարկվեց հատուկ հիստոմորֆոլոգիական հետազոտություն: Օգտվելով ողնուղեղի երկրորդային վերնրարձ կազմափոխման (դեղեներացիա) օրինաչափությունից, փորձի ենթակա կենդանիների ողնուղեղի մշակումը Մարկի մեթոդով ցույց տվեց, որ ողնուղեղի ետևի սյուների մասնակի հեռացումից 10—11 օր անց, ուղիների կազմափոխում է նկատվում ոչ միայն ետևի սյուների ներվաթելերում կտրվածքից վեր, այլև ողնուղեղի սպիտակ նյութի մյուս բաժիններում՝ կողմնային և առաջնային սյուներում: Բացի այս սկզբովեց, որ որքան հեռանում ենք ողնուղեղի վնասված հատվածից դեպի կենտրոն, այնքան վնասված ներվաթելերի քանակը ետևի սյուներում պակասում է և ընդհակառակը, որքան մոտ ողնուղեղի զոտկային հատվածին այնքան շատանում է:

Այս տվյալները ցույց են տալիս, որ ողնուղեղի անատոմիական տարբեր հատվածներում ետևի սյուների վնասումից առաջացած, ըստ աստիճանի տարբեր ֆունկցիոնալ խանգարումները պայմանավորվում են նրանով, որ ետին ծայրանդամներից եկող պրոպրիոցեպտիվ ներվուզիաների քանակը ետևի սյուների կազմում ողնուղեղի տարբեր հատվածներում տարբեր է, որքան մոտ զոտկային հաստուկին, այնքան շատ է ներվաթելերի քանակը, որի պատճառով այդ հատվածի ետին սյուների վնասումն առաջ է բերում անհամեմատ խորը և տևողական խանգարումներ ետին ծայրանդամներում, քան նույն վնասումը պարանոցային հատվածում, որտեղ ներվաթելերի քանակն ավելի նվազ է:

ЛИТЕРАТУРА — ՉՐԱՇՈՒՄՆԵՐ

¹ В. М. Бехтерев. Основы учения о функциях мозга, вып. 3, 1903. ² Л. С. Гамбарян. Условные рефлексы у собак после высокой перерезки задних столбов спинного мозга, Изд. АН АрмССР (1953). ³ Л. С. Гамбарян, ДАН СССР, т. ХСVIII, № 2 (1954). ⁴ Г. Е. Григорян, Изв. АН АрмССР (сер. биол.), т. 10, № 8 (1957). ⁵ В. П. Петропавловский, Физиологический журнал СССР, т. 18, № 2, 1934. ⁶ Л. С. Гамбарян, Труды института им. И. П. Павлова, т. 1, 1952. ⁷ Г. Е. Григорян, Известия АН АрмССР (сер. биол.), т. 11, № 10 (1958). ⁸ Г. Е. Григорян, ДАН АрмССР, т. 28, № 1 (1959).