ISSN 0515-9628

ՄԱՐԾԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԵՐԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՆ

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

CHEMICAL JOURNAL OF ARMENIA

Խ Մ Ր Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ո Ն Ե Գ Ր Ա

Վ. Գ. Ազատյան (*գլխ. խմբագրի տեղակալ*), Ս. Գ. Աղբալյան, Հ. Գ. Բաբայան, Գ. Հ. Գրիգորյան, Գ. Տ. Քաղեռայան (*գլխ. խմբագրի*), Վ. Մ. Քառայան, Ա. Մ. Հակոբյան, Հ. Ա. Հարոյան, Ա. Հ. Մանթաշյան, Մ. Գ. Մանվելյան, Լ. Գ. Մելքոնյան, Հ. Հ. Զալթիկյան, Ս. Հ. Վարդանյան, Ս. Ա. Տեր-Դանիելյան (*պատմ. քարտուղար*), Տ. Վ. Քրմոյան

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

С. Г. Агбалян, В. Д. Азатян (зам. главного редактора), А. Н. Акопчи, А. А. Ароян, Г. Г. Бабаян, Г. О. Григорян, С. А. Вартамян, Т. В. Крмоян, М. Г. Манвелян, А. А. Манташян, Л. Г. Мелконян, В. М. Тараян, Г. Т. Татевосян (глав. редактор), С. А. Тер-Даниелян (ответ. секретарь), О. А. Чалтыкян

Խմբագրութեան հասցեն՝ Երևան-19, Բարեկամութեան, 24

Адрес редакции: Ереван-19, Барекамутия, 24.

ОБЩАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 54-386+546.32+547.821

О КОМПЛЕКСЕ ПИРИДИНА С ПЕРСУЛЬФАТОМ КАЛИЯ

О. А. ВАРТАПЕТЯН, О. А. ЧАЛТЫКЯН и А. А. МАРТИРОСЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 3 IX 1970

Комплексное соединение пиридина с персульфатом калия в водной среде изучено спектрофотометрическим методом при температуре $15 \pm 0,1^\circ$. Установлен состав комплекса 1 пиридин : 4 персульфата калия. Рассчитана константа устойчивости, равная $1,45 \cdot 10^8 \pm 0,23 \cdot 10^8$, что указывает на значительную стабильность этого комплексного соединения.

Рис. 4, табл. 1, библиограф. ссылок 5.

При исследовании кинетики реакций перекисей с аминами в нашей лаборатории было установлено, что персульфат калия в водных растворах [1], и перекись бензоила в органических растворах [2] не реагируют с пиридином при температурах до 40° [3].

Для выяснения причины инертности пиридина по отношению к упомянутым перекисям нами изучена возможность комплексообразования пиридина с персульфатом калия в водных растворах спектрофотометрическим методом в УФ области.

В литературе имеются сведения о комплексообразовании перекиси бензоила с пиридином [4]. При изучении кинетики инициированной перекисью бензоила (ПБ) полимеризации диметакрилатолигосилоксанов в присутствии пиридина наблюдалось снижение скорости полимеризации, объясняемое авторами образованием комплекса ПБ-пиридин. Распад этого комплекса происходит намного медленнее, чем одной ПБ. Наличие комплекса пиридин-ПБ подтверждено с помощью тонкослойной адсорбционной хроматографии и определением молекулярного веса. В данном случае вероятно образование комплекса состава 2 ПБ: 1 пиридин. Что касается комплекса пиридин+персульфат калия, то в литературе о нем нет никаких указаний.

Экспериментальная часть

Персульфат калия был очищен 4-кратной перекристаллизацией, а пиридин—фракционной перегонкой над окисью бария.

Измерения оптической плотности производились на спектрофотометре СФ-4А, камера которого была термостатирована на $15 \pm 0,1^\circ$ циркулирующей воды из ультратермостата U-10. Были использованы кварцевые цилиндрические кюветы с $l = 18$ мм.

Полученные результаты и обсуждение

Определение состава комплекса с помощью эквимольных смесей пиридина с персульфатом калия в водном растворе. Эксперименты показали, что независимо от концентраций компонентов смеси (от 10^{-3} до 10^{-1} М* и длины волны (от 260 до 290 мкм), во всех случаях наблюдается один единственный максимум для кривых D — и ΔD^{**} —состав смеси (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Кривые зависимости D (оптической плотности) от эквимольных смесей в водной среде. Условия опыта: $C_{K_2S_2O_8} = 10^{-1}$, $C_{C_4H_5N} = 10^{-1}$ моль/л, $t = 15^\circ$. 1 — $\lambda = 276$; 2 — $\lambda = 277$; 3 — $\lambda = 278$ мкм.

Рис. 2. Кривые отклонения от закона аддитивности эквимольной смеси при $t = 15^\circ$. 1 — $\lambda = 276$; 2 — $\lambda = 277$; 3 — $\lambda = 278$ мкм.

Максимум приблизительно соответствует составу смеси 1 пиридин : 4 персульфата калия.

Определение константы устойчивости K комплекса с помощью неэквимольных смесей [5]. Объем $(1-x)$ раствора персульфата мольной концентрации (C) был смешан с объемом x раствора пиридина мольной концентрации $C' = pC$.

* Малая растворимость $K_2S_2O_8$ не позволяла брать более высокие концентрации.

** ΔD — отклонения оптической плотности от закона аддитивности.

Кривые $D = f(x)$ построены для разных λ (рис. 3, 4). На тех же рисунках приводятся также кривые ΔD для точного определения положения максимума.

Рис. 3. Кривые зависимости D от разных процентных соотношений компонентов при $\lambda = 265$ мкм. 2 — отклонение от закона аддитивности. Условия опыта: $C_{K_2S_2O_8} = 10^{-2}$, $C_{C_5H_5N} = 5 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $t = 15^\circ$.

Рис. 4. Кривые зависимости D от разных процентных соотношений компонентов: Условия опыта: 1 — $C_{K_2S_2O_8} = 10^{-1}$, $C_{C_5H_5N} = 2 \cdot 10^{-2}$ моль/л, $\lambda = 270$ мкм; 2 — $C_{K_2S_2O_8} = 10^{-1}$, $C_{C_5H_5N} = 10^{-2}$ моль/л, $\lambda = 270$ мкм, 3 — $C_{K_2S_2O_8} = 10^{-1}$, $C_{C_5H_5N} = 5 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $\lambda = 268$ мкм, $t = 15^\circ$.

Применением метода Жоба [5] получается уравнение для расчета K комплексообразования:

где все значения в правой части уравнения известны из эксперимента. В таблице приведены значения константы устойчивости, рассчитанные по уравнению (1).

Таблица

$C_{K_2S_2O_8}$ մոլ/լ	$P = \frac{C'}{C}$	$X_{\text{макс.}}$	K (15°)
10^{-1}	0,1	0,60	$1,25 \cdot 10^8$
10^{-1}	0,2	0,48	$1,24 \cdot 10^8$
10^{-1}	0,05	0,70	$1,94 \cdot 10^8$
10^{-2}	0,5	0,22	$1,37 \cdot 10^8$

Как видно, значения K достаточно постоянны. Таким образом, при 15° образование комплекса пиридина с персульфатом калия протекает по уравнению:

Константа устойчивости равна $1,45 \cdot 10^8 \pm 0,23 \cdot 10^8$, т. е. такой комплекс значительно стабилен, отсюда и трудность его распада на продукты окисления-восстановления.

ՊԻՐԻԴԻՆ—ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՊԵՐՍՈՒԼՖԱՏ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՄԱՍԻՆ

Օ. Ա. ՎԱՐՏԱՊԵՏՅԱՆ, Օ. Ա. ՉԱԼՏԻԿՅԱՆ և Ա. Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Մեր լաբորատորիայում կատարված հետազոտություններից հայտնի է, որ կալիումի պերսուլֆատը պիրիդինի հետ ջրային միջավայրում [1] մինչև 40° ռեակցիայի մեջ չի մտնում:

Ներկա աշխատանքում սպեկտրաֆոտոմետրիկ եղանակով, ուտրամանուշակագույն տիրույթում ուսումնասիրված է պիրիդին—կալիումի պերսուլֆատ կոմպլեքսը ջրային միջավայրում: Փորձերը ցույց տվեցին, որ $15^\circ \pm 0,1$ ջերմաստիճանում ստացված կոմպլեքսն ունի $[C_5H_5N(S_2O_8)_4]K_8$ բաղադրությունը: Հաշված է նրա կայունության հաստատունը ($1,45 \cdot 10^8 \pm 0,23 \cdot 10^8$), որը ցույց է տալիս կոմպլեքսի բավականին կայուն լինելը: Դրանով էլ բացատրվում է ստացված կոմպլեքսի, օքսիդա-վերականգնման քայքայման դժվարությունը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Օ. Ա. Чалтыкян, Н. М. Бейлерян, М. С. Чобанян, Э. Р. Саруханян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 14, 243 (1961).
- Ս. Լ. Мхитарян, Н. М. Бейлерян, Օ. Ա. Чалтыкян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 16, 527, (1963).
- Л. Ногер, Е. Швенк, Lieb. Ann., 566, 691 (1950).
- Э. Г. Новицкий, Г. В. Королев, Пласт. масс., № 7, 27 (1969).
- Р. Job, Ann. Chim., 19, 113 (1928):

тора. Этот метод может быть полезным особенно в том случае, если скорость реакции $S_2O_8^{2-} + Me^{n+}$ не подлежит определению.

В настоящем сообщении приводятся кинетические данные, полученные этим методом для реакции $S_2O_8^{2-} + Ag^+$. Эта система часто применяется как сильный окислитель [3, 4]. Она является также хорошим источником генерации свободных радикалов для инициирования радикальной полимеризации [5—7].

Луненок-Бурмакиной и Бродским [8] было установлено, что взаимодействие $S_2O_8^{2-}$ с Ag^+ начинается переходом одного электрона от иона Ag^+ к иону $S_2O_8^{2-}$. Однако кинетика этого процесса недостаточно изучена. Для реакции $P + Ag^+ \rightarrow Ag^{2+} + SO_4^{1-} + SO_4^{2-}$ найдено [9] значение энергии активации $17,9 \text{ ккал/моль}$, а в работе [10], где изучено окисление этанола и метанола персульфатом в присутствии Ag^+ , получено для $E_{\text{эф}} = 8 \pm 1 \text{ ккал/моль}$ в случае реакции $P + \text{этанол}$ и $7,5 \pm 1 \text{ ккал/моль}$ для реакции $P + \text{метанол}$. Непонятно высокое значение энергии активации, приведенное в работе [9]. Во второй работе $E_{\text{эф}}$ относится к суммарному процессу.

Экспериментальная часть

Скорость инициирования реакции $K_2S_2O_8 + AgNO_3 + C_2H_5OH$ определялась методом ингибирования по уравнению

$$W_{\text{ин.}} = \frac{f [Inh]_0}{\tau}, \quad (3)$$

где τ — индукционный период, $[Inh]_0$ — начальная концентрация и f — стехиометрический коэффициент ингибитора.

В качестве эффективного ингибитора нами взят иминоксильный

стабильный радикал $\text{OC} \begin{array}{c} \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C} \quad \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \end{array} \text{NO} \cdot$, стехиометрический коэффициент

которого равен 1.

Все опыты проведены в атмосфере азота, содержащего не больше $5 \cdot 10^{-3} \%$ кислорода. В раствор персульфата и ингибитора после термостатирования впрыскивались шприцем этанол и раствор $AgNO_3$, заранее освобожденные от растворенного в них кислорода. Подробное описание эксперимента и степень очистки реагентов приведены в работах [1, 2].

В одной серии опытов начальные концентрации персульфата калия (Р), ингибитора (RNO) и $AgNO_3$ оставались постоянными, менялась начальная концентрация этанола (Э). Из рисунка 1 видно, что до концентрации этанола $0,08 \text{ моль/л}$ скорость инициирования не зависит от

нее (в случае концентрации спирта 0,02; 0,04 и 0,08 моль/л индукционный период не зависит от последнего и равен 15 минутам). Это указывает на то, что в определенном интервале начальной концентрации этанола последний не принимает участия в процессе инициирования. По этой причине дальнейшие измерения проводились при $[Э]_0 = 0,08$ моль/л. Таким же способом определялась зависимость скорости инициирования от начальных концентраций P и $AgNO_3$ (рис. 2 и 3). Экспериментальные данные обработаны, предполагая, что одновременно имеются два параллельных пути генерации активных центров (Ag^{2+} и $SO_4^{\cdot-}$):

Рис. 1. Кинетические кривые расходования персульфата ($[P] = 0,042$, $[AgNO_3] = 1 \cdot 10^{-4}$, $[RNO] = 2 \cdot 10^{-5}$ моль/л, $t = 35^\circ$) при различных концентрациях этанола: 1 — 0,02; 2 — 0,04; 3 — 0,08; 4 — 0,12; 5 — 0,2; 6 — 0,4 моль/л.

Рис. 2. Кинетические кривые расходования персульфата ($[Э] = 0,08$, $[AgNO_3] = 1 \cdot 10^{-4}$, $[RNO] = 2 \cdot 10^{-5}$ моль/л, $t = 35^\circ$) при концентрациях персульфата: 1 — 0,020; 2 — 0,042; 3 — 0,083 моль/л.

Из приведенной схемы следует, что

$$W_{ин.} = W_{ин.}^{\circ} + W_{ин. Ag^+} \quad (6)$$

или

$$W_{ин.} = k_{ин.}^0 [S_2O_8^{2-}] + k_{ин. Ag^+} [Ag^+] [S_2O_8^{2-}], \quad (7)$$

Откуда

$$W_{ин.} - k_{ин.}^0 [S_2O_8^{2-}] = k_{ин. Ag^+} [Ag^+] [S_2O_8^{2-}]. \quad (8)$$

Кривые 1 и 2 рисунка 4 указывают на правильность сделанного предположения относительно механизма генерации активных центров.

Расходование ингибитора происходит по следующим актам*

Рис. 3. Кинетические кривые расходования персульфата ($[P] = 0,042$, $[Э] = 0,08$, $[\text{RNO}] = 2 \cdot 10^{-5}$ моль/л, $t = 35^\circ$) при различных концентрациях AgNO_3 : 1— $1 \cdot 10^{-4}$; 2— $4 \cdot 10^{-4}$; 3— $4 \cdot 10^{-4}$; 4— $8 \cdot 10^{-4}$ моль/л

Рис. 4. Зависимость скорости ингибирования [обусловленной актом (5)] от начальных концентраций AgNO_3 (кр. 1) и $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ (кр. 2).

Отсюда следует, что ингибитор расходуется в 2 раза быстрее, чем персульфат, т. е.

$$-\frac{d[\text{Inh}]}{dt} = -2 \frac{d[P]}{dt}, \quad (12)$$

а так как для акта (5)

$$-\frac{d[\text{Inh}]}{dt} = W_{\text{инг. Ag}^+} = k_{\text{инг. Ag}^+} [\text{Ag}^+] [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \quad (13)$$

* Не исключается возможность участия радикала OH в упомянутых актах:

Но это не может менять кинетику расходования RNO , так как число активных центров не меняется в актах (9) и (10), вместо Ag^{2+} и SO_4^- будет фигурировать радикал OH .

$$-\frac{d[P]}{dt} = k_{Ag^+} [Ag^+] [S_2O_8^{2-}], \quad (14)$$

$$k_{Ag^+} = \frac{k_{ин. Ag^+}}{2}, \quad (15)$$

где $k_{ин. Ag^+}$ определяется из опытных данных по (8), а k_{Ag^+} — константа элементарного акта (5).

Зависимость $k_{расп.}$ и k_{Ag^+} от температуры приведена в таблице.

Таблица

$t, ^\circ C$	30	35	40	45
$k_{расп.} \cdot 10^5 [2], мин^{-1}$	0,351	0,748	1,52	3,55
$k_{Ag^+} \cdot 10^2, л/моль^{-1} \cdot мин^{-1}$	6,7	8,7	11,2	13,7

Приведенные в этой таблице данные удовлетворяют уравнению Аррениуса:

$$k_{Ag^+} = 3,45 \cdot 10^5 \exp(-9300/RT) л \cdot моль^{-1} \cdot мин^{-1}.$$

Полученное нами значение энергии активации (9,3 ккал/моль) для акта (5) дает основание полагать, что он правильно отражает механизм генерации свободных радикалов как переход одного электрона от Ag^+ к $S_2O_8^{2-}$, так как энергия активации реакции

по данным различных авторов, колеблется между 10 + 12 ккал/моль [11, 12].

Из акта (5) следует также, что переход одного электрона от Ag^+ к $S_2O_8^{2-}$ осуществляется вследствие взаимодействия между двумя разноименно заряженными ионами. В таком случае надо было ожидать отрицательный солевой эффект. Изучением влияния $NaNO_3$ на скорость акта (5) по описанному в данном сообщении методу установлено, что в действительности, между $\lg k_{Ag^+}$ и $\sqrt{\mu}$ (μ — ионная сила раствора) имеется линейная связь с тангенсом угла наклона, равным $-1,86$ (≈ -2). Этот результат находится в удовлетворительном согласии с теорией [13].

ՊԵՐՍՈՒԼՅԱՏ-ԻՈՆ—ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՎԱԼԵՆՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԻՈՆ ԴԱՆԴԱՂ
ԸՆԹԱՑՈՂ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԻՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՊԵՐՍՈՒԼՅԱՏ—ԷԹԱՆՈՂ
ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ն. Մ. ԲԵՅԼԵՐՅԱՆ, Ա. Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ե Զ. Հ. ՉԱԼԹԻԿՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Փոփոխական վալենտականության կատիոնով պերսուլֆատ-իոնի վերականգնման տարրական ակտի կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրության համար առաջարկված է նոր մեթոդ՝ $S_2O_8^{2-}$ + ալկոհոլներ սիստեմներ, որպես կինետիկական ինդիկատորի օգտագործում:

Հաստատված է, որ պերսուլֆատ-իոնի հետ արծաթի իոնի փոխազդումը տեղի է ունենում համաձայն հետևյալ ռեակցիայի

որտեղ k_{Ag^+} — տարրական ակտի արագության հաստատունն է, վերջինիս շերտաատիճանային կախվածությունը 30—45^o տիրույթում բավարարում է Արրենիուսի հավասարմանը՝

$$k_{Ag^+} = 3,45 \cdot 10^5 \exp(-9300/RT) \text{ l} \cdot \text{մոլ}^{-1} \cdot \text{րոպե}^{-1},$$

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. Г. Хачатрян, Н. М. Бейлерян, О. А. Чалтыкян, Арм. хим. ж., 23, 485 (1970).
2. Н. М. Бейлерян, А. Г. Хачатрян, О. А. Чалтыкян, Арм. хим. ж., 23, 575 (1970).
3. D. A. House, Chem. Rev., 62, 185 (1962).
4. Н. М. Бейлерян, Автореферат канд., дисс., Ереван, 1962.
5. P. Vacon, Trans. Far. Soc., 42, 155 (1946).
6. T. Kagiya, S. Morita, K. Fukui, Bull. Chem. Soc., Japan, 42, 2587 (1969).
7. T. Kagiya, S. Morita, K. Fukui, Bull. Chem. Soc., Japan, 42, 2583 (1969).
8. В. Луненок-Бурмакина, А. Бродский, ДАН СССР, 129, 1335 (1959).
9. C. Vawn, D. Margerison, Trans. Far. Soc., 51, Pt 7. 925 (1955).
10. B. Stehlik, F. Fiala, Chem. Zvesti, 2, 97 (1966).
11. I. Kolthoff, A. Medalla, H. Raaien, J. Am. Chem. Soc., 73, 1733 (1951).
12. J. Fordham, H. Williams, J. Am. Chem. Soc., 73, 1633 (1951).
13. Н. М. Эмануэль, Д. Г. Кнорре, Курс химической кинетики, Изд. «Высшая школа», Москва, 1969, стр. 126.

УДК 541.127+542.9526+678.763.2

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛОЕВ ЭМУЛЬГАТОРА НА КИНЕТИКУ И МЕХАНИЗМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

IV. ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ САМОПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ХЛОРОПРЕНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

А. А. ОГАНЕСЯН, Л. Г. МЕЛКОНЯН, Р. В. БАГДАСАРЯН и И. А. ГРИЦКОВА

Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт
полимерных продуктов (Ереван)

Поступило 12 I 1971

Проведена эмульсионная полимеризация хлоропрена с применением неионогенного эмульгатора (Ц-35) в инертной среде в отсутствие иницирующих веществ. Установлено, что протекание самопроизвольной полимеризации связано с наличием в системе поверхностного слоя эмульгатора, создающего благоприятные условия для активации мономера. Изучена зависимость скорости полимеризации от температуры. Определена общая энергия активации эмульсионной полимеризации—18,3 ккал/моль.

Рис. 4, библиографические ссылки 4.

В предыдущих работах [1—3] показано, что при наличии слоя эмульгатора хлоропрен и стирол при определенных условиях могут полимеризоваться в отсутствие каких-либо иницирующих веществ. При этом предполагалось, что активация мономера связана с поляризационно-ориентационным эффектом, имеющим место в гидрофобном участке слоя эмульгатора.

Для экспериментального подтверждения этого предположения необходимо было убедиться в индивидуальности компонентов системы и нейтральности их молекул в акте активации мономера. В настоящей работе на основе анализа полученных ранее данных [1—3] и данных дополнительно проведенных измерений мы попытались доказать справедливость этих предположений.

Экспериментальная часть

Скорость полимеризации измерялась dilatометрическим методом в инертной среде, создаваемой многократным замораживанием и размораживанием отдельных фаз эмульсии в вакууме с одновременным продуванием очищенным азотом.

При выборе метода очистки неионогенных эмульгаторов принимали во внимание образование этими эмульгаторами в органических растворителях истинных растворов и коллоидное растворение их в воде [4].

В качестве растворителя использовался *n*-бутанол. 10%-ный водный раствор эмульгатора 2 раза промывался *n*-бутанолом. После отстаивания углеводородный слой отделялся и подвергался перегонке. О чистоте использованных эмульгаторов судили по величине удельной электропроводности водных растворов. Низкая удельная электропроводность растворов этих веществ (до дополнительной очистки $1,1 \cdot 10^{-5}$ — $1,3 \cdot 10^{-5}$ $\text{ом}^{-1} \cdot \text{мм}^{-1}$) говорит о практическом отсутствии примесей электролитов.

Рис. 1. Хроматограмма очищенного хлоропрена снята на ЛХМ-8М.

Хлоропрен очищался по методике, описанной в работе [1]. На рисунке 1 приведена хроматограмма очищенного нами хлоропрена.

Несмотря на то, что общеизвестными методами нам не удавалось обнаружить примесей, можно полагать, что они существуют в очень малых количествах. Оставалось доказать, что эти ничтожные примеси не оказывают влияния на активацию мономера. Экспериментально установлено [1], что отдельные компоненты системы (и, следовательно, содержащиеся в них примеси) не обладают иницирующей способностью. Можно полагать, что инициатором является окислительно-восстановительная система, компоненты которой находятся в разных фазах и только при смешивании фаз они могут взаимодействовать между собой, иницируя процесс. Однако, как установлено [2], при отсутствии слоя эмульгатора (ниже критической концентрации мицеллообразования) при смешивании фаз полимеризационные процессы не наблюдаются. Считая доказанным, что для самопроизвольной активации мономера необходимо наличие слоя эмульгатора [2], остается предположить, что

необнаруженные нами примеси, если даже инициируют процесс, то только при наличии поверхностных слоев эмульгатора. Но при этом (из-за очень малых количеств примесей) мы должны были наблюдать резкий спад скорости после сравнительно небольшой конверсии или более низкую скорость после предварительной длительной выдержки эмульсионной системы при низкой температуре. Это привело бы к израсходованию компонентов окислительно-восстановительной системы. Однако, как видно из рисунка 2, скорость полимеризации при 40° до 65% конверсии не меняется, а 3-часовая выдержка эмульсии при 19° и дальнейшее проведение процесса при 40° на скорость не влияют. На кривой 1 (рис. 2) приведены также результаты измерений скорости полимеризации, проводимой в темноте в тех же условиях. Эти измерения говорят об отсутствии фотохимического инициирования. По данным зависимости скорости полимеризации от температуры (рис. 3) определена общая энергия активации, равная $18,3$ ккал/мол [4].

Рис. 2. Зависимость конверсии от времени: 1 — $T=40^\circ$ ($\blacktriangle$) в темноте; 2 — $T=19^\circ$; 3 — $T=40^\circ$.

Рис. 3. Зависимость конверсии от времени при разных температурах: 1 — 19° ; 2 — 32° ; 3 — 40° ; 4 — 45° .

Считая установленным, что причиной самопроизвольной эмульсионной полимеризации является поляризационно-ориентационный эффект [2], имеющий место в гидрофобном участке слоя эмульгатора, мы сочли необходимым установить характер образующихся растущих цепей.

Методом ЭПР нам не удалось обнаружить радикалов в системе, что, очевидно, можно объяснить низкой стационарной концентрацией последних, влиянием компонентов системы на измерение, гибелью радикалов при приготовлении препаратов и т. д. Однако эффективное ингибирование полимеризации гидрохиноном [2], регулирование молекулярного веса полимера меркаптаном и вид кривых молекулярно-весового распределения [3] говорят в пользу радикального характера процесса.

Все изложенное подтверждает справедливость выдвинутых нами предположений о том, что слой эмульгатора является не только основной зоной полимеризационных процессов, но и зоной, где поляризационно-ориентационный эффект, осуществляемый в гидрофобном участ-

ке слоя эмульгатора, играет первостепенную роль в процессе активации мономера и роста цепи.

Рис. 4. Зависимость логарифма скорости от $\frac{1}{T}$.

ԷՄՈՒԼԳԱՏՈՐԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ԿԻՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՎՐԱ

IV. ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԼՈՐԱՊՐԵՆԻ ԽՔՆԱՐԵՐԱՐԱՐ ԸՆԹԱՑՈՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Լ. Գ. ՄԵԼԲՈՆՅԱՆ, Ռ. Վ. ԲԱԳԴԱՍԱՐՅԱՆ Ե Ի. Ա. ԳՐԻՑԿՈՎԱ

Ա մ փ ո փ ու մ

Չեզոք միջավայրում, հարուցիչ նյութերի բացակայությամբ կատարված է քլորապրենի էմուլսիոն պոլիմերացում ոչ իոնոգեն էմուլզատորի ներկայությամբ:

Ապացուցված է, որ ինքնաբերաբար ընթացող պոլիմերացումը կապված է էմուլզատորի շերտի ներկայության հետ, որը մոնոմերի ակտիվացման համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում:

Ուսումնասիրված է ռեակցիայի արագության կախումը ջերմաստիճանից: Ստացված տվյալներից ելնելով հաշված է ինքնաբերաբար ընթացող պոլիմերացման ակտիվացման էներգիան, որը հավասար է 18,3 կկալ/մոլ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Л. Г. Мелконян, И. А. Грицкова, А. А. Оганесян, Р. В. Багдасарян, Уч. зап. ЕГУ, № 1, 100 (1969).
2. А. А. Оганесян, Л. Г. Мелконян, Р. В. Багдасарян, И. А. Грицкова, Арм. хим. ж., 24, 200 (1971).
3. А. А. Оганесян, Л. Г. Мелконян, Р. В. Багдасарян, И. А. Грицкова, Арм. хим. ж., 24, 660 (1971).
4. Г. Н. Шенфельд, Неионогенные моющие средства, Изд. «Химия», Москва, 1965

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 543.212+546.49

К ПРИМЕНЕНИЮ ТИОПИПЕРИДОНА В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

III. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ТИОПИПЕРИДОНА С МЕРКУРИ- И МЕРКУРО-ИОНАМИ

В. М. ТАРАЯН, А. А. САРҚИСЯН и А. В. МУШЕГЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 9 IV 1971

Методом потенциометрического и амперометрического титрования, спектрофотометрии и инфракрасной спектроскопии установлено, что ртути-ион взаимодействует с тиопиперидоном в стехиометрическом отношении 1:2 с образованием неустойчивого и нерастворимого соединения:

разлагающегося с выделением сульфида ртути(II). Меркуро-ион взаимодействует с тиопиперидоном аналогичным образом с той лишь разницей, что одновременно с образованием вышеуказанного соединения наблюдается выделение черного осадка элементарной ртути.

Реакция использована для потенциометрического определения миллиграммовых и амперометрического определения микрограммовых количеств ртути- и меркуро-ионов. Изучено влияние сопровождающих ионов.

Рис. 5, табл. 3, библиографические ссылки 4.

Ранее опубликованные сообщения были посвящены исследованию реакций тиопиперидона с золотом(III) [1] и серебром [2].

В данной статье изложены результаты исследования реакций тиопиперидона с ртути- и меркуро-ионами.

Экспериментальная часть

Раствор меркуринитрата готовили растворением навески соли и последующим определением титра полученного раствора по точным навескам гарантийного препарата хлорида натрия (индикатор—дифенилкарбазон). Раствор меркуронитрата готовили растворением соли, а определение титра полученного раствора осуществляли йодометрически [3].

Синтез тиопиперидона был проведен ранее описанным способом [1].

Рабочий раствор тиопиперидона готовили растворением точной навески его в ацетоне и далее разбавляли до заданного объема дистиллированной водой. Полученный раствор в конечном объеме содержал около 5% ацетона.

Реакции ртути- и ртути-ионов с тиопиперидоном исследовались методами потенциометрического и амперометрического титрования и спектрофотометрии.

Исследование систем Hg^{2+} — тиопиперидон и Hg_2^{2+} — тиопиперидон потенциометрическим титрованием. Измерения проводили на потенциометре ЛПМ-60 М. Индикаторным электродом служил амальгмированный платиновый электрод, а электродом сравнения — ртутно-йодидный. Кислотность исследуемых растворов поддерживали в пределах значения рН 1,0.

Рис. 1. Кривые потенциометрического титрования ртути- (кр. 1) и ртути-иона (кр. 2) тиопиперидоном: $[\text{Hg}^{2+}] = 4,92 \cdot 10^{-2}$; $[\text{Hg}_2^{2+}] = 4,85 \cdot 10^{-2}$; [тиопип.] = $4,92 \cdot 10^{-2}$ М.

На приведенных кривых рисунка 1 (кр. 1) скачок потенциала наблюдается при стехиометрическом отношении реагирующих компонентов Hg^{2+} : тиопип. = 1 : 2 (табл. 1).

Последующее добавление раствора реагента новых скачков не вызвало. С самого начала титрования раствора ртути-нитрата выпадает нерастворимый осадок, который вскоре чернеет.

Рис. 2. ИК спектр фильтрата от осадка, образовавшегося при взаимодействии ртути-иона с тиопиперидоном.

По истечении определенного периода времени, когда процесс разложения и изменения окраски осадка полностью завершился, осадок отфильтровали и исследовали его состав. Элементный анализ этого осадка показал, что он не содержит углерода, водорода и азота; а со-

держание ртути и серы в нем примерно соответствует таковому в сульфиде ртути. Согласно теоретическим расчетам, сульфид ртути должен содержать 13,71% серы и 85,9% ртути. Результаты повторных определений этих двух элементов в образующемся осадке показали, что среднее содержание серы в нем равно 14,26%, ртути—86,10%, что соответствует мольному отношению $\text{Hg}^{2+} : \text{тиопип.} = 1 : 1$. Таким образом, полученный в описанных условиях осадок представляет собой сульфид ртути. В фильтрате от упомянутого осадка был обнаружен сульфид-ион в количестве, почти равном его содержанию в осадке. После соответствующей обработки фильтрата методом ИК спектроскопии было показано наличие карбонильной и иминной групп в соединении, перешедшем в фильтрат (рис. 2) [4].

При потенциометрическом титровании ртути-иона тиопиперидоном в 0,5—2,0 *н* азотнокислой среде образующееся соединение устойчивее и процесс его разложения начинается заметно позже. Скачок потенциала опять-таки наблюдается при соотношении реагирующих компонентов $\text{Hg}^{2+} : \text{тиопип.} = 1 : 2$. В эквивалентной точке потенциал скачкообразно падает, но вскоре вновь постепенно возрастает до первоначального значения.

Потенциометрическое определение ртути-иона тиопиперидоном осуществимо в присутствии 50-кратного избытка мышьяка, 200-кратного цинка и 15-кратного меди.

При взаимодействии ртути-иона с тиопиперидоном образующийся осадок, вследствие одновременного выделения элементарной ртути, с самого же начала окрашен в черный цвет. Скачок потенциала в этом случае отмечается также при мольном отношении реагирующих компонентов $\text{Hg}_2^{2+} : \text{тиопип.} = 1 : 2$ (рис. 1, кр. 2 и табл. 1).

Исследование систем Hg^{2+} — тиопиперидон и Hg_2^{2+} — тиопиперидон амперометрическим титрованием. Амперометрическое титрование раствора ртути-иона проводили на вращающемся графитовом электроде по току восстановления определяемого иона ($\pm 0,00$ в) и окисления тиопиперидона (1,5 в) при кислотности, равной рН 1,0. Четкость перегиба в конечной точке титрования возрастает при использовании второго из вариантов, а перегиб кривой в обоих случаях соответствует моменту, когда стехиометрическое отношение компонентов $\text{Hg}^{2+} : \text{тиопип.} = 1 : 2$ (рис. 3).

Пропорциональность между величиной диффузионного тока и концентрацией ртути-иона при титровании по току восстановления наблюдается в интервале $2,69 \cdot 10^{-5} - 3,14 \cdot 10^{-4}$ г-ион $\text{Hg}^{2+}/\text{л}$, а во втором случае (по току окисления) этот интервал заметно шире — $5 \cdot 10^{-5} - 3 \cdot 10^{-3}$ г-ион $\text{Hg}^{2+}/\text{л}$.

Таблица 1

Результаты потенциметрического титрования ртути- и ртути-ионов тиопиперидоном (рН 1,0—0,3)

Взято		Затрачено 0,0492 М р-ра, мл	Получено Hg^{2+} , мг	Мольное отношение Hg^{2+} : тио- пип.	Ошибка, %		Взято		Затрачено 0,0485 М р-ра, мл	Получено Hg^{2+} , мг	Мольное отношение Hg^{2+} : тио- пип.	Ошибка, %	
Hg^{2+} , мг	Hg^{2+} , мг				абсолютная	относительная	Hg^{2+} , мг	Hg^{2+} , мг				абсолютная	относительная
2,00	19,69	4,00	19,69	1:2	$\pm 0,00$	$\pm 0,00$	2,00	19,46	4,00	19,46	1:2	$\pm 0,0$	$\pm 0,00$
1,50	14,79	3,02	14,88	1:2,01	$\pm 0,09$	$\pm 0,60$	1,20	11,68	2,44	11,78	1:2,03	+0,10	+0,90
1,00	9,84	1,99	9,79	1:2	-0,05	-0,50	1,00	9,73	2,00	9,73	1:2	$\pm 0,00$	$\pm 0,00$
0,90	8,86	1,83	8,95	1:2,03	+0,09	+1,0	0,80	7,97	1,65	8,03	1:2,06	+0,06	+0,70
0,80	7,87	1,58	7,78	1:1,97	-0,09	-1,10	0,60	5,84	1,20	5,84	1:2	$\pm 0,00$	$\pm 0,00$
0,70	6,89	1,40	6,89	1:2	$\pm 0,00$	$\pm 0,00$	0,50	4,86	1,00	4,86	1:2	$\pm 0,00$	$\pm 0,00$
0,70	6,89	1,39	6,82	1:1,98	-0,07	-1,00							
0,60	5,90	1,18	5,81	1:1,97	-0,09	-1,50							

Амперометрическое титрование ртути-иона при кислотности выше рН 1,0 не проводили, поскольку графитовый электрод неприменим в сильноокислой среде.

Рис. 3. Кривая амперометрического титрования ртути-иона по току окисления тиопиперидона:
 $[Hg^{2+}] = 4,92 \cdot 10^{-2}$; $[тиопип.] = 4,92 \cdot 10^{-2}$ М.

При амперометрическом титровании растворов ртути-нитрата перегиб в конечной точке наступает также при мольном отношении Hg^{2+} : тиопип. = 1:2. Пропорциональность между величиной диффузионного тока и концентрацией ртути-нитрата при титровании по току восстановления наблюдается в интервале концентрации $2,6 \cdot 10^{-5}$ — $2,8 \cdot 10^{-4}$ г-ион Hg^{2+} /л.

Данные амперометрического титрования ртути- и ртути-ионов тиопиперидоном приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты амперометрического титрования
ртути- и ртути-ионов тиопиперидоном
(рН 1,56)

Взято, мг	Получено, мг	О ш и б к а, %	
		абс.	относ.
19,74	19,73	-0,01	-0,05
14,80	14,71	-0,09	-0,60
14,80	15,05	+0,25	+1,60
Hg ²⁺ 9,87	9,87	±0,00	±0,00
9,87	9,82	-0,05	-0,50
4,94	4,99	+0,05	+1,00
0,99	0,99	±0,00	±0,00
0,49	0,49	±0,00	±0,00
Hg ₂ ²⁺ 38,92	38,92	±0,00	±0,00
19,46	20,00	+0,54	+2,07
9,73	9,82	+0,09	+0,90
9,73	9,73	±0,00	±0,00

Спектрофотометрическое исследование системы Hg²⁺ — тиопиперидон. Измерения проводили на спектрофотометре СФ-4А. На рисунке 4 приведены спектры поглощения растворов Hg²⁺-иона, тиопиперидона, смеси этих растворов в отношении 1:2 и водноацетоновой смеси. Спектр поглощения тиопиперидона при добавлении ртути-иона сме-

Рис. 4. Спектры поглощения: 1 — $1,88 \cdot 10^{-4}$ М р-ра ртути-иона; 2 — водно-ацетоновой смеси; 3 — $1,88 \cdot 10^{-4}$ М р-ра тиопиперидона; 4 — $1,88 \cdot 10^{-4}$ М растворов ртути-иона и тиопиперидона при соотношении 1:2.

щается в более коротковолновую область—свидетельство о химическом взаимодействии ртути-иона с реагентом. Наибольшее отклонение от аддитивности наблюдается в области спектра 235 нм.

Рис. 5. Исследование системы Hg^{2+} —тиопиперидон методом мольных отношений: $[Hg^{2+}] = [тиопип.] = 1,88 \cdot 10^{-4}$ М.

Это обстоятельство было использовано для спектрофотометрического определения отношения компонентов в образующемся соединении методом мольных отношений, т. е. при постоянной концентрации ртути-иона и переменной концентрации тиопиперидона. Полученные данные хорошо согласуются с результатами потенциометрического и амперометрического титрований, т. е. перегиб на кривых светопоглощения отмечается при отношении $Hg^{2+} : \text{тиопип.} = 1 : 2$ (рис. 5).

Обсуждение результатов

Исследование систем ртути-ион—тиопиперидон и ртути-ион—тиопиперидон потенциометрическим и амперометрическим титрованием и спектрофотометрически показало, что указанные компоненты реагируют друг с другом при отношении 1:2 с образованием труднорастворимого осадка.

Ранее на примере системы Ag^+ -ион—тиопиперидон было показано [2], что в растворе, содержащем тиопиперидон, устанавливается тиолактам-тиолактимное таутомерное равновесие с последующим замещением водорода тиольной группы на ион серебра.

В рассматриваемом случае водород тиольной группы замещается на ион ртути (II):

Образующийся белый осадок вскоре гидролитически разлагается (при кислотности pH 1,0) с выделением осадка сульфида ртути(II).

Установлено наличие в фильтрате соответствующего количества серы, а образование пиперидона подтверждено ИК спектроскопией (СО- и NH-группы). Описанное выше разложение тиопиперидоната ртути(II) не мешает применению тиопиперидона в качестве реагента для потенциометрического и амперометрического определений макро- и микроколичеств Hg^{2+} - и Hg_2^{2+} -ионов, поскольку этими методами конечная точка титрования четко отмечается при отношении компонентов 1:2.

С практической точки зрения представляет интерес возможность амперометрического титрования микроколичеств Hg^{2+} -иона тиопиперидоном, осуществимого в довольно широком интервале концентраций в присутствии некоторых посторонних ионов (табл. 3).

Таблица 3

Результаты амперометрического титрования ртути-иона тиопиперидоном в присутствии некоторых посторонних ионов

Hg^{2+} , мг		Мольное относительное количество добавляемого иона	Ошибка, %	
взято	получено		абс.	относ.
4,92	4,88	$\text{Hg}^{2+} : \text{Cu}^{2+} = 1 : 10$	-0,04	-0,80
4,92	4,86	$\text{Hg}^{2+} : \text{Tl}^{1+} = 1 : 12$	-0,06	-1,20
4,92	4,88	$\text{Hg}^{2+} : \text{Zn}^{2+} = 1 : 200$	-0,04	-0,80
4,92	4,90	$\text{Hg}^{2+} : \text{AsO}_4^{3-} = 1 : 40$	-0,02	-0,40
4,92	4,90	$\text{Hg}^{2+} : \text{Br}^{3+} = 1 : 200$	-0,02	-0,40
4,92	4,89	$\text{Hg}^{2+} : \text{Cd}^{2+} = 1 : 200$	-0,03	-0,60

ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱՅՈՒՄ ԹԻՈՊԻՊԵՐԻԴՈՆԻ ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

III. ՄԵՐԿՈՒՐԻ- և ՄԵՐԿՈՒՐՈ-ԻՈՆՆԵՐԻ ՀԵՑ ԹԻՈՊԻՊԵՐԻԴՈՆԻ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Վ. Մ. ՔԱՌԱՅԱՆ, Ա. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ և Ա. Վ. ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ

Ա Մ Վ Ո Վ Ո Ւ Մ

Պոտենցիոմետրիկ, ամպերամետրիկ տիտրման և սպեկտրաֆոտոմետրիկ, ինչպես նաև ԻԿ-սպեկտրաակտիական եղանակներով հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ թիոպիպերիդոնը մերկուրի-իոնի հետ փոխազդում է, առա-

ջացնելով $\left(\begin{array}{c} \text{C}_5\text{H}_4\text{N} \\ \text{S} \end{array} \right)_2 - \text{Hg}$ անկայուն միացությունը, որը քայքայվում է սնդիկի (II) սուլֆիդ առաջացնելով:

Մերկուրո-իոնը թիոպիպերիդոնի հետ փոխազդում է նույն կերպ՝ միայն այն տարբերությամբ, որ բացի վերը նշված նյութի առաջացումից, միաժամանակ նկատվում է տարրային սնդիկի սև նստվածքի գոյացում:

Այս ռեակցիան օգտագործվում է մերկուրի- և մերկուրո-իոնների միլիգրամային քանակների պոտենցիոմետրիկ և միկրոգրամային քանակների ամպերամետրիկ տրոշման համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. В. М. Тараян, А. А. Саркисян, Арм. хим. ж., 19, 932 (1966).
2. В. М. Тараян, А. А. Саркисян, Арм. хим. ж., 21, 662 (1968).
3. В. М. Тараян, Меркуроредуктометрия, Изд. ЕГУ, Ереван, 1958.
4. «Применение спектроскопии в химии», Под ред. В. Веста, Изд. ИЛ, Москва, 1959, стр. 421.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 542.91+547-314

ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЛАКТОНОВ

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СОЛЕЙ 3-КАРБОКСИ-4-МЕТИЛ-5,5-ДИАЛКИЛ- Δ^3 -БУТЕНОЛИДОВ И ИХ РАЗЛОЖЕНИЕ

А. А. АВЕТИСЯН, Г. Е. ТАТЕВОСЯН и М. Т. ДАНГЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 28 I 1971

Изучена солеобразующая способность 3-карбоксо-4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолидов с различными аминами и термическое разложение полученных солей. Разложение аммониевых солей в зависимости от характера амина протекает в двух направлениях с образованием соответствующих амидолактонов и 4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолидов.

Табл. 1, библиограф. ссылок 3.

Известно, что 3-карбоксо-4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолиды гидролизуются в присутствии кислот и оснований с образованием 3-карбоксо-4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолидов [1, 2].

В данной работе изучалась солеобразующая способность указанных кислот с аминами и разложение этих солей. Показано, что эти ненасыщенные кислоты легко и с хорошими выходами дают аммониевые соли при обработке их водными растворами различных аминов при комнатной температуре.

Так, при взаимодействии 3-карбоксо-4,5,5-триметил- и 3-карбоксо-4-метил-5,5-пентаметилен- Δ^3 -бутенолидов с аммиаком, метиламином, диметиламином, анилином и бензиламином с хорошими выходами получены соответствующие соли. Некоторые из них были получены ранее [1].

Все соли—водорастворимые кристаллические вещества.

Изучение разложения этих солей показало, что реакция протекает в двух направлениях с образованием соответствующих амидолактонов [2] и воды или с выделением свободного амина, углекислого газа и 4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолидов. Так, например, при разложении солей 3-карбоксолактонов с аммиаком, метиламином, диметиламином и диэтиламином выделяются углекислый газ, амины и получаются 4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолиды, строение которых доказано встречным синтезом—декарбоксоилированием [3-карбоксо-4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолидов [1, 2].

I. а) $R^I = R^{II} = CH_3$, б) . в) . г) . а) $R, R^{II} = (CH_2)_5$, е) . III. а) $R^I = R^{II} = CH_3$, б) $R^I R^{II} = (CH_2)_5$	$R^{III} = R^{IV} = R^V = H$ $R^{III} = R^{IV} = R^V = CH_3$ $R^{III} = H, R^{IV} = R^V = CH_3$ $R^{III} = H, R^{IV} = R^V = C_2H_5$ $R^{III} = R^{IV} = R^V = H,$ $R^{III} = H, R^{IV} = R^V = CH_3$

При разложении солей с анилином и бензиламином получаются соответствующие амиды, константы которых полностью совпадают с константами ранее синтезированных амидов [1]:

Экспериментальная часть

Кислотный гидролиз 3-карбокситокси-4-метил-5,5-пентаметилен- Δ^3 -бутенолида. Смесь 6 г (0,025 моля) указанного эфиrolактона и 25 мл 20% ного раствора серной кислоты нагревают с обратным холодильником на водяной бане в течение 8—10 часов. Выпавшие кристаллы отфильтровывают и перекристаллизовывают из гептана. Получают 3 г (58%) 3-карбокситокси-4-метил-5,5-пентаметилен- Δ^3 -бутенолида с т. пл. 144—145°. Найдено %: С 62,40; Н 7,1. $C_{11}H_{14}O_4$. Вычислено %: С 62,8; Н 6,7.

Взаимодействие 3-карбокситокси-4,5,5-триалкил- Δ^3 -бутенолидов с аминами. Смесь 0,02 моля 3-карбокситокси-4,5,5-триалкил- Δ^3 -бутенолида и амина оставляют при комнатной температуре на 10—15 часов. Удаляют растворитель и получают соответствующие аммониевые соли (табл.).

Соли 3-карбокси-4-метил-5,5-диалкил- Δ^3 -бутенолидов с аминами (продолжительность реакции 10–15 часов при комнатной температуре)

III	А м и н	I			Выход, %	Т. пл °С	А н а л и з, %					
							най д е н о			в ы ч и с л е н о		
							С	Н	Н	С	Н	Н
$R' = R'' = CH_3$	CH_3NH_2	R ^{III} H	R ^{IV} CH ₃	R ^V H	55,0	110–112 (из бензола)	53,40	7,18	6,41	53,70	7,40	6,90
.	$(CH_3)_2NH^*$	H	CH ₃	CH ₃	58,0	125–126 (из толуола)	55,60	7,94	6,70	55,70	7,80	6,50
.	$(C_2H_5)_2NH$	H	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	63,0	67–68 (из ацетона)	49,51	8,30	5,48	49,30	8,60	5,70
.	$C_6H_5CH_2NH_2$	H	H	CH ₂ C ₆ H ₅	75,0	125–126 (промыли эфиром)	64,70	7,28	4,78	64,90	6,86	5,05
.	$C_6H_5NH_2$	H	H	C ₆ H ₅	58,0	98–99 (из толуола)	63,79	6,33	5,09	63,80	6,40	5,30
.	NH ₃	H	H	H	63,0	151–152 (промыли эфиром)	51,67	7,10	7,57 7,51	51,30	6,95	7,40
$R'R'' = (CH_3)_5$	NH ₃	H	H	H	54,0	172–173 (промыли ацет.)	58,23	7,35	5,84	58,10	7,48	6,10
.	$(CH_3)_2NH$	H	CH ₃	CH ₃	60,5	127–128 (из ксилола)	61,00	8,42	5,56	61,17	8,23	5,48

* Эта соль получается также при пропускании диметиламина через бензольный раствор лактонокислоты и при взаимодействии 3-карбоксо-4,5,5-триметил- Δ^3 -бутенолида с водным раствором диметиламина [2].

Термическое разложение аммониевой соли 3-карбокситриметил- Δ^3 -бутенолида. Нагревают 2 г (0,0106 моля) аммониевой соли на металлической бане при 160—190° до прекращения выделения углекислого газа. Охлаждают и остаток перекристаллизовывают из гексана или петролейного эфира. Получают 1,04 г (78%) 4,5,5-триметил- Δ^3 -бутенолида с т. пл. 41—42°. Найдено %: С 66,49; Н 7,66, $C_7H_{10}O_2$. Вычислено %: С 66,66; Н 7,9.

Декарбонизация 3-карбокситриметил- Δ^3 -бутенолида. Смесь 4 г (0,023 моля) 3-карбокситриметил- Δ^3 -бутенолида и бронзы нагревают на металлической бане при 200° до прекращения выделения углекислого газа. После перекристаллизации получают 1,6 г (53%) 4,5,5-триметил- Δ^3 -бутенолида с т. пл. 41—42° (из петр. эфира). Лит. данные [1]: т. пл. 41—43°, т. кип. 97—99°/12 мм.

4,5,5-Триметил- Δ^3 -бутенолид получается также разложением метиламмониевой соли с выходом 50%, диметиламмониевой соли с выходом 53%, диэтиламмониевой соли с выходом 52%.

Разложение диметиламмониевой соли 3-карбокситриметил-4-метил-5,5-пентаметил- Δ^3 -бутенолида. Аналогично описанному, при разложении 3 г (0,011 моля) диметиламмониевой соли 3-карбокситриметил-4-метил-5,5-пентаметил- Δ^3 -бутенолида получают 1,3 г (72,7%) 4-метил-5,5-пентаметил- Δ^3 -бутенолида с т. пл. 43—44° (из петр. эфира). Найдено %: С 73,2; Н 8,9. $C_{10}H_{14}O_2$. Вычислено %: С 73,00; Н 9,1.

Разложение анилиновой соли 3-карбокситриметил- Δ^3 -бутенолида. Нагревают 1,8 г (0,006 моля) анилиновой соли 3-карбокситриметил- Δ^3 -бутенолида при 180° в течение 0,5 часа. Наблюдается выделение воды и получается 1,13 г (63%) анилида с т. пл. 96—97° (из петр. эфира) [3]. Смешанная проба с анилидом лактона депрессии т. пл. не дает. Лит. данные [3]; т. пл. анилида 96,5—98° (из петр. эфира).

Разложение бензиламмониевой соли 3-карбокситриметил- Δ^3 -бутенолида. Аналогично описанному, при нагревании 2 г (0,007 моля) указанной соли при 180—200° выделяется вода и получается 1,8 г (60%) бензамидом лактонокислоты с т. пл. 86—88° (из гексана) [3]. Смешанная проба с бензамидом лактона депрессии т. пл. не дает. Лит. данные [3]; т. пл. бензамидом 87,5—88 (из петр. эфира).

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶԱԿԵՅԱՄ ԼԱԿՏՈՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

VII. 3-ԿԱՐԲՈՔՄԻ-4-ՄԵԹԻԼ-5,5-ԴԻՄԵԿԻԼ- Δ^3 -ԲՈՒՏԵՆՆՈՒԿԵՆԵՐԻ ԱՂԵՐԻ ՄՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՔԱՅՔԱՑՈՒՄ

Ա. Ա. ԱՂԵՏԻՍՅԱՆ, Գ. Ե. ՔԱԿԵՎՈՍՅԱՆ Լ Մ. Տ. ԴԱՆԴՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Ուսումնասիրված են տարբեր ամինների հետ 3-կարբոքսի-4-մեթիլ-5,5-դիմեկիլ- Δ^3 -բուտենոլիդների աղագոյացման ռեակցիան և ստացված աղերի շերմային քայքայումը:

Ցույց է տրված, որ 3-կարբոքսի-4-մեթիլ-5,5-դիալկիլ- Δ^3 -բուտենոլիդները սենյակային ջերմաստիճանում ամինների շրային լուծույթներով մշակելիս հեշտ և լավ ելքերով առաջացնում են ամոնիումային աղեր:

Ստացված աղերը ջերմային քայքայման ենթարկելիս առաջացնում են կամ համապատասխան ամիդոլակտոններ, կամ 4-մեթիլ-5,5-դիալկիլ- Δ^3 -բուտենոլիդներ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. А. Аветисян, Г. Е. Татевосян, С. Г. Мацоян, М. Т. Дангян ЖОрХ, 6, 962 (1970).
2. Л. А. Павлова, В. В. Белгородский, Э. Д. Венус-Данилова, ЖОХ, 36, 1386 (1966).
3. А. А. Аветисян, Г. Е. Татевосян, М. Т. Дангян, Арм. хим. ж., 24, 688 (1971).

Аминоацетали	Выход, %	Т. кип., °C/мм
$\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$	40	110/12
$\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{OC}_3\text{H}_7)_2$	46	152/8
$\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{OC}_3\text{H}_7)_2$	43	160/8
$(\text{CH}_3)_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$	46	102/7
$(\text{CH}_3)_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}(\text{OCHCH}_2\text{CH}_3)_2$	42	95/1

* М — найдено по содержанию азота.

Таблица

n_D^{20}	d_4^{20}	MR_D		Молекулярная формула	M^*	
		найдено	вычислено		найдено	вычислено
1,4540	0,9411	58,09	58,02	$C_{11}H_{23}O_2N$	201,87	201,33
1,4550	0,9125	76,40	76,50	$C_{13}H_{31}O_2N$	257,64	257,42
1,4450	0,9304	74,07	73,52	$C_{14}H_{29}O_3N$	259,80	259,39
1,4310	0,8734	64,31	64,84	$C_{13}H_{27}O_3N$	217,64	217,35
1,4485	0,9028	63,95	64,74	$C_{13}H_{27}O_3N$	217,46	217,35

Синтез дипропилацетата β-морфолинобутиральдегида. Смесь 17,4 г (0,2 моля) морфолина, 20,85 г (0,1 моля) свежеперегонного дипропилацетата β-хлорбутиральдегида, 15 г (0,1 моля) безводного йодистого натрия и 50 мл пропанола перемешивается при 90—95° в течение 30 часов. Выпавший после перегонки пропанола осадок отделяется фильтрованием. К фильтрату с целью связывания аминобутирала прибавляется 6 г (0,1 моля) ледяной уксусной кислоты. Непрореагировавший β-хлорбутираль удаляется экстракцией абсолютным эфиром. К остатку присоединяется водный слой, полученный промывкой эфирных вытяжек, и при охлаждении обрабатывается концентрированным водным раствором щелочи. Выделившийся аминобутираль экстрагируется эфиром. После высушивания и удаления эфира получается 11,2 г (43%) дипропилацетата β-морфолинобутиральдегида с т. кип. 160°/8 мм; d_4^{20} 0,9304; n_D^{20} 1,4450; M_{R_D} 74,07, вычислено 73,52; M 259,8, вычислено 259,39. ИК спектр свидетельствует о наличии ацетальной (1045—1180 cm^{-1}), группы.

Описанным способом были получены диметил-, дипропилацетаты β-пиперидинбутиральдегида.

Синтез дипропилацетата и диизопрпилацетата β-N,N-диметиламинобутиральдегида осуществляется вышеописанным способом с той лишь разницей, что реакция проводится в металлической бомбе.

Данные приведены в таблице.

β-N,N-ԴԻԱԿԻԼԱՄԻՆԱԿԱՐԱԳԱԼԴԵԶԻԴԵՆԻ ԴԻԱԿԻԼԱՑԵՏԱԼԵՆԻ ՍԻՆԹԵԶ

Լ. Ձ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ և Ծ. Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Մենք ցույց էինք տվել, որ կատալիտիկ քանակով քլորաջրածնի ներկայությամբ Ֆեթանոլի միջավայրում պոլիվինիլացետատի և β-N,N-դիմեթիլամինակարագալդեհիդի դիմեթիլացետատի միջև տեղի է ունենում փոխանակման ռեակցիա, որը հանգեցնում է ազոտի տարբեր պարունակությամբ պոլիվինիլամինաբուտիրալների առաջացման: Այլ ամինախմբերով պոլիվինիլամինաբուտիրալների սինթեզման և նրանց առաջացման ռեակցիաների կինետիկայի ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ էր սինթեզել մի շարք ամինաբուտիրալներ: Սինթեզել ենք հինգ նոր β-N,N-դիակիլամինաբուտիրալներ, որոնք կարող են հետաքրքրություն ներկայացնել իբրև ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութեր, քանի որ նրանց համանմանները գրական տվյալների համաձայն որդասպան նյութեր են:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Л. З. Казарян К. Ц. Тагмазян, Ц. Х. Варданян. Арм. хим. ж., 23, 1019 (1970).
2. A. R. Surrey, Пат. США, 3071613; [С. А., 59, 513 (1963)].
3. M. Sainclivier, Пат. США, 2929844; [С. А., 5429 (1960)].
4. A. Wohl, Ber., 39, 1953 (1906).
5. K. Fujiki, M. Daigaku, N. Kenkyu Hokoku, NO, 567; [С. А., 61, 3820с (1963)].
6. A. Wohl, F. Frank, Ber., 35, 1905 (1902).

СИНТЕЗ α, ω -ДИ(АМИНО)ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВ

К. А. АНДРИАНОВ, В. В. АСТАХИН, М. О. МЕЛИКЯН и В. К. ПЫЖОВ

Институт общей и неорганической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 2 IX 1970

Аммонолизом α, ω -дихлорполиорганосилоксанов с числом атомов кремния от 2 до 5 получены и охарактеризованы линейные α, ω -диамины: α, ω -ди(амино)тетраэтил-, α, ω -ди(амино)диэтилдипропилдсилоксаны; α, ω -ди(амино)гексаэтил-, α, ω -ди(амино)триэтилтрипропилтрисилоксаны; α, ω -ди(амино)октаэтил-, α, ω -ди(амино)тетраэтилтетрапропилтетрасилоксаны и α, ω -ди(амино)декаэтилпентасилоксан. В качестве исходных получены и охарактеризованы α, ω -дихлордиэтилдипропилди-, α, ω -дихлортриэтилтрипропилтри-, α, ω -дихлордекаэтилпентасилоксаны.

Рис. 1, табл. 2, библиографические ссылки 5.

α, ω -Дифункциональные соединения представляют интерес как исходные вещества при получении высокомолекулярных кремнийорганических и смешанных кремнийорганических—органических полимеров методом поликонденсации. В частности, α, ω -ди(амино)полиорганосилоксаны как линейные диамины могут представить интерес в качестве исходных веществ для получения высокомолекулярных соединений полиамидного типа.

Из литературных данных известно, что при аммонолизе α, ω -ди(хлор)диметилсилоксанов получают как циклические соединения—силазоксаны, так и линейные—диамины. Согласно этим данным, аммонолиз α, ω -ди(хлор)диметилсилоксанов с числом атомов кремния от 2 до 6 приводит к образованию циклических силазоксанов [1], а аммонолиз тех же соединений с числом атомов кремния 7 и выше—к линейным α, ω -ди(амино)диметилсилоксанам [2].

Аммонолиз 1,3-дихлор-1,1-диметил-3,3-диэтилсилоксана приводит к образованию также циклического соединения [1а].

В настоящей работе нами исследован аммонолиз α, ω -дихлордиэтилсилоксанов и α, ω -дихлорэтилпропилсилоксанов с общими формулами

Исходные α, ω -дихлордиалкилсилоксаны I получены неполным гидролизом диалкилдихлорсиланов по аналогии с описанным в литературе неполным гидролизом диметилдихлорсилана [3] и теломери-

защисей гексаалкилциклотрисилоксанов с диалкилдихлорсиланами, описанными нами ранее [4]. Из исходных α, ω -дихлорполиорганосилоксанов впервые нами получены и описаны α, ω -дихлордекаэтилпента-, α, ω -дихлордиэтилдипропилди-, α, ω -дихлортриэтилтрипропилтрисилоксаны. Некоторые физические константы и данные элементного анализа этих соединений приведены в таблице 2.

При исследовании аммонолиза указанных соединений было обнаружено, что в этом случае ход реакции иной, по сравнению с аммонолизом описанных в литературе соединений аналогичного порядка. Во всех случаях, судя по данным элементного анализа и ИК спектров, нами получены только линейные α, ω -диамины, согласно следующему уравнению:

1. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=1$; 2. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=2$; 3. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=3$; 4. $\text{R}=\text{C}_2\text{H}_5$, $n=4$;
5. $\text{R}=\text{C}_3\text{H}_7$, $n=1$; 6. $\text{R}=\text{C}_3\text{H}_7$, $n=2$; 7. $\text{R}=\text{C}_3\text{H}_7$, $n=3$.

Полученные соединения жидкости. Выходы, некоторые физические константы и данные элементного анализа приведены в таблице 1.

Рис. ИК спектры ди(амино)этилпропилсилоксанов:

- 1 — $\text{H}_2\text{N}[\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{O}]_n\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{NH}_2$;
2 — $\text{H}_2\text{N}[\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{O}]_2\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{NH}_2$;
3 — $\text{H}_2\text{N}[\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{O}]_3\text{Si}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)(\text{NH}_2)$.

ИК спектры ди(амино)этилпропилсилоксанов (рис.) указывают на отсутствие деформационных колебаний в области ~ 905 и $\sim 1170 \text{ см}^{-1}$, характерных для группы >NH . Наличие валентных колебаний в области $3380\text{--}3396$ и $3460\text{--}3473 \text{ см}^{-1}$, характерных для группы NH_2 , где наблюдается линейный характер указанных соединений.

Таблица 1

Вещества II	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	n_D^{20}	d_4^{20}	MR _D		Выход, %	А н а л и з, %							
					найдено	вычислено		С		Н		Si		N	
								найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
R=C ₂ H ₅ , n=1	56/0,5	C ₈ H ₂₄ N ₂ O ₂ Si ₂	1,4362	0,9089	63,44	63,54	52,5	44,36	43,58	10,81	10,97	25,29	25,48	12,65	12,69
R=C ₂ H ₅ , n=2	98/0,5	C ₁₂ H ₃₄ N ₂ O ₂ Si ₃	1,4377	0,9272	91,29	91,44	86,6	44,77	44,66	10,47	10,62	26,23	26,11	8,27	8,68
R=C ₂ H ₅ , n=3	144—145/1	C ₁₆ H ₄₄ N ₂ O ₂ Si ₄	1,4400	0,9391	119,1	119,34	64,7	45,63	45,22	10,28	10,43	26,30	26,44	6,54	6,59
R=C ₂ H ₅ , n=4	154—155/0,5	C ₂₀ H ₅₄ N ₂ O ₂ Si ₅	1,4413	0,9478	146,92	147,24	64,5	45,61	45,57	10,54	10,32	26,13	26,64	4,99	5,31
R=C ₃ H ₇ , n=1	68/2	C ₁₀ H ₂₄ N ₂ O ₂ Si ₂	1,4390	0,8959	72,94	72,80	72,5	48,03	48,32	11,46	11,35	22,83	22,60	11,2	11,2
R=C ₃ H ₇ , n=2	106—107/2	C ₁₅ H ₃₈ N ₂ O ₂ Si ₃	1,4404	0,9136	105,3	105,33	84,4	49,59	49,39	11,02	11,06	23,46	23,10	7,26	7,67
R=C ₃ H ₇ , n=3	153—155/1	C ₂₀ H ₄₈ N ₂ O ₂ Si ₄	1,4423	0,9223	138,00	137,86	82,7	49,83	49,94	10,72	10,90	23,28	23,35	5,84	5,82

Таблица 2

Вещества I	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	n_D^{20}	d_4^{20}	MR _D		А н а л и з, %							
					найдено	вычислено	С		Н		Si		Cl	
							найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
R=C ₂ H ₅ , n=4	172—175/1—2	C ₂₀ H ₃₀ Cl ₂ O ₄ Si ₅	1,4436	1,0033	149,70	150,40	42,36	42,44	9,29	8,9	24,55	24,81	12,35	12,53
R=C ₃ H ₇ , n=1	58/1,5	C ₁₀ H ₂₄ Cl ₂ O ₂ Si ₂	1,4410	0,9974	76,09	75,96	42,56	41,79	8,8	8,4	19,91	19,54	24,57	24,67
R=C ₃ H ₇ , n=2	92/1	C ₁₅ H ₃₄ Cl ₂ O ₂ Si ₃	1,4429	0,9857	108,55	108,49	44,06	44,63	9,33	8,98	20,70	20,87	18,05	17,56

ИК спектры сняты Л. В. Хажакяном, за что авторы выражают ему благодарность.

Экспериментальная часть

Неполный гидролиз диэтилдихлорсилана. К раствору 707 г диэтилдихлорсилана в 700 мл эфира медленно в течение 2 часов прибавлялась смесь 60,75 г воды и 60 мл диоксана (из расчета 0,75 моля воды на 1 моль дихлорида). После отгонки эфира и диоксана остаток фракционирован на колонке. Выделены следующие фракции:

1) 69°/1—2 мм — 150 г; n_D^{20} 1,4370; % Cl: найдено 27,31. $C_8H_{20}Cl_2OSi_2$. Вычислено %: Cl 27,34 (1,3-дихлортетраэтилдисилоксан). Лит. данные: т. кип. 85—90°/10 мм; n_D^{20} 1,4363 [5].

2) 99°/1—2 мм — 99,8 г; n_D^{20} 1,4390; % Cl: найдено 19,96. $C_{12}H_{20}Cl_2O_2Si_2$. Вычислено %: Cl 19,61 (1,5-дихлоргексаэтилтрисилоксан). Лит. данные: т. кип. 90—131°/10 мм; n_D^{20} 1,4393 [5].

3) 132°/1—2 мм — 39 г; n_D^{20} 1,4416; % Cl: найдено 14,67. $C_{16}H_{40}Cl_2O_3Si_4$. Вычислено %: Cl 15,29 (1,7-дихлороктаэтилтетрасилоксан). Лит. данные: т. кип. 131—145°/10 мм; n_D^{20} 1,4398 [5].

4) 172—175°/1—2 мм — 18,4 г (1,9-дихлордекаэтилпентасилоксан).

Физические константы и данные элементного анализа приведены в таблице 2.

Неполный гидролиз этилпропилдихлорсилана. По аналогии с гидролизом диэтилдихлорсилана, из 186 г этилпропилдихлорсилана при фракционировании выделены следующие фракции:

1) 58°/1,5 мм — 36 г (1,3-дихлордиэтилдипропилдисилоксан).

2) 92°/1 мм — 15,3 г (1,5-дихлортриэтилтрипропилтрисилоксан).

Физические константы и данные элементного анализа приведены в таблице 2.

1,7-Дихлортетраэтилтетрапропилтетрасилоксан. Получен теломеризацией триэтилтрипропилциклотрисилоксана с этилпропилдихлорсиланом и описан нами раньше [4].

α,ω -Ди-(амино)диалкилсилоксаны (II). В колбу с обратным холодильником, охлаждаемым ацетоном и твердой двуокисью углерода, конденсировался аммиак. При перемешивании из капельной воронки медленно прибавлялся соответствующий α,ω -дихлордиалкилсилоксан в избыток аммиака и затем в 2-кратном количестве по отношению к хлориду абсолютный эфир. Холодильник заменялся охлаждаемым проточной водой. Перемешивание продолжалось до испарения аммиака. Образующийся при реакции хлористый аммоний отделялся фильтрацией. После отгонки эфира, продукт перегонялся в вакууме.

α , ω - γ -ի(ԱՄԻՆԱ)ՊՈԼԻՈՐԳԱՆԱՍԻԼՕՔՍԱՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

Կ. Ա. ԱՆԴՐԻԱՆՈՎ, Վ. Վ. ԱՍՏԱԽԻՆ, Մ. Ն. ՄԵԼԻՔՅԱՆ և Վ. Կ. ՊԻՃՈՎ

Ա մ փ ն փ ո լ մ

Նկարագրված է α , ω -դի(ամինա)պոլիօրգանասիլօքսանների ստացումը α , ω -դի(քլոր)պոլիօրգանասիլօքսաններից ամոնոլիզի օգնությամբ:

Այս մեթոդով ստացել և նկարագրել ենք α , ω -դի(ամինա)տետրաէթիլդիսիլօքսանը, α , ω -դի(ամինա)հեքսաէթիլտրիսիլօքսանը, α , ω -դի(ամինա)օկտաէթիլտետրասիլօքսանը, α , ω -դի(ամինա)դեկաէթիլպենտասիլօքսանը, α , ω -դի(ամինա)դիէթիլդիպրոպիլդիսիլօքսանը, α , ω -դի(ամինա)տրիէթիլտրիպրոպիլտրիսիլօքսանը և α , ω -դի(ամինա)տետրաէթիլտետրապրոպիլտետրասիլօքսանը, Որպես հյանլուծիչ ստացված և նկարագրված են α , ω -դիքլորդեկաէթիլպենտասիլօքսանը, α , ω -դիքլորդիէթիլդիպրոպիլդիսիլօքսանը և α , ω -դիքլորտրիէթիլտրիպրոպիլտրիսիլօքսանը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. а) Н. Н. Соколов, ЖОХ, 29, 258 (1959); б) С. R. Krüger, E. G. Rochow, Angew. Chem., 74, 491 (1962); в) С. R. Krueger, E. G. Rochow, Inorgan. Chem., 2, 1295 (1963); г) J. G. Murray, R. K. Grifflith, J. Org. Chem., 29, 1215 (1964).
2. К. А. Андрианов, Л. М. Волкова, В. Н. Таланов, Изв. АН СССР, ОХН, 1963, 2045.
3. W. Paninod, D. F. Wilcock, J. Am. Chem. Soc., 68, 358 (1946).
4. К. А. Андрианов, В. В. Астахин, М. О. Мелкян, Н. Г. Мушегян, В. К. Пыжов, Арм. хим. ж., 21, 317 (1968).
5. А. А. Жданов К. А. Андрианов, А. А. Богданова, Изв. АН СССР, ОХН, 1961, 1261.

УДК 541.69+542.91+547.233

ПРОИЗВОДНЫЕ АРИЛАЛКИЛАМИНОВ

III*. СИНТЕЗ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
N-(3,3-ДИАРИЛПРОПИЛ)-N-АРИЛ(ДИФЕНИЛ)АЛКИЛАМИНОВ

А. Л. МНДЖОЯН, Э. А. МАРКАРЯН, Р. С. БАЛАЯН

О. М. АВАКЯН и А. С. ЦАТИНЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 15 VII 1970

Конденсацией хлорангидрида 3-(3',4'-диметоксифенил)-3-фенилпропионовой кислоты (IIa), 4,4-дифенилбутанола-2 (IV) с фенамином, гомовератриламином и 4,4-дифенил-2-аминобутаном (V) получены соответственно амиды III и основания Шиффа VIII. Восстановлением алюмогидридом лития (АГЛ) амидов III и оснований Шиффа VIII получены вторичные амины IX. Чистота соединений проверена в тонком слое окиси алюминия. Изучены их ИК спектры и фармакологические свойства.

Табл. 2, библи. ссылки 5.

Для дальнейшего изучения влияния отдельных групп на фармакологические свойства некоторых арилалкиламинов [1,2] нами предпринят синтез соединений с общей структурой IX, где в отличие от ранее опубликованных [2], имеется дополнительная метильная группа в α -положении к азоту и метоксильные группы в бензольном кольце. Синтез осуществлен по приведенной схеме.

Конденсацией вератрола с метиловым эфиром коричной кислоты в присутствии треххлористого алюминия в среде нитробензола получен метиловый эфир 3-(3',4'-диметоксифенил)-3-фенилпропионовой кислоты (IIa) [4]. Омылением последнего получена соответствующая кислота (IIб), взаимодействием которой с хлористым тионилем синтезирован хлорангидрид IIв. Конденсацией последнего с гомовератриламином, фенилизопропиламином и дифениламинобутаном получены амиды III. Чистота амидов проверена хроматографией в тонком слое окиси алюминия. ИК спектры амидов обнаруживают полосы поглощения $-\text{C}=\overset{\text{O}}{\parallel}$ при 1645 ± 5 и $\text{HN} \lt$ амида при $3290 \pm 5 \text{ см}^{-1}$. Восстановлением АГЛ в эфирном растворе III превращены во вторичные амины IX (а, б, в). Чистота их проверена хроматографией в тонком слое окиси алюминия.

* Сообщение II см. [2].

ИК спектры обнаруживают полосы поглощения NH- при $3300 \pm 5 \text{ см}^{-1}$. Для получения соединений, имеющих метильную группу в α -положении к азоту в дифенильном фрагменте, мы исходили из 4,4-дифенилбутанона-2 (IV) [3]. При взаимодействии последнего с солянокислым гидросиламином получен оксим дифенилбутанона, восстановлением которого АГЛ синтезирован 4,4-дифенил-2-аминобутан (V). С другой стороны, IV гидрирован АГЛ в 4,4-дифенилбутанол-2 (VI). Взаимодействием VI с хлористым тиоилом в абсолютном бензоле синтезирован 4,4-дифенил-2-хлорбутан (VII). Нагреванием VII с насыщенным спиртовым раствором аммиака осуществлен встречный синтез V. Идентичность аминов, полученных двумя методами, подтверждается данными газожидкостной хроматографии, ИК спектром и другими физико-химическими данными.

Конденсацией IV с фенилизопропиламинол, дифенил-2-аминобутаном и гомовератриламином получены основания Шиффа VIII. ИК спектры имеют характерное поглощение $\text{C}=\text{N}$ при $1645 \pm 5 \text{ см}^{-1}$. Восстановлением VIII АГЛ получены соответствующие вторичные амины IX (г, д, е). Чистота продуктов проверена хроматографией в тонком слое окиси алюминия. ИК спектры обнаруживают полосы поглощения NH в области 3300 см^{-1} . Полосы поглощения $\text{C}=\text{N}$ отсутствуют.

Исследовано симпатолитическое и адренолитическое действие гидрхлоридов IX (а-е) на семявыносящем протоке крысы (табл. 1). Все препараты, за исключением IXе, проявляют значительную симпатолитическую активность, которая длится дольше всех у IXд. Соединения IX (а, г, д) к тому же оказывают четкое адренолитическое действие.

Таблица 1

Симпатолитическое и адренолитическое действие гидрохлоридов IX (а—) в концентрации $1 \cdot 10^{-5}$ г/мл в опытах на семьявыносящем протоке крысы

Гидрохлориды	Уменьшение амплитуды сокращений протока, вызванных трансмуральным электрическим раздражением, % к контролю		Уменьшение амплитуды сокращений протока, вызванных адреналином ($1 \cdot 10^{-5}$ г/мл), % к контролю	
	через 10 минут	через 60 минут	через 10 минут	через 60 минут
V	87 (82,5 ÷ 91,5)	43 (6,4 ÷ 79,6)	11 (—16,2 ÷ 38,2)	35 (—1,6 ÷ 71,6)
IXа	81 (61,5 ÷ 100,5)	50 (25 ÷ 75)	37 (—5,7 ÷ 79,7)	17 (—10,5 ÷ 44,5)
IXб	87 (80,9 ÷ 93,1)	67 (50,3 ÷ 83,7)	29 (6,5 ÷ 51,5)	37 (—5,9 ÷ 79,9)
IXв	55 (35,6 ÷ 74,4)	25 (11,1 ÷ 38,9)	76 (55,5 ÷ 96,5)	37 (1,8 ÷ 72,2)
IXг	80 (44 ÷ 116)	62 (38,5 ÷ 85,5)	32 (10 ÷ 54)	63 (16 ÷ 110)
IXд	83 (64,7 ÷ 101,3)	83 (68 ÷ 98)	58 (25,5 ÷ 90,5)	59 (11,8 ÷ 106,2)
IXе	21 (—12,3 ÷ 54,3)	36 (—1,5 ÷ 73,5)	12 (—4,2 ÷ 28,7)	21 (5 ÷ 37)

* Каждый препарат испытывался в опытах на 5 протоках. Полученные результаты подвергались статистической обработке ($P = 0,05$) [5].

Экспериментальная часть

Метиловый эфир 3-(3',4'-диметоксифенил)-3-фенилпропионовой кислоты (IIа). К 20 г (0,12 моля) метилового эфира коричной кислоты прибавляют 26 г (0,19 моля) вератрола в 100 мл нитробензола и 26 г (0,19 моля) треххлористого алюминия так, чтобы температура не поднималась выше 30°. Нагревают раствор в течение 8 часов при 90°, затем при охлаждении разлагают 50 г льда, перемешивают, прибавляют разбавленный раствор соляной кислоты (1:1) до растворения образовавшегося гидрата окиси алюминия. Водный слой экстрагируют эфиром и сушат безводным сульфатом натрия. Остаток после отгонки растворителя перегоняют в вакууме. Получают 19 г (63%) IIа; т. кип. 176—178°/0,07 мм. Найдено %: С 71,75; Н 6,51. $C_{18}H_{20}O_4$. Вычислено %: С 72,00; Н 6,66.

ИК спектр: $-\overset{\text{O}}{\parallel}C-1740$, $-\overset{\text{O}}{\parallel}C-O 1605 \text{ см}^{-1}$. Хроматографирование проводилось в тонком слое окиси алюминия второй степени активности с подвижной фазой бензол—ацетон (12:1). Эфир выявил два пятна с R_f 0,60 и 0,85. Разделить препаративные количества для их изучения не удалось.

3-(3',4'-Диметоксифенил)-3-фенилпропионовая кислота (IIб). К 11 г (0,036 моля) эфира прибавляют 4 г (0,1 моля) гидрата окиси натрия в 25 мл воды (15%-ный раствор) и нагревают до исчезновения слоев. После охлаждения выделяют эфиром непрореагировавший IIа, разбавляют водой и при охлаждении осаждают кислоту разбавленным раствором соляной кислоты (1:1). Выделившееся масло отделяют, кристаллизуют в экикаторе. Кислоту перекристаллизовывают из смеси спирт—вода (1:1). Получают 7,8 г (79%) IIб, т. пл. 72°. Найдено %: С 66,86; Н 6,53.

$C_{17}H_{16}O_2 \cdot H_2O$. Вычислено %: С 67,00; Н 6,58. Вещество кристаллизуется с одной молекулой воды. ИК спектр обнаруживает полосу поглощения ОН кислоты при 3030—3100 cm^{-1} .

Амиды III. Смесь 7,8 г (0,029 моля) кислоты IIб, 3 мл хлористого тионила и 80 мл абсолютного бензола нагревают 6 часов. Отгоняют растворитель и к полученным 0,023 молям хлорангидрида IIв в 80 мл абсолютного бензола прибавляют по каплям 0,023 моля амина и 0,025 моля пиридина. Перемешивают при комнатной температуре в течение получаса, нагревают на водяной бане в течение 4 часов. Охлаждают, фильтруют, промывают 3%-ным раствором соляной кислоты и 5%-ным раствором соды, растворитель отгоняют, а остаток перекристаллизовывают из смеси бензол—петролейный эфир (1:1).

Хроматографирование проводилось в тонком слое окиси алюминия второй степени активности с подвижной фазой бензол—ацетон (4:1). Амиды выявили одно пятно с R_f в пределах 0,4—0,5. Гомовератриламид 3-(3',4'-диметоксифенил)-3-фенилпропионовой кислоты (IIIб), выход 6,8 г (80%), т. пл. 122°. Найдено %: С 72,10; Н 7,02; N 3,00. $C_{27}H_{31}NO_5$. Вычислено %: С 72,16; Н 6,92; N 3,12. 1-Метил-3,3-дифенилпропиламид 3'-(3'',4''-диметоксифенил)-3'-фенилпропионовой кислоты (IIIв), выход 9,6 г (85%), т. пл. 95°. Найдено %: С 80,50; Н 7,00; N 2,62. $C_{33}H_{35}NO_3$. Вычислено %: С 80,32; Н 7,10; N 2,84.

N-Гомовератрил-3-(3',4'-диметоксифенил)-3-фенилпропиламин IXб) *N[3'-(3'',4''-диметоксифенил)-3'-фенилпропил]-4,4-дифенил-2-бутиламин IXв*. К раствору 0,2 молей АГЛ в 200—250 мл эфира прибавляют по каплям раствор 0,1 моля амида в абсолютном эфире. Кипятят с обратным холодильником 6—8 часов. Охлаждают, разлагают 10 мл воды, фильтруют, осадок промывают 200 мл эфира. Эфирные растворы сушат сульфатом натрия, растворитель отгоняют, остаток перегоняют в вакууме (табл. 2).

Оксим 4,4-дифенилбутанона-2. В горячий раствор 26 г (0,11 моля) дифенилбутанона-2 [3] в 240 мл этанола вносят 2,6 г солянокислого гидроксиламина в 46 мл воды, 12,4 г уксуснокислого натрия в 28 мл воды. Растворитель отгоняют, осадок высушивают и перекристаллизовывают. Получают 17,5 г (63%) оксима 4,4-дифенилбутанона-2. Т. пл. 92° (из спирта). Найдено %: N 6,00. $C_{18}H_{17}NO$. Вычислено %: N 5,85.

4,4-Дифенил-2-аминобутан (V). К раствору 1,3 г (0,04 моля) АГЛ в 150 мл эфира прибавляют суспензию 5 г (0,02 моля) оксима в абсолютном эфире, нагревают с обратным холодильником в течение 8—10 часов. Охлаждают, разлагают 15 мл воды, фильтруют. Осадок промывают 150 мл эфира. Эфирные вытяжки сушат сульфатом натрия, растворитель отгоняют, остаток перегоняют в вакууме. Получено 2,2 г (44%) V, т. кип. 140—142°/5 мм; n_D^{20} 1,5699; d_4^{20} 1,0135; M_{R_D} найдено 72,93, вычислено 72,31. Найдено %: N 6,32. $C_{18}H_{19}N$. Вычислено %: N 6,25. Т. пл. тартрата 4,4-дифенил-2-аминобутана 165° (из спирта).

Таблица 2

R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	n	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Найдено, %			Молекулярная формула	Вычислено, %			Т. пл. гид- рохлоридов
										С	Н	Н		С	Н	Н	
OCH ₃	OCH ₃	H	H	H	OCH ₃	OCH ₃	0	45	185/1	74,67	7,85	3,02	C ₂₇ H ₂₃ NO ₄	74,48	7,58	3,20	185
OCH ₃	OCH ₃	H	CH ₃	C ₆ H ₅	H	H	1	52	195/1	82,85	8,22	2,89	C ₃₂ H ₂₇ NO ₂	82,69	8,10	2,94	120
H	H	CH ₃	CH ₃	H	H	H	0	60	210/1	87,70	8,36	4,27	C ₂₃ H ₂₀ N	87,50	8,45	4,1	110
H	H	CH ₃	H	H	OCH ₃	OCH ₃	0	45	220/1	80,32	8,25	3,65	C ₂₆ H ₂₁ NO ₂	80,20	7,98	5,59	182
H	H	CH ₃	CH ₃	C ₆ H ₅	H	H	1	43	215/1	88,39	6,85	3,15	C ₃₂ H ₂₅ N	88,68	7,30	3,23	184

Газожидкостная хроматография на колонке с 15%-ным силиконовым маслом «301» на хромосорбе G при 160° выявила один пик; время удерживания 5 минут.

4,4-Дифенилбутанол (VI). К 200 мл эфирного раствора, содержащего 6 г АГЛ, прикапывают раствор 20 г (0,08 моля) V в абсолютном эфире, нагревают 10 часов. Охлаждают, разлагают 15 мл воды, осадок на фильтре промывают 200 мл эфира, сушат сульфатом натрия, отгоняют растворитель, остаток перегоняют в вакууме. Получено 15 г (70%) VI, т. кип. 170—174°/6 мм. Найдено %: C 85,30; H 7,97; OH 7,9. $C_{18}H_{18}O$. Вычислено %: C 84,92; H 7,93; OH 7,5. Хроматографирование проводилось в тонком слое окиси алюминия второй степени активности, подвижная фаза—абсолютный ацетон. Спирт выявил одно пятно с R_f 0,78.

4,4-Дифенил-2-хлорбутан (VII). Раствор 5 г 4,4-дифенилбутанола и 2 мл хлористого тионила в абсолютном бензоле нагревают 6 часов. Отгоняют растворитель, остаток перегоняют в вакууме. Получено 3,2 г (60,4%) VII, т. кип. 135—140°/5 мм. Найдено %: C 68,34; H 6,67; Cl 14,66. $C_{14}H_{17}Cl$. Вычислено %: C 68,41; H 6,92; Cl 14,45.

Хроматографирование проводилось в тонком слое окиси алюминия II степени активности, подвижная фаза—абсолютный ацетон. Хлорид выявил одно пятно с R_f 0,87.

4,4-Дифенил-2-аминобутан (V). К 40 мл спиртового раствора аммиака прибавляют 3,2 г (0,013 моля) VII, в запаянной трубке нагревают на водяной бане 12 часов. Отгоняют спирт, остаток обрабатывают 5 н раствором гидрата окиси натрия до щелочной реакции и извлекают бензолом. Сушат безводным сульфатом натрия. После отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме. Получено 1,7 г (30%) V, т. кип. 142—143°/5 мм; n_D^{20} 1,5700; d_4^{20} 1,0133. M_{RD} найдено 72,94, вычислено 72,31. Найдено %: N 6,32. $C_{16}H_{19}N$. Вычислено %: N 6,25. Т. пл. тартрата 165—167° (из спирта).

Газожидкостная хроматография на колонке с 15%-ным силиконовым маслом «301» на хромосорбе G при 160° выявила один пик, время удерживания 5 минут.

N-(3'-Фенилпропил)4,4-дифенил-2-буталамин (IXe), N-(β-3',4'-диметоксифенилэтил)-4,4-дифенил-2-бутиламин (IXδ), бис-(4,4-дифенил)-2-бутиламин (IXε). Бензольный раствор 0,04 моля IV и 0,04 моля соответствующего амина кипятят 8 часов с водоотделителем. Отгоняют растворитель, остаток растворяют в абсолютном эфире и восстанавливают 0,15 моля АГЛ. Вещество перегоняют в вакууме. Гидрохлориды получают смешением эфирных растворов амина и хлористого водорода, перекристаллизовывают из спирта. Хроматографирование оснований проводилось в тонком слое окиси алюминия второй степени активности, подвижная фаза—хлороформ—ацетон (50:3). Амины выявили одно пятно с R_f 0,4—0,5.

ԱՐԻԼԱԿԻԼԱՄԻՆՆԵՐԻ ԱԾԱՆՅՅԱԼՆԵՐ

III. N-(3,3-ԴԻԱՐԻԼՊՐՈՊԻԼ)-N-ԱՐԻԼ (ԴԻՅՆԵԻԼ)-ԱԿԻԼԱՄԻՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ
ԵՎ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա. Լ. ՄՆՉՈՅԱՆ, Է. Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ԲԱԼԱՅԱՆ, Վ. Մ. ԱՎԱԳՅԱՆ և
Ա. Ս. ԾԱՏԻՆՅԱՆ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Ցենամինի, հոմովերատրիլամինի և 4,4-դիֆենիլ-2-ամինոբուտանի հետ 3-(3',4'-դիմեթօքսիֆենիլ)-3-ֆենիլպրոպիոնաթթվի քլորանհիդրիդի, 4,4-դիֆենիլբուտանոնի կոնդենսմամբ ստացվել են համապատասխան ամիդներ և Շիֆֆի հիմքեր: Վերջիններս լիթիումի ալյումահիդրիդով վերականգնվել են համապատասխան ամիններ: Միացությունների մաքրությունը ճշտված է բրոմատոգրաֆիայով, հետազոտված են նրանց իվ սպեկտրները և ֆարմակոլոգիական հատկությունները:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. Л. Мнджоян, Э. А. Маркарян. Авт. свид. 203694, 10 августа 1966 г., бюлл. № 21.
 2. А. Л. Мнджоян, Э. А. Маркарян, А. В. Казарян, Арм. хим. ж., 22, 325 (1969); А. Л. Мнджоян, Э. А. Маркарян, Р. А. Алексанян, Г. А. Хоренян, Р. С. Балаян, Ж. С. Арустамян, Арм. хим. ж., 24, 703 (1971).
 3. C. F. Woodward, T. Gerald, C. Fuson, J. Am. Chem. Soc., 56, 2103 (1934).
 4. F. H. Marquart, Helv. Chim. Acta, 48, 1486 (1965).
- Б. М. Л. Бельский, Элементы количественной оценки фармакологического эффекта, Изд. АН Латв. ССР, Рига, 1959, стр. 19.

СИНТЕЗ И ПРЕВРАЩЕНИЯ β,γ -НЕПРЕДЕЛЬНЫХ АМИНОВ

X КОНДЕНСАЦИЯ β,γ -НЕПРЕДЕЛЬНЫХ АМИНОВ С АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ В ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ

Г. Т. МАРТИРОСЯН, А. Ц. КАЗАРЯН, Г. Г. АСАТРЯН и А. Т. БАБАЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 17 VII 1970.

Показано, что амины, содержащие бутен-2-ильную, пентен-2-ильную и 3-метилбутен-2-ильную группы, в присутствии хлористого алюминия легко конденсируются с ароматическими углеводородами (бензол, толуол, *n*-ксилол и хлорбензол), приводя к аминам, содержащим γ -арилалкильные группы.

Табл. 1, библиограф. ссылок 6.

Реакция алкилирования ароматических углеводородов аминноолефинами изучена недостаточно. Вестон с сотрудниками [1] показали, что аллиламин и его *N*-алкилпроизводные в присутствии хлористого алюминия легко конденсируются с бензолом, толуолом и фторбензолом с образованием β -арилалкиламинов.

Имея доступные β,γ -непредельные амины [2—5], мы изучили их конденсацию с бензолом, толуолом, *n*-ксилолом и хлорбензолом. В качестве непредельных аминов были использованы амины, полученные из бутадиена-1,3, изопрена и пиперилена; 1-диметил- и 1-диэтиламино-3-метилбутены-2, *N*-(3-метилбутен-2-ил)пиперидин, 1-диэтиламинобутен-2 и 1-диметиламинопентен-2.

Оказалось, что во всех изученных случаях конденсация ароматических соединений с указанными аминами протекает гладко в присутствии хлористого алюминия при соотношении амина, ароматического углеводорода и хлористого алюминия 1:5—10:1,2 и при нагревании реакционной смеси на кипящей водяной бане в течение 6 часов.

При проведении реакции в присутствии концентрированной серной кислоты выходы продуктов низкие (27%). Приблизительно такой же выход продуктов реакции получается и при проведении конденсации гидроклоридов аминов с ароматическими углеводородами в присутствии каталитических количеств хлористого алюминия. Исходя из общепринятого механизма алкилирования ароматических соединений олефинами и строения взятых нами аминов, можно было ожидать образования γ -арилалкиламинов:

Строение полученных аминов как γ -арилалкиламинов, нами доказано на примере продуктов конденсации 1-диметиламино-3-метилбутена-2 и 1-диэтиламинобутена-2 с бензолом, переводом их в четвертичные аммониевые соли и последующим щелочным расщеплением [6]. В обоих случаях в результате были получены исходные амины:

Нетрудно заметить, что в случае обратного порядка присоединения бензола фенильный заместитель должен был находиться в β -положении к азоту и щелочное расщепление солей должно было бы привести к продуктам отщепления— α -этил- и α -изопропилстирола, соответственно.

Метод получения аминов, содержащих ароматическое ядро в γ -положении к азоту, может найти препаративное применение, так как синтез таких аминов, в отличие от β -арилалкиламинов, весьма затруднен.

Экспериментальная часть

К смеси 2,0—2,5 моля ароматического соединения и 0,6 моля хлористого алюминия при перемешивании и охлаждении медленно прикапывается раствор 0,5 моля амина в 2,0—2,5 моля ароматического соединения. Затем смесь нагревается на кипящей водяной бане в течение 6 часов. На следующий день обрабатывается водой. Из водного слоя подщелачиванием выделяются продукты реакции. Данные приведены в таблице.

Щелочное расщепление йодистого триметил(3-метил-3-фенилбутил)-аммония. 21,2 г (0,064 моля) испытуемой соли и 35мл диэтиленгликоля помещается в колбу с нисходящим холодильником, соединенным последовательно с приемником и склянками Тищенко, содержащими титрованный раствор кислоты. В течение 10 минут добавляется 0,2 моля 25%-ного водного раствора едкого натра. Расщепление соли осуществляется при 200° в течение 2—3 часов. Обратным титрованием найдено 0,0512 моля (80%) амина. Подщелочением выделено (77,7%) 1-диметиламино-3-метил-3-фенилбутана с т. кип. 74—76°/1 мм; n_D^{20} 1,4999. Пикрат плавится при 140—141°.

Щелочное расщепление йодистого триэтил(3-фенилбутил)аммония. Из 7,1 г (0,02 моля) соли аналогично получено 2,8 г (70%) 1-диэтиламино-3-фенилбутана с т. кип. 104° (4 мм), n_D^{20} 1,4920.

Продукты реакции	Выход, %	Т. кип., °С/мм	D ₂₀ ²⁰	d ₄ ²⁰	M _D		Анализ				Т. пл., °С	Молекулярная формула	Анализ, %			
					найдено	вычислено	С		Н				N		найдено	вычислено
							найдено	вычислено	найдено	вычислено			найдено	вычислено		
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₅ **	79,1	98—100/4	1,49940,8964	62,55	62,57	81,45	81,71	10,96	10,99	8,00	7,33	140—141	C ₁₆ H ₂₄ N ₂ O ₂	14,85	15,09	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₅	41,7 (70)	100—102/2	1,49900,8946	71,98	71,80	81,98	82,19	11,00	11,41	7,13	6,39	—	—	—	—	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₅	31,6 (69,5)	126—127/2	1,51490,9407	74,03	74,12	83,80	83,11	11,46	10,82	6,35	6,06	130	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂	12,49	12,20	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₄ CH ₃	29,0 (53,8)	97/3	1,49900,8946	67,28	67,18	81,74	81,95	11,34	11,21	7,00	6,82	125	C ₂₀ H ₂₈ N ₂ O ₂	13,65	12,90	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₄ CH ₃	24,4 (51,2)	96—97/1	1,49500,8876	76,74	76,61	82,12	82,40	12,15	11,63	6,45	6,00	75	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂	12,50	12,12	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₄ CH ₃	39,8 (41,45)	116—117/1	1,51500,8390	78,76	78,83	82,78	83,26	11,09	10,02	5,72	5,72	130	C ₂₂ H ₃₀ N ₂ O ₂	12,65	12,03	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₄ Cl	22,1 (47,6)	131/6	1,51000,9966	67,48	67,44	69,58	69,20	9,12	8,87	6,34	6,20	126	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂ Cl	12,20	12,20	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₄ Cl	31,1 (42,3)	164—165/6	1,50470,9759	76,59	76,67	70,89	71,04	9,61	9,40	6,04	5,56	100	C ₂₁ H ₂₇ N ₂ O ₂ Cl	14,10	14,11	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ C(C ₂ H ₅) ₂ C ₆ H ₃ (C ₂ H ₅) ₂	11,0 (44)	166—167/6	1,50810,9253	83,44	83,46	82,28	83,4	11,86	11,2	6,05	5,5	—	—	—	—	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ CH(C ₂ H ₅)C ₆ H ₅ ***	61,7 (67,8)	87—88/1	1,49200,8674	67,02	67,09	81,77	81,95	12,88	11,21	6,85	6,83	—	—	—	—	
(C ₂ H ₅) ₂ NCH ₂ CH ₂ CH(C ₂ H ₅)C ₆ H ₄ (C ₂ H ₅) ₂	27,8 (78,3)	113—115/2	1,49720,9084	75,08	75,42	82,76	82,40	11,82	11,58	6,48	6,00	—	—	—	—	
C ₂ H ₅ NCH ₂ CH ₂ CH(C ₂ H ₅)C ₆ H ₅	30,85	110—111/2	1,49280,8862	62,47	62,41	81,71	81,67	10,92	10,99	7,67	7,34	121	C ₁₆ H ₂₂ N ₂ O ₂	14,10	15,09	

* В скобках приведен выход в расчете на вошедший в реакцию амин.

** Молекулярная масса при 123—124°. Найдено %: C 73,60, C₁₄H₂₄N₂O₂. Вычислено %: C 73,13*** Молекулярная масса при 101°. Найдено %: C 73,58, C₁₆H₂₆N₂O₂. Вычислено %: C 73,18

β,γ-ՉՀԱԳԵՑԱԾ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ ԵՎ ՓՈՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Մ. Բ. Գ-ՉՀԱԳԵՑԱԾ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՆԳԵՆՍՈՒՄԵ ԱՐՈՄԱՏԻԿ ԱԾԽԱԶԻՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ԱՅՈՒՄԻՆԻՈՒՄԻ ՔՂՈՐԻԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ

Գ. Թ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Հ. Յ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Գ. Դ. ԱՄԱՏՐՅԱՆ Լ Ա. Թ. ԲԱՐԱՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ցույց է տրված, որ բուտեն-2-իլ, պենտեն-2-իլ և 3-միթիլբուտեն-2-իլ խմբեր պարունակող ամիններն ալլումինիումի քլորիդի ներկայությամբ հեշտությամբ կոնդենսվում են արոմատիկ ածխաջրածինների հետ (բենզոլ, տոլուոլ, քսիլոլ, քլորբենզոլ), առաջացնելով համապատասխան γ-արիլալկիլ-ամիններ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. A. W. Weston, A. W. Ruddy, C. M. Suter, J. Am. Chem. Soc., 65, 674 (1943).
2. Գ. Դ. Մարտրոսյան, Յ. Ա. Գրիգորյան, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 16, 31 (1963).
3. Գ. Դ. Մարտրոսյան, Յ. Ա. Գրիգորյան, А. Դ. Բабаян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 17, 517 (1964).
4. Գ. Դ. Մարտրոսյան, Յ. Ա. Գրիգորյան, А. Դ. Բабаян, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 18, 161 (1965).
5. Գ. Դ. Մարտրոսյան, Յ. Ա. Գրիգորյան, А. Դ. Բабаян, Арм. хим. ж., 20, 420 (1967).
6. J. V. Braun, Lieb. Ann., 382, 47 (1911).

ПРОИЗВОДНЫЕ СТИРОЛА

XXIII. СИНТЕЗ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 3-БРОМ-4-АЛКОКСИСТИРОЛОВ

Г. М. ПОГОСЯН, Л. М. АКОПЯН, В. С. АСЛАМАЗЯН и С. Г. МАЦОЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 24 IX 1970

Синтезирован и охарактеризован ряд 4-алкокси-3-бромстиролов и изучена их радикальная полимеризация в присутствии динитрила азисомаляной кислоты в массе при 100°. Определены характеристические вязкости и температура стеклования полученных полимеров.

Рис. 2, табл. библиографических ссылок 7.

Ранее нами были описаны синтез [1] и полимеризация [2] 2-алкокси-5-бромстиролов. Показано, что с усложнением цепи алкоксигруппы происходит уменьшение скорости полимеризации мономеров и понижение температуры стеклования образующихся полимеров. В продолжение этих работ представляли интерес синтез и полимеризация изомерных им алкоксибромстиролов.

В настоящей работе приведены результаты синтеза и радикальной полимеризации 3-бром-4-алкоксистиролов. Синтез указанных мономеров осуществляли, исходя из 2-бромфенола, по схеме

Ацелированием 2-бромфенола [3] хлористым ацетилем получили соответствующий ацетат, который подвергли перегруппировке по Фриссу [4] при 100° с помощью безводного хлористого алюминия; выход 3-бром-4-оксиацетофенона 85%. Алкилированием с помощью алкилгалогенидов 3-бром-4-оксиацетофенон превращен в соответствующие 3-бром-4-алкоксиацетофеноны (табл. 1), восстановлением которых по методу Меервейна-Пондорфа получены 3-бром-4-алкоксифенилметилкарбинолы. Последние нам не удалось выделить и охарактеризовать, так как при перегонке в вакууме они с большой легкостью подвергаются дегидратации и по-

лимеризации. Синтез 3-бром-4-алкоксистировлов осуществлен нагреванием в вакууме неочищенных карбинолов со свежеплавленным бисульфатом калия в присутствии ингибиторов—*n*-трет-бутил-широкатехина и порошкообразной меди—с одновременной отгонкой образующихся мономеров (табл. 2).

Полимеризацию мономеров проводили в массе при 100° в присутствии динитрила азоизомаляной кислоты (ДАК). В таблице 3 приведены результаты блочной полимеризации 3-бром-4-алкоксистировлов и некоторые свойства полученных полимеров. Все полимеры представляют собой белые порошки, растворимые в ароматических и хлорсодержащих углеводородах и не растворимые в низших спиртах и петролейном эфире.

Рис. 1. Зависимость глубины превращения от продолжительности блочной полимеризации 3-бром-4-алкоксистировлов в присутствии 0,5 мол. % ДАК при 100°: 1—3-бром-4-метоксистирил; 2—3-бром-4-этоксистирил; 3—3-бром-4-пропоксистирил; 4—3-бром-4-бутоксистирил; 5—3-бром-4-амилоксистирил.

Для оценки способности 3-бром-4-алкоксистировлов к полимеризации исследована зависимость выхода полимера от продолжительности процесса при 100° в присутствии 0,5 мол. % ДАК. На рисунке 1 представлены кинетические кривые мономеров, содержащих при алкоксильной группе нормальный углеводородный остаток. Как видно из этого рисунка, глубина превращения всех мономеров вначале возрастает и примерно через 0,5 часа становится практически постоянной. Максимальная глубина полимеризации в массе 3-бром-4-алкоксистировлов, в зависимости от величины алкоксигруппы, составляет 35—52%; при этом продукты их полимеризации затвердевают в блок. Очевидно, при принятых условиях в первые полчаса концентрация свободных радикалов в

системе падает до нуля и рост цепи в твердой фазе прекращается. При сопоставлении кинетических кривых видно, что по скорости полимеризации синтезированные мономеры заметно отличаются между собой и, в зависимости от величины алкоксильной группы, образуют следующий ряд:

Для сопоставления термомеханических свойств были приготовлены очищенные образцы полимеров, полученных в одинаковых условиях. Как видно из рисунка 2 и таблицы 3, с увеличением углеводородного остатка алкоксигруппы температуры стеклования полимеров, как и в случае 2-алкокси-5-бромстиролов, понижаются.

Экспериментальная часть

3-Бром-4-оксиацетофенон. Смесь 151 г безводного хлористого алюминия и 165 г 2-бромфенилового эфира уксусной кислоты нагревали при 100° в течение 6 часов. Теплую реакционную массу обработали смесью соляной кислоты и льда, экстрагировали эфиром, эфирные вытяжки промыли водой и высушили сульфатом магния. После удаления эфира остаток перекристаллизовали из бензола. Получено 140 г (85%) 3-бром-4-оксиацетофенона с т. пл. 112° [5].

3-Бром-4-алкоксиацетофеноны. Смесь 87,45 г (0,36 моля) 3-бром-4-оксиацетофенона, 21,3 г (0,38 моля) едкого кали и 50 мл спирта при перемешивании нагревали на водяной бане до образования гомогенной массы. Затем по каплям прибавляли 0,38 моля алкилгалогенида и реакционную смесь кипятили 6 час. Большую часть спирта отгоняли, остаток обрабатывали водой и тщательно экстрагировали эфиром. Эфирный раствор после промывания 10%-ным водным раствором едкого натра высушивали сульфатом магния. Продукты реакции после полной отгонки эфира перекристаллизовывали из метанола. Выходы, некоторые физико-химические константы и данные анализов полученных 3-бром-4-алкоксиацетофенонов приведены в таблице 1.

3-Бром-4-алкоксистирола. Смесь 0,1 моля 3-бром-4-алкоксиацетофенона и 98 мл мольного раствора изопропилата алюминия в изопропиловом спирте нагревали на водяной бане так, чтобы образовавшийся ацетон и изопропиловый спирт медленно отгонялись из реакционной среды. Время от времени проверяли присутствие ацетона в отгоне раствором 2,4-динитрофенилгидразина. По окончании реакции изопропиловый спирт отгоняли в небольшом вакууме, остаток охлаждали, обрабатывали разбавленной соляной кислотой (5%), экстрагировали эфиром, эфирные вытяжки промывали водой и сушили сульфатом магния. После отгонки эфира остаток без очистки подвергали дегидратации.

В прибор для перегонки в вакууме, содержащий 15—20% веса карбинола плавленного кислого сернокислого калия, 0,05 г *n*-трет-бутилпирокатехина и 0,1 г медного порошка при 230—240° и в вакууме 25—30 мм

Таблица 1

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	Анализ, %					
				найдено			вычислено		
				С	Н	Br	С	Н	Br
CH ₃	94,1	83—84	C ₉ H ₉ O ₂ Br	46,64	4,46	34,5	47,05	4,23	34,84
C ₂ H ₅	70,5	70—71	C ₁₀ H ₁₁ O ₂ Br	49,27	4,56	32,35	49,40	4,56	32,87
C ₃ H ₇	72,4	43	C ₁₁ H ₁₃ O ₂ Br	52,9	5,12	30,6	51,38	5,10	31,02
C ₄ H ₉	68,5	39—40	C ₁₂ H ₁₅ O ₂ Br	53,17	5,44	29,6	53,15	5,58	29,47
C ₅ H ₁₁	91,2	36—37	C ₁₃ H ₁₇ O ₂ Br	54,52	6,00	28,0	54,73	6,01	28,05

в токе сухого азота приливали по каплям 0,07 моля сырого 3-бром-4-фенилметилкарбинола. Отгон экстрагировали эфиром, промывали 5%-ным раствором едкого натра, затем водой и сушили сульфатом магния. После удаления эфира остаток перегоняли в вакууме в присутствии ингибитора 4-трет-бутилширокатехина. Выходы, физико-химические константы и данные анализов синтезированных 3-бром-4-алкоксистириолов приведены в таблице 2.

Рис. 2. Термомеханические свойства полимеров 3-бром-4-алкоксистириолов: 1 — 3-бром-4-метоксистириол; 2 — 3-бром-4-этоксистириол; 3 — 3-бром-4-пропоксистириол; 4 — 3-бром-4-бутоксистириол; 5 — 3-бром-4-амиллоксистириол.

Полимеризация. Полимеризацию мономеров проводили в массе ампульным методом, как описано раньше [6]. Образовавшиеся полимеры

Таблица 2

R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	n_D^{20}	d_4^{20}	Молекулярная формула	MR _D		А н а л и з, %					
						найде- но	вычис- лено	найде- но			вычис- лено		
								С	Н	Br	С	Н	Br
CH ₃	30,4	117—119,3/5	1,5795	1,4120	C ₉ H ₉ OBr	49,19	49,10	50,66	4,17	37,85	50,72	4,27	37,53
C ₂ H ₅	51,0	116—118/3	1,5853	1,3574	C ₁₀ H ₁₁ OBr	56,09	53,73	52,69	4,73	35,00	52,88	4,88	35,18
C ₃ H ₇	50,3	135—136/3	1,5680	1,3137	C ₁₁ H ₁₃ OBr	60,04	58,34	54,76	5,58	33,01	54,78	5,43	33,14
C ₄ H ₉	59,1	147—148/2	1,5533	1,2650	C ₁₂ H ₁₅ OBr	64,30	62,96	56,03	5,97	31,19	56,48	5,92	31,31
C ₅ H ₁₁	54,6	162—163/2,5	1,5493	1,2435	C ₁₃ H ₁₇ OBr	68,90	67,58	58,28	6,49	29,98	58,00	6,36	29,68

очисляли двукратным осаждением из бензольных растворов метиловым спиртом. Осевшие полимеры отфильтровывали и после повторного осаждения сушили при 54° в вакууме (10—20 мм) до постоянного веса.

Температуру стеклования (T_c) полимеров определяли на приборе, сконструированном Цетлиным и сотрудниками [7], экстраполированием прямолинейного участка термомеханической кривой на ось абсцисс (табл. 3 и рис. 2). При определении T_c прилагаемая нагрузка была равна 0,34 кг/см². Измерение характеристической вязкости проводили в вискозиметре Оствальда при 20° для растворов полимеров в толуоле.

Таблица 3

Полимеризация 3-бром-4-алкоксистирола в присутствии 0,5 мол. % ДАК при 100° в течение 2 часов

Мономер	Выход полимера, %	Характеристическая вязкость полимера [η], дл/г	Температура стеклования полимера, °С
3-Бром-4-метоксистирол	36,7	0,06	121
3-Бром-4-этоксистирол	38,5	0,53	113
3-Бром-4-пропоксистирол	41,3	0,17	94
3-Бром-4-бутоксистирол	46,3	0,07	82
3-Бром-4-амилоксистирол	51,7	0,03	61

ՍՏԻՐՈԼԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ

XXIII. 3-ԲՐՈՄ-4-ԱԿՕՔՍԻՍՏԻՐՈԼՆԵՐԻ ՍԵՔԵՆԸ ԵՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՈՒՄ

Գ. Մ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Լ. Մ. ՉԱԿՈՔՅԱՆ, Վ. Ա. ԱՍԼԱՄԱԶՅԱՆ և Ս. Գ. ՄԱՑՈՅԱՆ

Ա մ փ ն փ ու մ

Նպատակ ունենալով ուսումնասիրել պոլիմերացման որոշ օրինաչափություններ, սինթեզված և բնութագրված են 4-մեթօքսի-, 4-էթօքսի-, 4-պրոպօքսի-, 4-բուտօքսի- և 4-ամիլօքսի-3-բրոմատիրոլները՝ Նշված մոնոմերների սինթեզը իրականացվել է ելնելով 2-բրոմֆենոլից՝ 2-բրոմֆենոլ → 2-բրոմֆենիլացետատ → 3-բրոմ-4-օքսիացետոֆենոն → 3-բրոմ-4-ալկօքսիացետոֆենոն → 3-բրոմ-4-ալկօքսիֆենիլմեթիլկարբինոլ → 3-բրոմ-4-ալկօքսիատիրոլ: Ուսումնասիրված է սինթեզված մոնոմերների ռազդիկալային պոլիմերացումը ազդիզոկարագաթթվի դինիտրիլի ներկալությամբ, զանգվածում, 100°-ում և ցուլց է տրված, որ ըստ պոլիմերացման արագության, նախած ալկօքսի խմբի մեծությանը, նրանք կազմում են հետևյալ շարքը.

Որոշված են ստացված պոլիմերների բնութագրական մածուցիկությունները և ապակեցման ջերմաստիճանները:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. М. Погосян, Л. М. Акопян, С. Г. Мацоян, ЖОрХ, 3, 1605 (1967).
2. Г. М. Погосян, Л. М. Акопян, Э. В. Ванян, С. Г. Мацоян, Высокомол. соедин., 12Б, 142 (1970).
3. W. J. Wohlleben, Ber., 42, 4374 (1909).
4. S. H. Dandegaonker, G. R. Revankar, Monatsh., 96 (2), 450 (1965).
5. R. P. Edkins, W. H. Linnel, Quart. J. Pharm. Pharmacol., 9, 75 (1936).
6. Г. М. Погосян, Г. А. Жамкобян, Р. А. Степанян, С. Г. Мацоян, Арм. хим. ж., 22, 915 (1969).
7. Б. Л. Цетлин, В. И. Гаврилов, Н. А. Великовская, В. В. Кочкин, Зав. лаб., 22, 352 (1956).

УДК 541.69+542.91

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ
n-АЛКОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ

XXVIII. НЕКОТОРЫЕ АМИНОЭФИРЫ 2,4- И
 2,6-ДИАЛКОКСИБЕНЗОЙНЫХ КИСЛОТ

А. Л. МНДЖОЯН, В. Г. АФРИКЯН, Г. А. ХОРЕНЯН,
 Р. А. АЛЕКСАНИЯН и Э. С. МАРАШЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 15 VII 1970

С целью изучения действия на сердечно-сосудистую систему синтезированы некоторые аминоэфиры 2,4- и 2,6-диалкоксибензойных кислот взаимодействием их хлорангидридов с различными ω -аминоалканолами. Фармакологические исследования показали, что эти соединения не проявляют выраженных сердечно-сосудистых свойств.

Табл. 4, библиограф. ссылок 5.

В ряду ранее полученных аминоэфиров 3,4-диалкоксибензойных кислот (I) были выявлены соединения, обладающие сердечно-сосудистым действием. Некоторые из них в настоящее время детально изучаются как вещества, снимающие коронарный спазм и аритмию сердца.

С целью исследования влияния положения алкоксигрупп в бензольном кольце на указанные свойства получены небольшие гомологические ряды аминоэфиров 2,4- и 2,6-диалкоксибензойных кислот (I, II).

$R = \text{CH}_3, \text{C}_2\text{H}_5$

$R = \text{CH}_3, \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_3\text{H}_7$

Исходным продуктом для синтеза 2,4-диалкоксибензойных кислот служил резорцинол [3], алкилированием которого алкилиодидами получены диалкоксиацетофеноны, а окислением последних бромом в воднощелочной среде [4] соответствующие 2,4-диалкоксибензойные кислоты.

2,4- и 2,6-Диалкоксибензойные кислоты переведены в хлорангидриды, образующие с соответствующими аминок спиртами аминоэфиры, чистота и идентичность которых проверены бумажной хроматографией в системе бутанол—уксусная кислота—вода (1:2:3); проявление—парами йода (табл. 1, 2, 3, 4).

ИК спектр, снятый на спектрофотометре UR-10 в среде хлороформа, показал полосы поглощения в области 1715—1720 (СО), 1590—1610, (аромат. кольцо), 1250—1260 см^{-1} (эфирная связь).

Для исследования влияния на сердечно-сосудистую систему получены растворимые в воде соли—гидрохлориды, йодалкилаты, большинство из них—кристаллические вещества.

Фармакологическое исследование растворимых солей проводилось на наркотизированных уретаном и хлоролазой кошках. Вещества вводились внутривенно в дозах 0,5—1—3 мг/кг веса животного.

Было установлено, что большинство соединений не обладает коронарорасширяющим действием. Отдельные представители несколько (на 10—15%) увеличивают коронарный кровоток в течение 10—25 минут. Гидрохлориды обладают кратковременным гипотензивным действием—понижают артериальное давление на 15—20 см ртутного столба в течение 3—5 минут.

Таким образом, в ряду аминоэфиров диалкоксибензойных кислот коронарорасширяющие свойства и способность снимать аритмию сердца зависят от положения алкоксильных групп. Даже в случае одинакового строения алкоксильных групп и аминокислотного остатка аминоэфиры 3,4-диалкоксибензойных кислот, в отличие от соответствующих 2,4- и 2,6-производных, проявляют выраженное действие на сердечно-сосудистую систему.

Экспериментальная часть

2,6-Диоксибензойная кислота, ее метиловый эфир, а также 2,6-диалкоксибензойные кислоты и их хлорангидриды получены описанным в литературе методом [2].

2,4-Диметокси-, диэтоксацетофеноны. Получены алкилированием 2,4-диоксиацетофенона [3] по аналогии с метиловым эфиром 2,6-диоксибензойной кислоты. Выход диметоксацетофенона 60—62%, т. кип. 147—149°/3 мм , т. пл. 40—41°; выход диэтоксацетофенона 50—53%, т. кип. 153—155°/3 мм , т. пл. 71—72°.

2,4-Диалкоксибензойные кислоты. Получены окислением 2,4-диалкоксиацетофенонов гипобромидом натрия по аналогии с методом окисления метилкетонов [4]. К раствору 1 моля едкого натра в 200 мл воды при интенсивном перемешивании и охлаждении ледяной водой при температуре 0—8° приливают по каплям 0,3 моля брома. По окончании раствор охлаждают до 0° и приливают раствор 0,1 моля соответствующего кетона в 100 мл диоксиана, поддерживая температуру смеси не выше 8°, смесь перемешивают 10 минут при комнатной температуре, переносят ее в делительную воронку и отделяют нижний слой. Оставшийся щелочной раствор взбалтывают с 10 г пиросульфита натрия в 150 мл воды, подкисляют концентрированной соляной кислотой и отфильтровывают осадок. Выход 2,4-диметоксибензойной кислоты 80—83%, т. пл. 107—108°, выход 2,4-диэтоксibenзойной кислоты 82—84%, т. пл. 98—100°.

Хлорангидриды 2,4-диалкоксибензойных кислот. Получены обычным способом. Выходы 93—95%. Хлорангидрид 2,4-диметоксибензойной кислоты описан в литературе [5].

R	R'	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}	найдено
CH ₃	N(CH ₃) ₂	79,2	165—167/2	C ₁₃ H ₁₉ NO ₄	1,1084	1,5182	69,1
CH ₃	N(C ₂ H ₅) ₂	78,4	181—183/2	C ₁₅ H ₂₃ NO ₄	1,0759	1,5111	78,1
CH ₃	C ₄ H ₉ N	78,6	195—197/2	C ₁₅ H ₂₁ NO ₄	1,1300	1,5288	76,1
CH ₃	C ₅ H ₁₀ N*	80,5	198—201/2	C ₁₆ H ₂₃ NO ₄	—	—	—
CH ₃	C ₄ H ₉ NO	79,7	219—221/2	C ₁₅ H ₂₁ NO ₅	1,1691	1,5013	74,1
C ₂ H ₅	N(CH ₃) ₂	78,1	172—174/2	C ₁₅ H ₂₃ NO ₄	1,0557	1,5028	78,1
C ₂ H ₅	N(C ₂ H ₅) ₂	80,3	185—187/2	C ₁₇ H ₂₇ NO ₄	1,0391	1,4980	87,1
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉ N	78,2	199—201/2	C ₁₇ H ₂₅ NO ₄	1,0732	1,5138	86,1
C ₂ H ₅	C ₅ H ₁₀ N	81,3	203—205/2	C ₁₈ H ₂₇ NO ₄	1,0658	1,5140	90,1
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉ NO**	80,4	198—200/2	C ₁₇ H ₂₅ NO ₅	—	—	—
C ₃ H ₇	N(CH ₃) ₂	77,9	175—177/2	C ₁₇ H ₂₇ NO ₄	1,0217	1,4980	88,1
C ₃ H ₇	N(C ₂ H ₅) ₂	77,4	190—192/2	C ₁₉ H ₃₁ NO ₄	1,0100	1,4948	97,1
C ₃ H ₇	C ₄ H ₉ N	76,5	197—199/2	C ₁₉ H ₂₉ NO ₄	1,0517	1,5092	95,1
C ₃ H ₇	C ₅ H ₁₀ N	79,6	216—218/2	C ₂₀ H ₃₁ NO ₄	1,0450	1,5097	99,1
C ₃ H ₇	C ₄ H ₉ NO	78,3	223—225/2	C ₁₉ H ₂₉ NO ₅	1,0861	1,5078	96,1

* Кристаллическое вещество с т. пл. 50—51°.

** Кристаллическое вещество с т. пл. 63—64°.

MR _D	А н а л и з, %						Т. пл. солей, °С			R ₁	
	С		Н		N		гидро-хлорид	подме-тилат	под-этилат		
	найде-но	вычис-лено	найде-но	вычис-лено	найде-но	вычис-лено					
27	67,51	61,60	61,64	7,81	7,56	5,35	5,53	145—146	194—195	97—99	0,82
36	76,78	64,04	64,03	8,00	8,23	5,17	4,98	186—187	142—143	163—165	0,81
20	74,55	64,63	64,50	7,35	7,57	5,20	5,01	143—144	133—135	167—168	0,74
-	—	65,60	65,50	8,00	7,90	4,92	4,78	168—169	138—139	153—155	0,76
47	76,19	61,17	61,01	7,32	7,16	5,02	4,74	195—196	161—162	183—184	0,75
76	76,75	64,24	64,03	8,40	8,23	4,76	4,98	146—147	140—141	131—132	0,83
28	85,99	66,21	66,00	8,63	8,80	4,72	4,53	116—117	126—127	151—152	0,84
20	83,79	66,67	66,42	8,31	8,20	4,73	4,56	137—138	149—150	115—116	0,77
79	88,40	67,31	67,27	8,33	8,46	4,52	4,35	153—154	135—136	147—149	0,73
-	—	62,85	63,13	7,92	7,79	4,52	4,33	155—157	149—151	—	0,78
75	85,99	65,83	66,00	8,70	8,80	4,78	4,53	129—130	134—135	—	0,76
40	95,22	67,45	67,62	9,38	9,26	4,34	4,15	108—109	70—72	106—107	0,80
26	93,02	68,17	68,02	8,94	8,71	4,40	3,16	78—79	75—76	—	0,76
37	97,64	68,78	68,73	8,82	8,96	4,06	4,00	89—90	102—103	—	0,79
43	94,64	65,00	64,92	8,43	8,32	3,85	3,98	113—114	144—146	—	0,83

Таблица 2

R	R'	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}	MR _D		А н а л и з, %						Т. пл. солей, °С			R _f
							найдено	вычислено	С		Н		N		гидро-хлорид	йодметилат	йодэтилат	
									найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено				
CH ₃	CH ₃	80,1	165—167/2	C ₁₆ H ₂₅ NO ₄	1,0543	1,5052	83,13	81,37	64,79	65,06	8,67	8,53	4,92	4,74	186—188	147—149	163—165	0,76
CH ₃	C ₂ H ₅	79,4	170—172/2	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄	1,0346	1,5021	92,27	90,60	67,12	66,85	8,90	9,04	4,07	4,32	155—156	150—152	121—122	0,79
C ₂ H ₅	CH ₃	78,6	173—175/2	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄	1,0217	1,4962	92,19	90,60	66,93	66,85	8,87	9,04	4,53	4,32	159—160	145—147	119—121	0,82
C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	80,7	178—180/2	C ₂₀ H ₃₃ NO ₄	1,0039	1,4918	98,04	99,84	68,39	68,34	9,30	9,46	4,15	3,98	165—166	130—131	150—151	0,80
C ₂ H ₇	CH ₃	77,2	195—197/2	C ₂₀ H ₃₃ NO ₄	1,0006	1,4942	102,30	99,84	68,60	68,34	9,58	9,46	3,71	3,98	—	117—119	—	0,84
C ₃ H ₇	C ₂ H ₅	78,2	206—208/2	C ₂₂ H ₃₇ NO ₄	1,9905	1,4913	111,04	109,08	69,80	69,63	9,94	9,83	3,55	3,70	110—112	98—99	—	0,86

R	R'	Выход, %	Т. кип., °C/мм	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}	MR _D		А н а л и з, %						Т. пл. солей, °C			R _f
							найдено	вычислено	С		Н		N		гидрохлоридов	йодметилатов	йодэтилатов	
									найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено				
CH ₃	N(CH ₃) ₂	81,2	180—182/2	C ₁₃ H ₁₉ NO ₄	1,1183	1,5311	70,08	67,51	61,76	61,64	7,70	7,56	5,36	5,53	165—166	157—158	144—145	0,76
CH ₃	N(C ₂ H ₅) ₂	80,6	185—187/2	C ₁₅ H ₂₃ NO ₄	1,0734	1,5283	78,71	76,75	64,30	64,03	8,45	8,23	4,96	4,98	137—138	143—144	195—196	0,82
CH ₃	C ₄ H ₉ N	81,4	191—193/2	C ₁₅ H ₂₁ NO ₄	1,1419	1,5428	77,08	74,55	64,72	64,50	7,80	7,57	4,95	5,01	115—116	125—126	123—124	0,78
CH ₃	C ₅ H ₁₀ N	79,5	207—209/2	C ₁₆ H ₂₃ NO ₄	1,1454	1,5402	80,38	79,17	65,73	65,50	8,15	7,90	4,90	4,78	161—162	141—142	117—118	0,76
CH ₃	C ₄ H ₉ NO	78,5	225—227/2	C ₁₅ H ₂₁ NO ₅	1,1857	1,5438	78,61	76,19	61,26	61,01	7,25	7,16	4,57	4,74	171—172	146—147	148—149	0,74
C ₂ H ₅	N(CH ₃) ₂	80,2	190—192/2	C ₁₅ H ₂₃ NO ₄	1,0894	1,5198	78,49	75,75	64,00	64,03	8,30	8,23	4,73	4,98	141—142	127—128	107—108	0,83
C ₂ H ₅	N(C ₂ H ₅) ₂	78,4	195—197/2	C ₁₇ H ₂₇ NO ₄	1,0577	1,5142	88,10	85,99	65,96	66,00	8,76	8,80	4,75	4,53	132—134	95—97	104—106	0,85
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉ N	79,3	210—212/2	C ₁₇ H ₂₅ NO ₄	1,1061	1,5123	83,43	83,78	66,69	66,42	8,32	8,20	4,32	4,56	122—123	101—102	96—97	0,80
C ₂ H ₅	C ₃ H ₁₀ N	78,5	217—219/2	C ₁₈ H ₂₇ NO ₄	1,0950	1,5292	90,48	88,40	67,19	67,27	8,75	8,46	4,52	4,35	138—139	136—137	—	0,81
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉ NO	80,6	250—252/2	C ₁₇ H ₂₅ NO ₅	1,1531	1,5340	87,17	85,43	63,29	63,13	7,57	7,79	4,12	4,33	144—145	133—135	—	0,79

CH ₃	CH ₃	79,3	180—182/2	C ₁₆ H ₂₅ NO ₄	1,0572	1,5131	83,99	81,37	65,34	65,06	8,33	8,53	4,81	4,74	190—191	137—138	125—126	0,82
CH ₃	C ₂ H ₅	80,2	185—187/2	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄	1,0351	1,5085	93,22	90,60	66,62	66,85	9,31	9,04	4,17	4,32	—	129—130	99—100	0,74
C ₂ H ₅	CH ₃	79,6	193—195/2	C ₁₈ H ₂₉ NO ₄	1,0475	1,5113	92,55	90,60	67,03	66,85	8,86	9,04	4,15	4,32	—	127—128	124—125	0,86
C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	80,4	215—217/2	C ₂₀ H ₃₃ NO ₄	1,0312	1,5028	100,73	99,84	68,49	68,34	9,69	9,46	4,08	3,98	—	101—102	110—111	0,89

Хлорангидрид 2,4-диэтоксibenзойной кислоты получен аналогично; перегоняется при 165—167°/2 мм, т. пл. 69—71°. Найдено %: Cl 15,27. Вычислено %: Cl 15,50.

Аминоэфирь 2,6-, 2,4-диалкоксibenзойных кислот. К раствору 0,05 моля хлорангидрида диалкоксibenзойной кислоты в 100 мл абсолютно-го бензола при перемешивании приливают 0,055 моля аминоспирта в 50 мл того же растворителя. Нагревают 6 часов, по охлаждении приливают 10%-ный раствор соляной кислоты до кислой реакции на конго, отделяют водный слой, насыщают его карбонатом натрия, приливают несколько капель раствора едкого натра и экстрагируют эфиром. Экстракт высушивают сульфатом натрия, отгоняют растворитель и остаток перегоняют в вакууме (табл. 1—4).

Гидрохлориды и йодалкилаты аминоэфиров получают в абсолютном эфире. Подавляющее большинство их—кристаллические вещества (табл. 1—4).

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ պ-ԱԼԿՕՔՍԻԲԵՆԶՈՒԿԱՆ ԹԹՈՒՆՆԵՐԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

XXVIII. 2,4- և 2,6-ԴԻԱԿՕՔՍԻ-ԲԵՆԶՈՒԿԱՆ ԹԹՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՄԽԱՒԱԹԵՐՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

Ա. Լ. ՄԵՋՈՅԱՆ, Վ. Գ. ԱՖՐԻԿՅԱՆ, Գ. Զ. ԽՈՐԵՆՅԱՆ, Բ. Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ և Է. Ս. ՄԱՐԱՇՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ցանկանալով պարզել բենզոլի օդակում ալկօքսի խմբերի դիրքի փոփոխման ազդեցությունը սրտանոթային համակարգի վրա, որպես շարունակություն նախկինում մեր սինթեզած 3-մեթօքսի-4-ալկօքսիբենզոական թթուների դիալկիլամինաէթանոլային և դիալկիլամինապրոպանոլային էսթերների որոշ ներկայացուցիչների կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրության, համապատասխան թթուների և ամինաակոհոլների փոխազդամար սինթեզել ենք 2,6- և 2,4-դիալկօքսիբենզոական թթուների դիալկիլամինաէթանոլային, β-հետերոցիկլիկ տեղակալված էթանոլային և α,β-դիմեթիլ-γ-դիալկիլամինապրոպանոլային էսթերները:

Ցարմակոլոգիական ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ սինթեզված միացությունների մեծ մասը սրտանոթային համակարգի վրա որոշակի ազդեցություն չի ցուցաբերում: Նշանակում է բենզոլի օդակում 3,4-դիրքից ալկօքսիլոմբերի տեղափոխությունը 2,6- և 2,4 դիրքերը հանգեցնում է ակտիվության նվազման:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. Л. Мнджоян, В. Г. Африкян, Г. А. Хоренян, Р. А. Алексанян, Н. О. Степанян, Изв. АН Арм. ССР, 18, 193 (1955); Арм. хим., ж., 22, 812 (1969).
2. F. P. Doyle, K. Hardy, J. H. C. Nayler, M. J. Souler, E. R. Stove, H. R. J. Waddington, J. Chem. Soc. 1962, 1453.
3. С. Купер, Синтезы орг. препаратов, 3, ИЛ, Москва, 1952, стр. 384.
4. А. Н. Кост, Общий практикум по орг. химии, Изд. «Мир», Москва, 1965, стр. 356.
5. R. S. Long, D. W. Hein, Пат. США, 2,671,790, 1954, [С. А., 49, 4024 (1955)].

ПРОИЗВОДНЫЕ СТИРОЛА

XXII. СИНТЕЗ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АМИДОВ
2-ВИНИЛБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

Г. М. ПОГОСЯН, Т. Г. КАРАПЕТЯН и С. Г. МАЦОЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 2 IX 1970

Синтезирован ряд алифатических и ароматических амидов 2-винилбензойной кислоты. Проведена полимеризация синтезированных мономеров в массе и растворах в присутствии динитрила азонзомасляной кислоты и определены температуры стеклования и характеристические вязкости полученных полимеров. По мере увеличения длины цепи алкильной группы N-монозамещенных амидов 2-винилбензойной кислоты их способность к полимеризации повышается. Такое же явление наблюдается и у дизамещенных амидов указанной кислоты. С увеличением длины алкильного остатка наблюдается понижение температуры стеклования полимерных амидов.

Рис. 3, табл. 3, библиограф. ссылки 6.

Ранее нами описаны синтез и полимеризация 2-винилбензойной кислоты и некоторых ее производных [1—3]. В продолжение этих работ представлялось интересным изучить влияние различных алифатических и ароматических амидных группировок на процесс полимеризации амидов 2-винилбензойной кислоты и свойства получаемых полимеров. В настоящей работе описаны синтез и полимеризация ряда амидных производных 2-винилбензойной кислоты; синтез последних осуществлен по ранее описанной методике из хлорангидрида 2-винилбензойной кислоты. Все полученные соединения, кроме диметил-, диэтил- и дибутиламидов, являются кристаллическими веществами, физико-химические свойства которых приведены в таблице 1.

Полимеризацию синтезированных мономеров проводили в массе, в толуоле и диметилформамиде в присутствии 0,5 мол. % динитрила азонзомасляной кислоты (ДАК) при 80°. Выход (%), температура стеклования (T_c) и характеристическая вязкость ($[\eta]$) полученных полимеров приведены в таблице 2. Очищенные образцы полимеров представляют собой белые порошки, растворимые в диметилформамиде, диоксане, толуоле и не растворимые в эфире, петролейном эфире и низших спиртах.

Нами исследована зависимость выхода полимеров от продолжительности процесса при выбранных стандартных условиях: концентрация мономера в диметилформамиде или толуоле 1 моль/л, концентрация ДАК $5 \cdot 10^{-3}$ моль/л и температура полимеризации 80°. Кинетические измере-

Таблица 1

R	Выход, %	Т. кип., °C/мм или т. пл., °C	n_D^{20}	d_4^{20}	Молекулярная формула	MR _D		А н а л и з, %					
						найдено	вычислено	С		Н		N	
								найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
NH ₂	81,2	153—154	—	—	C ₉ H ₉ NO	—	—	73,20	73,45	6,30	6,16	9,58	9,51
NHCH ₃	77,6	123—124	—	—	C ₁₀ H ₁₁ NO	—	—	74,71	74,50	7,03	6,87	8,91	8,68
N(CH ₃) ₂	76,1	109—111/1	1,5635	1,0587	C ₁₁ H ₁₃ NO	53,77	52,75	75,21	75,40	7,52	7,47	8,19	7,99
NHC ₂ H ₅	80,1	74—75	—	—	C ₁₁ H ₁₃ NO	—	—	75,23	75,40	7,23	7,47	8,12	7,98
N(C ₂ H ₅) ₂	76,6	120—121/1	1,5457	1,0361	C ₁₃ H ₁₇ NO	62,09	62,12	76,62	76,82	8,53	8,43	6,98	6,88
NHC ₃ H ₇	79,2	62—63	—	—	C ₁₃ H ₁₉ NO	—	—	75,95	76,15	7,96	7,98	7,31	7,39
NHC ₄ H ₉	90,5	61—62	—	—	C ₁₃ H ₁₇ NO	—	—	76,87	76,80	8,63	8,43	6,56	6,88
N(C ₄ H ₉) ₂	78,4	154—155/2	1,5241	0,9843	C ₁₇ H ₂₃ NO	81,66	80,93	78,41	78,71	10,01	9,71	5,79	5,39
NHCH ₂ C ₆ H ₅	74,7	88—89	—	—	C ₁₆ H ₁₉ NO	—	—	81,20	80,98	6,40	6,37	5,58	5,90
NHC ₆ H ₅	75,0	114—115	—	—	C ₁₅ H ₁₃ NO	—	—	80,40	80,69	5,76	5,86	6,15	6,22
<i>n</i> -CH ₂ OC ₆ H ₄ NH	72,6	118—119	—	—	C ₁₆ H ₁₅ NO ₂	—	—	75,80	75,86	6,00	5,96	5,40	5,52
<i>o</i> -CH ₂ C ₆ H ₄ NH	79,8	131—132	—	—	C ₁₆ H ₁₅ NO ₂	—	—	80,72	80,98	6,40	6,37	5,93	5,90
<i>o</i> -CH ₂ OC ₆ H ₄ NH	78,6	75—76	—	—	C ₁₆ H ₁₅ NO ₂	—	—	75,91	75,86	5,84	5,96	5,89	5,52

ния проводили дилатометрическим [2] и ампульным [4] методами. При сопоставлении кинетических кривых (рис. 1) видно, что по мере увеличения длины цепи алкильной группы N-монозамещенных амидов 2-винилбензойной кислоты (рис. 1) их способность к полимеризации повышается в ряду: $\text{CH}_3 < \text{C}_2\text{H}_5 < \text{C}_3\text{H}_7 < \text{C}_4\text{H}_9$. Такое же явление наблюдается и у дизамещенных амидов 2-винилбензойной кислоты (рис. 2) — $(\text{CH}_3)_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2 < (\text{C}_4\text{H}_9)_2$. Отсюда следует, что способность к полимеризации амидов 2-винилбензойной кислоты тем больше, чем больше алкильный остаток амидной группы, т. е. сильнее возможные стерические препятствия. Такое аномальное поведение в ряду амидов 2-винилбензойной кислоты, по-видимому, связано с наличием орто-эффекта, обуславливающего образование внутримолекулярного комплекса за счет π -связи винильной группы и неподеленной электронной пары азота амидной группы. Очевидно, с увеличением объема алкильных остатков уменьшается способность к комплексообразованию и доступность винильной группы к атаке радикалов увеличивается. Влияние орто-эффекта на свойства и реакционную способность мономеров отмечено и при изучении полимеризации 2-алкоксиметилстиролов [5].

Рис. 1. Зависимость глубины полимеризации амидов 2-винилбензойной кислоты в молярных растворах диметилформамида (ДМФ) и толуола (Т) от продолжительности реакции при 80°. 1—N-бутиламид (ДМФ); 2—N-пропиламид (ДМФ); 3—N-этиламид (ДМФ); 4—N-фениламид (ДМФ); 5—N-метиламид (ДМФ); 6—N-о-анизиламид (Т); 7—N-о-толиламид (Т); 8—N-п-анизиламид (Т).

Рис. 2. Начальные скорости полимеризации амидов 2-винилбензойной кислоты при 80°. 1—N-бензиламид; 2—N-бутиламид; 3—N-метиламид; 4—N,N-дибутиламид; 5—амид; 6—N,N-диэтиламид; 7—N,N-диметиламид; 8—стирол.

Таблица 2

Полимеризация амидов 2-винилбензойной кислоты в массе, в 50%-ном растворе диметилформамида (ДМФ) и в мольном растворе толуола (Т) в присутствии 0,5 мол. % ДАК (от мономера) при 80°; продолжительность полимеризации 4 часа

Мономер	Растворитель	Выход полимера, %	$[\eta]$, д.л./г	T_c , °C
Амид	ДМФ	84,0	0,17	—
N-Метиламид	ДМФ	75,0	0,30	189
N,N-Диметиламид	ДМФ	36,0	0,12	190
N-Этиламид	—	73,0*	2,23	165
N,N-Диэтиламид	—	42,5*	0,20	152
N-Пропиламид	—	82,0*	2,35	147
N-Бутиламид	—	85,0*	2,45	108
N,N-Дибутиламид	—	78,4*	0,22	—
N-Бензиламид	Т	94,0	0,27	176
N-Фениламид	ДМФ	77,0	0,15	191
N-л-Анизиламид	Т	53,0	0,28	173
N-о-Толиламид	Т	67,0	0,18	162
N-о-Анизиламид	Т	70,0	0,21	159

* В массе, 3 часа.

Таблица 3

Скорость полимеризации амидов 2-винилбензойной кислоты по отношению к стиролу при 80°

Мономер	$V \cdot 10^4$, моль/л·сек	$K \cdot 10^4$, л/моль·сек	Относительная скорость по отношению к стиролу
Стирол	0,290	4,102	1,0
Амид	0,868	12,25	3,1
N-Метиламид	1,666	23,55	5,8
N,N-Диметиламид	0,481	6,87	1,7
N-Этиламид	2,333	32,95	8,0
N,N-Диэтиламид	0,500	7,21	1,8
N-Пропиламид	3,000	42,30	10,3
N-Бутиламид	3,564	50,34	12,2
N,N-Дибутиламид	0,900	12,72	3,1
N-Бензиламид	4,333	60,00	14,6
N-Фениламид	1,890	26,69	6,5
N-л-Анизиламид	0,721	10,19	2,4
N-о-Толиламид	1,000	14,12	3,4
N-о-Анизиламид	1,222	17,26	4,2

Для количественной оценки реакционной способности амидов 2-винилбензойной кислоты были определены начальные скорости (V) при небольших глубинах превращения (до 10—12%) мономеров и вычислены эффективные константы скоростей (K). Для сравнения изучена также полимеризация стирола в аналогичных условиях и вычислены значения относительных скоростей полимеризации амидов 2-винилбензойной кислоты по сравнению со стиролом. Как видно из полученных результатов (рис. 2 и табл. 3), введение любой амидной группировки в положение 2 стирола повышает скорость полимеризации.

Рис. 3. Термомеханические свойства полимеров амидов 2-винилбензойной кислоты. 1 — N-этиламид; 2 — N-бензиламид; 3 — N-бутиламид; 4 — N-пропиламид; 5 — N,N-диэтиламид; 6 — N-метиламид; 7 — N,N-диметиламид; 8 — N-фениламид; 9 — N-л-ванилиламид; 10 — N-о-толиламид; 11 — N-о-анилиламид.

При определении термомеханических свойств (рис. 3) полимерных амидов 2-винилбензойной кислоты найдено, что с увеличением длины алкильного остатка наблюдается понижение T_g ; высокоэластичное состояние имеют полимеры N-этил-, N-пропил- и N-бутиламидов 2-винилбензойной кислоты, имеющие сравнительно высокие значения $[\eta]$.

Экспериментальная часть

Амиды 2-винилбензойной кислоты. К раствору 0,2 моля амина в 50 мл безводного бензола при охлаждении ледяной водой прибавляли 0,1 моля хлорангидрида 2-винилбензойной кислоты в 50 мл безводного бензола и оставляли при комнатной температуре на ночь. Выпавший гидрохлорид амина отфильтровывали, фильтрат промывали разбавленной соляной кислотой, затем водой и сушили сульфатом магния. После удаления бензола образовавшиеся амиды очищали перегонкой в вакууме или перекристаллизацией из спирта.

Полимеризацию мономеров проводили как указано выше. T_c полученных полимеров определяли на приборе Цетлина и сотрудников [6] экстраполированием прямолинейного участка термомеханической кривой на ось абсцисс. При определении T_c прилагаемая нагрузка была равной $0,34 \text{ кг/см}^2$. Измерение характеристической вязкости проводили в вискозиметре Оствальда при 20° для растворов полимеров в диметилформамиде.

ՄՏԻՐՈՒԻ ԱԾԱՆՅՅԱԼՆԵՐ

XXII. 2-ՎԻՆԻԼՐԵՆՉՈՅԱԿԱՆ ԹԹՎԻ ԱՄԻՆՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ ԵՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՈՒՄ

Գ. Մ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Թ. Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ և Ս. Գ. ՄԱՍՈՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո Վ մ

Նպատակ ունենալով հետազոտել զանազան ամիդային խմբակցությունների ազդեցությունը պոլիմերացման պրոցեսի և նրա ընթացքում գոյացող պոլիմերների հատկությունների վրա, սինթեզել ենք 2-վինիլբենզոյական թթվի ալիֆատիկ և արոմատիկ մի շարք ամիդներ:

Նշված ամիդների սինթեզը (70—90% ելքով) իրականացվել է 2-վինիլբենզոյական թթվի քլորանհիդրիդի և համապատասխան ամինների փոխազդմամբ, անջուր բենզոլի միջավայրում:

Ստացված մոնոմերների պոլիմերացումն ուսումնասիրվել է զանգվածում և լուծույթում, ազդեցության գաթաթթվի դինիտրիլի ներկայությամբ, և ցույց է տրվել, որ 2-վինիլբենզոյական թթվի N-միատեղակույթված ամիդների ալիլային խմբի մեծացմանը զուգընթաց մեծանում են պոլիմերիչուր արագությունը: Հստակ հեղուկացման պայմաններում մեծացման նրանք կազմում են հետևյալ շարքը՝ N-մեթիլամիդ < N-էթիլամիդ < N-պրոպիլամիդ < N-բուտիլամիդ:

Նույն օրինաչափությունը նկատվում է նաև նշված թթվի երկտեղակույթված ամիդների դեպքում N,N-դիմեթիլամիդ < N,N-դիէթիլամիդ < N,N-դիբուտիլամիդ:

Որոշված են ստացված պոլիմերների բնութագրական մածուցիկությունները և ապակեցման ջերմաստիճանները:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. М. Погосян, Т. Г. Карапетян, С. Г. Мацоян, ЖОрХ, 6, 139 (1970).
2. Г. М. Погосян, Т. Г. Карапетян, С. Г. Мацоян, Высокотемп. соед., 6, 463 (1970).
3. Г. М. Погосян, Т. Г. Карапетян, С. Г. Мацоян, Высокотемп. соед., (в печати).
4. Г. М. Погосян, Г. А. Жамкоян, Р. А. Степанян, С. Г. Мацоян, Арм. хим. ж., 22, 915, (1969).
5. Г. М. Погосян, Л. М. Акоюн, Э. В. Ванян, С. Г. Мацоян, Высокотемп. соед. (в печати).
6. Б. Л. Цетлин, В. И. Гаврилов, Н. А. Великовская, В. В. Кочкин, Зав. лаб., 22, 352 (1956).

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ БИГУАНИДА

А. А. АРОЯН, Т. Р. ОВСЕПЯН и И. Н. НИКОЛАЕВА

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Миджояна
 АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 15 VII 1970

С целью испытания гипотензивных и гипогликемических свойств синтезированы некоторые производные бигуанида, содержащие β-, γ-(4-алкоксибензилмеркапто)алкильные, β-(2-алкокси-5-бромбензилмеркапто)этильные и γ-(4-алкоксифенил)пропильные группы.

Табл. 2, библиографические ссылки 7.

Ранее полученные нами производные гуанидина, содержащие β-, γ-(4-алкоксибензилмеркапто)алкильные и β-(2-алкокси-5-бром-бензилмеркапто)этильные группы, проявляли гипотензивную активность [1].

Было интересно проследить изменение гипотензивных свойств в связи с переходом от гуанидиновой группы к гуанилгуанидиновой. С другой стороны, систематическое исследование производных гуанидил-гуанидина с различными заместителями выяснило антималярийные [2], гипотензивные [3], антивирусные [4], гипогликемические [5] и другие свойства этих соединений. Однако основной областью испытания свойств производных бигуанида является гликемия. В результате таких испытаний выявлен высокоактивный гипогликемический препарат N'-(β-фенэтил)бигуанид, нашедший клиническое применение [6]:

Производные бигуанида являются также интересными промежуточными соединениями в синтезе производных гетероциклических систем, в частности, производных триазина.

В этой связи представляли интерес синтез и испытание биологических свойств некоторых производных бигуанида с общими формулами I, II, III:

I n = 2, 3

II

Производные бигуанида нами получены сплавлением соответствующих первичных аминов с дигидроциандиамидом:

Температура реакции в каждом отдельном случае поддерживалась на 10–15° выше температуры расплавления смеси дигидроциандиамида и соответствующего амина. В случае бигуанидов структуры I ($n=2$) продукты реакции выделены в виде оснований и моногидрохлоридов. Затем основания были переведены в дигидрохлориды обработкой эфирным раствором хлористого водорода до pH 3–2. Бигуаниды I ($n=3$) и II из реакционной смеси выделены в виде оснований, так как для кристаллизации моногидрохлоридов из реакционной смеси, очевидно, необходимо длительное стояние. В случае бигуанидов III также выделены основания, которые не закристаллизовались и были охарактеризованы в виде сильно гигроскопичных дигидрохлоридов.

Амины, необходимые для синтеза бигуанидов I, III, получены ранее описанными методами [1], а γ -(4-алкоксифенил)пропиламины получены по приведенной схеме:

Взаимодействие 4-алкоксибензилхлоридов с циануксусным эфиром проводилось в присутствии эквивалентного количества метилата натрия и привело к 4-алкоксибензилциануксусным эфирам. Щелочным омылением последних получались соответствующие кислоты, которые декарбоксилированием в орде диметилформаида переводились в β -(4-алкоксифенил)пропионитрилы. Восстановлением нитрилов алюмогидридом лития получались γ -(4-алкоксифенил)пропиламины. Вследствие быстрой карбонизации аминов охарактеризованы их гидрохлориды.

Экспериментальная часть

Этиловые эфиры 4-алкоксибензилциануксусной кислоты (IV, R=CH₃, C₂H₅). К алкоголяту, приготовленному из 5,52 г (0,24 г-ат) натрия в 80 мл безводного метанола, при перемешивании и температуре 15° приливают 113 г (1 моль) этилового эфира циануксусной кислоты. Затем добавляют 0,24 моля 4-алкоксибензилхлорида в течение 30 минут. Смесь кипятят 10 часов. Спирт отгоняют, к остатку добавляют 100 мл воды и экстрагируют эфиром. Выход IV (R=CH₃) 34,7%; т. кип. 188—192°/1 мм; d_4^{20} 1,1266; n_D^{20} 1,5081; MR_D найдено 61,73, вычислено 61,68. Найдено %: С 66,72; Н 6,24; N 5,78. C₁₃H₁₅NO₃. Вычислено %: С 66,89; Н 6,48; N 6,00.

Выход IV (R=C₂H₅) 34,6%; т. кип. 194—196°/1 мм; d_4^{20} 1,1031; n_D^{20} 1,5040; MR_D найдено 66,38, вычислено 66,29. Найдено %: С 68,17; Н 6,48; N 5,90, C₁₄H₁₇NO₃. Вычислено %: С 68,01; Н 6,93; N 5,67.

4-Алкоксибензилциануксусные кислоты (V, R=CH₃, C₂H₅). К перемешиваемому раствору 6,4 г (0,16 моля) едкого натра в 50 мл воды при 25° добавляют 0,08 моля IV (R=CH₃, C₂H₅). Перемешивание продолжают еще час при 25° и подкисляют 27 мл 4 н соляной кислоты. Смесь перемешивают 30 минут, экстрагируют эфиром и эфирный экстракт промывают водой. После отгонки растворителя остаток при стоянии 10—12 часов кристаллизуется.

Выход V (R=CH₃) 98,7%, т. пл. 75—76° (из петролейного эфира). Найдено %: С 64,01; Н 5,35; N 7,11. C₁₁H₁₁NO₃. Вычислено %: С 64,37; Н 5,40; N 6,83.

Выход V (R=C₂H₅) 90,5%, т. пл. 82—84° (из петролейного эфира). Найдено %: С 66,11; Н 6,14; N 5,98. C₁₂H₁₃NO₃. Вычислено %: С 65,75; Н 5,98; N 6,39.

β-(4-Алкоксифенил)пропионитрилы (VI, R=CH₃, C₂H₅). Раствор 0,08 моля V (R=CH₃, C₂H₅) в 60 мл диметилформамида кипятят 1,5 часа. По охлаждению выливают в 60 мл воды, экстрагируют эфиром и сушат над сернокислым натрием. Нитрилы перегоняют в вакууме. Выход VI (R=CH₃) 73,9%; т. кип. 145—148°/1 мм; n_D^{20} 1,5298. R_f 0,88 в тонком слое окиси алюминия в системе эфир—метанол (5:3). По лит. данным т. кип. 290—300°, 167°/15 мм [7]. Найдено %: С 74,42; Н 7,11; N 8,34. C₁₀H₁₁NO. Вычислено %: С 74,50; Н 6,88; N 8,69.

Выход VI (R=C₂H₅) 87,7%; т. кип. 150—154°/1 мм; d_4^{20} 1,0211; n_D^{20} 1,5152; MR_D найдено 51,51, вычислено 50,79. R_f 0,83 в тонком слое окиси алюминия в системе эфир—метанол (5:3). Найдено %: С 74,95; Н 7,98; N 7,63. C₁₁H₁₃NO. Вычислено %: С 75,41; Н 7,48; N 7,80.

γ-(4-Алкоксифенил)пропиламини (VII, R=CH₃, C₂H₅). К раствору 4,2 г (0,112 моля) алюмогидрида лития в 100 мл безводного эфира при перемешивании приливают 0,056 моля VI (R=CH₃, C₂H₅) в 30 мл эфира. Продолжая перемешивание, смесь нагревают 20 часов, затем обрабатывают 30 мл 40%-ного раствора едкого натра. Амин извлекают эфиром.

Таблица 1

R	n	Выход основан- вания, %	Т. пл. основан- ния, °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %								Т. пл. гидро- хлорида, °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %			
					C		H		N		S				Cl		N	
					найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено			найде- но	вычис- лено	найде- но	вычис- лено
CH ₃	2	83,2	128—130	C ₁₂ H ₁₆ N ₅ OS	—	—	—	—	24,72	24,89	11,32	11,40	217—218а	C ₁₂ H ₂₁ Cl ₂ N ₅ OS	19,83	20,01	19,52	19,76
C ₂ H ₅	2	79,6	138—140	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ OS	—	—	—	—	23,52	23,71	11,07	10,85	208—209б	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ OS	19,12	19,25	18,71	19,01
C ₃ H ₇	2	80,4	—в	C ₁₄ H ₂₃ N ₅ OS	—	—	—	—	22,47	22,63	10,11	10,36	197—198	C ₁₄ H ₂₅ Cl ₂ N ₅ OS	18,36	18,54	18,02	18,31
изо-C ₃ H ₇	2	66,3	147—148	C ₁₄ H ₂₃ N ₅ OS	—	—	—	—	22,37	22,63	10,23	10,36	216—217г	C ₁₄ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ OS	18,25	18,54	18,15	18,31
C ₆ H ₅	2	84,5	143—144	C ₁₅ H ₂₅ N ₅ OS	—	—	—	—	21,44	21,65	9,73	9,91	210—212	C ₁₅ H ₂₇ Cl ₂ N ₅ OS	17,72	17,88	17,37	17,67
изо-C ₆ H ₅	2	87,1	132—133	C ₁₅ H ₂₅ N ₅ OS	—	—	—	—	21,27	21,65	9,63	9,91	217—218	C ₁₅ H ₂₇ Cl ₂ N ₅ OS	17,61	17,88	17,48	17,67
CH ₃	3	81,7	93—94	C ₁₃ H ₂₁ N ₅ OS	52,63	52,84	6,96	7,17	23,45	23,71	—	—	191—192	C ₁₃ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ OS	19,08	19,25	18,75	19,01
C ₂ H ₅	3	90,4	109—110	C ₁₄ H ₂₃ N ₅ OS	54,11	54,36	7,50	7,49	22,47	22,63	—	—	110—113д	C ₁₄ H ₂₃ Cl ₂ N ₅ OS	18,23	18,54	18,11	18,31
C ₃ H ₇	3	77,6	110—112	C ₁₅ H ₂₅ N ₅ OS	54,97	55,61	8,01	7,79	21,24	21,65	—	—	215—217	C ₁₅ H ₂₇ Cl ₂ N ₅ OS	17,56	17,88	17,45	17,67

а. Т. пл. моногидрохлорида 120—122°. б. Т. пл. моногидрохлорида 124—126°. в. Не удалось закристаллизовать. г. Т. пл. моногидрохлорида 138—140°. д. Гигроскопичен.

ром. Выход VI ($R=CH_3$) 78,2%; т. кип. 110—112°/1 мм; т. пл. гидрохлорида 222—223° (из этанола). По лит. данным, т. пл. гидрохлорида 220—225° [7]. Найдено %: Cl 16,97; N 6,72. $C_{10}H_{16}ClNO$. Вычислено %: Cl 17,58; N 6,95.

Выход VII ($R=C_2H_5$) 71,8%, т. кип. 122—125°/1 мм, т. пл. гидрохлорида 231—232° (из этанола). Найдено %: Cl 15,87; N 6,30. $C_{11}H_{18}ClNO$. Вычислено %: Cl 16,45; N 6,49.

N'-[γ-(4-Алкоксифенил)пропил]бигуаниды (II, $R=CH_3, C_2H_5$). Смесь 0,02 моля гидрохлорида амина VII ($R=CH_3, C_2H_5$) и 1,7 г (0,02 моля) дициандиамида тщательно измельчают в ступке и при перемешивании нагревают на металлической бане. При температуре бани 120—125° смесь начинает плавиться и полностью расплавляется при температуре бани 140—145°, затем за счет экзотермической реакции температура смеси быстро поднимается; поэтому баню удаляют на 10—15 минут и затем вновь подставляют. Нагревание продолжают еще час при температуре бани 150—160° и смесь оставляют на 10—12 часов. Затвердевший продукт растворяют в 50 мл воды и добавляют 40%-ный раствор едкого натра до pH 9—9,5. Выпавший маслообразный осадок оставляют в холодильнике 10—12 часов, отфильтровывают и перекристаллизовывают из смеси ацетона с эфиром (1:1).

Таблица 2

R	Выход основанья, %	Т. пл. дигидрохлорида, °C	Молекулярная формула	Анализ, %			
				C		N	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH_3	76,2	82—84	$C_{12}H_{20}BrCl_2N_5OS$	16,12	16,37	15,19	16,16
C_2H_5	64,2	69—70	$C_{13}H_{22}BrCl_2N_5OS$	15,73	15,86	15,43	16,66
C_3H_7	66,3	102—103	$C_{14}H_{24}BrCl_2N_5OS$	15,08	15,37	15,13	15,18
C_4H_9	81,4	114—115	$C_{15}H_{26}BrCl_2N_5OS$	14,81	14,91	14,67	14,73

Выход II ($R=CH_3$) 83,3%, т. пл. 119—121°. Обработкой спиртового раствора основания насыщенным эфирным раствором хлористого водорода получен дигидрохлорид бигуанида с т. разл. 230—231° (из этанола). Для основания найдено %: C 57,92; H 7,28; N 28,32. $C_{12}H_{19}N_5O$. Вычислено %: C 57,81; H 7,68; N 28,09. Для дигидрохлорида найдено %: Cl 22,45; N 22,04. $C_{12}H_{21}Cl_2N_5O$. Вычислено %: C 22,63; N 21,73.

Выход II ($R=C_2H_5$) 66,0%, основание маслообразно, т. разл. дигидрохлорида 239—240° (из этанола). Для основания найдено %: C 63,72; H 7,67; N 26,17. $C_{13}H_{21}N_5O$. Вычислено %: C 63,81; H 8,04;

N 26,59. Для дигидрохлорида найдено %: Cl 21,52; N 20,64. $C_{13}H_{22}Cl_2N_5O$.
Вычислено %: Cl 21,69; N 20,83.

Бигуаниды I, III и их дигидрохлориды получены аналогично выше-
описанному. Реакционная температура для каждого представителя под-
держивалась на 10—15° выше температуры плавления соответствующей
смеси. Полученные данные приведены в таблицах 1,2

ԲԻԳՈՒԱՆԻԴԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

Հ. Ա. ՉԱՐՈՅԱՆ, Բ. Ռ. ՉՈՎՍԵՓՅԱՆ և Ի. Ն. ՆԻԿՈՒԱԵՎԱ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հիպոթենզիկ և հիպոզիկիմիկ հատկությունների հետազոտման նպա-
տակով սինթեզված են մի շարք β-, γ-(4-ալիօքսիբենզիլմերկապտա)ալիլ-,
β-(2-ալիօքսի-5-բրոմբենզիլմերկապտա)էթիլ- և γ-(4-ալիօքսիֆենիլ)պրոպիլ-
տեղակալված բիգուանիդներ՝ համապատասխան առաջնային ամինների և
դիցիանդիամիդի փոխազդմամբ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. А. Ароян, Т. Р. Овсепян, Арм. хим. ж., 21, 858 (1968); А. А. Ароян, Т. Р. Овсепян,
П. Р. Акопян, Арм. хим. ж. (в печати).
2. H. C. Carrington, Nature, 168, 1080 (1951).
- 3 Франц. пат. 1, 320, 255 (1963); [С. А., 59, 10010b (1963)].
4. Яп. пат. 69, 01, 981 (1969); [С. А., 70, 87848 (1969)].
5. S. L. Shapiro, V. A. Farrino, L. Freedman, J. Am. Chem. Soc., 81, 2220 (1959).
6. J. Pomeranze, H. Fujity, G. T. Mouratoff, Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 95, 193
(1957).
7. Bellst., 10, (107).

СИНТЕЗ 2-(3'-ХЛОР-4'-АЛКОКСИБЕНЗИЛ)ИМИДАЗОЛИНОВ

А. А. АРОЯН, П. Р. АКОПЯН и Т. Р. ОВСЕПЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
 АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 19 XI 1970

С целью испытания антигистаминных свойств синтезирован ряд 2-(3'-хлор-4'-алкоксибензил)имидазолинов. В ходе синтеза получены и описаны 3-хлор-4-алкоксибензилцианиды, гидрохлориды этиловых иминоэфиров 3-хлор-4-алкоксифенилуксусных кислот и гидрохлориды 3-хлор-4-алкоксифенилацетамидинов.

Табл. 4, библиограф. ссылок 6.

Препараты замещенных имидазолинов нашли применение в качестве лекарственных средств, влияющих на систему кровообращения [1], и антагонистов гистамина [2].

В предыдущей работе сообщалось о синтезе 2-(2'-алкокси-5'-хлорбензил)имидазолинов, предварительное биологическое испытание которых выявило их антигистаминную активность. Один из них—2-(2'-этоксифенил-5'-хлорбензил)имидазолин, в разведении $1 \cdot 10^{-6}$ снимал сокращение, вызванное гистамином, использованным в концентрации $1 \cdot 10^{-6}$ на 96% [3].

Для проверки влияния изменения положения хлора в ароматической части на биологические свойства имидазолинов нами синтезированы имидазолины структуры III по следующей общей схеме:

3-Хлор-4-алкоксибензилхлориды получены по разработанным нами ранее способам хлорметилирования о-хлоралкоксибензолов [4, 5]. Взаимодействие 3-хлор-4-алкоксибензилхлоридов с цианистым натрием

привело к нитрилам I. Пропусканием сухого хлористого водорода через смесь нитрилов с эквивалентным количеством безводного этанола в эфире с высокими выходами получены гидрохлориды этиловых иминоэфиров 3-хлор-4-алкоксифенилуксусных кислот (II); это белые кристаллические вещества с невысокими температурами плавления. 2-Замещенные имидазолины получены взаимодействием иминоэфиров II с этилендиамином в среде безводного этилового спирта.

Иминоэфиры II были использованы также для получения гидрохлоридов 3-хлор-4-алкоксифенилацетамидинов (IV).

Последние являются удобными соединениями для перехода к замещенным диоксипириимидинам [6] и 2-имидазолинам. Нами они использованы для встречного синтеза замещенных 2-имидазолинов с целью их идентификации.

Экспериментальная часть

3-Хлор-4-алкоксибензилцианиды (I). Смесь 0,1 моля 3-хлор-4-алкоксибензилхлорида, 7,4 г (0,14 моля) измельченного цианистого натрия, 1 г йодистого натрия и 60 мл абсолютного ацетона при перемешивании кипятят на водяной бане в течение 26—30 часов. Затем отфильтровывают осадок, отгоняют ацетон, к остатку приливают 50 мл воды и маслянистый слой экстрагируют бензолом. Бензолный экстракт высушивают над прокаленным сернокислым натрием и после отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме (табл. 1).

Гидрохлориды этиловых иминоэфиров 3-хлор-4-алкоксифенилуксусных кислот (II). К раствору 0,1 моля 2-хлор-3-алкоксибензилцианида в 30 мл абсолютного эфира прибавляют 4,6 г (0,1 моля) абсолютного этанола. При охлаждении через смесь пропускают ток сухого хлористого водорода до насыщения. Затем удаляют в вакууме растворитель и выпавший осадок отфильтровывают, дважды промывают эфиром (табл. 2).

Гидрохлориды 2-(3'-хлор-4'-алкоксибензил)имидазолинов (III). Смесь 0,05 моля гидрохлорида этилового иминоэфира 3-хлор-4-алкоксифенилуксусной кислоты, 0,33 г (0,055 моля) безводного этилендиамина и 20 мл абсолютного этанола кипятят на водяной бане 6 часов. Затем в раствор пропускают сухой хлористый водород до кислой реакции на конго. От горячего раствора отфильтровывают осадок—гидрохлорид этилендиамида. Фильтрат выпаривают. Продукт кристаллизуется при добавлении абсолютного эфира. Перекристаллизовывают из абсолютного этанола (табл. 3).

Таблица 1

R	Выход, %	Т. кип., °C/мм	Т. пл., °C	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}	MR _D		Анализ, %			
							найдено	вычислено	Cl		N	
									найдено	вычислено	найдено	вычислено
C ₃ H ₇	79,9	—	47—49	C ₁₁ H ₁₂ CINO	—	—	—	—	16,62	16,91	6,38	6,70
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	63,2	150—152/1	—	C ₁₁ H ₁₂ CINO	1,0606	1,5278	59,19	55,66	16,67	16,91	6,43	6,70
C ₄ H ₉	68,8	163—165/1	—	C ₁₂ H ₁₄ CINO	1,1129	1,5248	61,58	60,28	15,82	15,84	6,02	6,28
<i>изо</i> -C ₄ H ₉	59,4	155—156/1	—	C ₁₂ H ₁₄ CINO	1,1056	1,5211	61,60	60,28	15,77	15,84	5,96	6,28
C ₅ H ₁₁	79,6	165—168/1	—	C ₁₃ H ₁₆ CINO	1,0931	1,5171	65,81	64,89	14,82	14,91	5,68	5,91

Таблица 2

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %					
				С		Н		Cl	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
C ₃ H ₇	51.1	112—113	C ₁₃ H ₁₆ Cl ₂ NO ₂	53,12	53,40	6,50	6,55	24,13	24,31
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	95.2	85—86	C ₁₃ H ₁₆ Cl ₂ NO ₂	53,03	53,40	6,31	6,55	24,02	24,31
C ₄ H ₉	67.1	110—111	C ₁₄ H ₂₁ Cl ₂ NO ₂	54,54	54,89	6,75	6,91	22,92	23,22
<i>изо</i> -C ₄ H ₉	73.2	95—96	C ₁₄ H ₂₁ Cl ₂ NO ₂	54,73	54,89	6,58	6,91	22,91	23,22
C ₅ H ₁₁	79.7	97—98	C ₁₅ H ₂₃ Cl ₂ NO ₂	55,97	56,27	7,02	7,24	21,87	22,18

Таблица 3

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %							
				С		H		Cl		N	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	53,8	165—166	C ₁₁ H ₁₄ Cl ₂ N ₂ O	50,56	50,59	5,66	5,40	27,55	27,18	10,56	10,72
C ₂ H ₅	51,1	195—197	C ₁₂ H ₁₆ Cl ₂ N ₂ O	52,35	52,37	6,12	5,86	26,02	25,76	9,92	10,17
C ₃ H ₇	76,3	131—133	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O	52,68	53,99	6,58	6,27	24,67	24,51	9,43	9,68
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	76,3	142—144	C ₁₃ H ₁₈ Cl ₂ N ₂ O	54,09	53,99	6,50	6,27	24,82	24,51	9,37	9,68
C ₄ H ₉	78,4	167—168	C ₁₄ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O	55,62	55,45	6,99	6,64	23,46	23,38	8,97	9,23
<i>изо</i> -C ₄ H ₉	52,3	193—195	C ₁₄ H ₂₀ Cl ₂ N ₂ O	54,90	55,45	6,97	6,64	23,59	23,38	9,01	9,23
C ₅ H ₁₁	52,2	171—173	C ₁₅ H ₂₂ Cl ₂ N ₂ O	56,32	56,79	6,73	6,99	22,76	22,34	8,72	8,82

Гидрохлориды 3-хлор-4-алкоксифенилацетамидинов (IV). Смесь 0,1 моля гидрохлорида этилового иминоэфира 2-алкокси-5-хлорфенилуксусной кислоты и 100 мл абсолютного этанола насыщают аммиаком до полного растворения осадка. Отгоняют этиловый спирт досуха, добавляют абсолютный эфир и отфильтровывают выпавшие кристаллы (табл. 4).

Гидрохлорид 2-(3'-хлор-4'-бутоксифенил)имидазолина. Смесь 1,38 г (0,005 моля) гидрохлорида 3-хлор-4-бутоксифенилацетамидина, 0,32 г (0,0054 моля) этилендиамина и 5-мл этанола кипятят на водяной бане 6 часов. Затем в раствор пропускают сухой хлористый водород до кислой реакции на конго. От горячего раствора отфильтровывают осадок—

гидрохлорид этилендиамина. Фильтрат выпаривают, продукт кристаллизуется при добавлении абсолютного эфира. Выход 0,9 г (59,6%); т. пл. 167—168° (из этанола). Найдено %: С 55,05; Н 7,24; Cl 23,46; N 9,47. $C_{14}H_{20}Cl_2N_2O$. Вычислено %: С 55,45; Н 6,64; Cl 23,38; N 9,23.

Таблица 4

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %					
				С		Н		N	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
C_3H_7	91,1	133—135	$C_{11}H_{16}Cl_2N_2O$	50,57	50,19	6,29	6,13	10,88	10,64
<i>изо</i> - C_3H_7	77,6	141—143	$C_{11}H_{16}Cl_2N_2O$	50,49	50,19	6,33	6,13	10,96	10,64
C_4H_9	64,8	135—136	$C_{12}H_{18}Cl_2N_2O$	51,53	51,99	6,71	6,54	10,38	10,10
<i>изо</i> - C_4H_9	72,1	153—155	$C_{12}H_{18}Cl_2N_2O$	51,20	51,99	6,82	6,54	10,27	10,10
C_8H_{11}	84,2	113—115	$C_{13}H_{20}Cl_2N_2O$	53,33	53,60	7,38	6,92	9,89	9,62

Гидрохлорид 2-(3'-хлор-4'-изобутоксibenзил)имидазолина получен аналогичным образом. Выход: 50,1%; т. пл. 194—195°. Найдено %: С 54,9; Н 6,97; Cl 24,15; N 9,38. $C_{14}H_{20}Cl_2N_2O$. Вычислено %: С 55,45; Н 6,64; Cl 23,38; N 9,23.

2-(3'-քլոր 4'- ալկոքսիբենզիլ)իմիդազոլինի սինթեզ

2. Ա. ՉԱՐՈՅԱՆ, Պ. Բ. ՉԱՎՈՐՅԱՆ և Թ. Ռ. ՀՈՎՏԵՓՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո ս մ

Էթիլենդիամինի հետ 3-քլոր-4-ալկոքսիֆենիլքացախաթթվի էթիլային իմինաէսթերների և 3-քլոր-4-ալկոքսիֆենիլքացետամիդների և 3-քլոր-4-ալկոքսիֆենիլքացետամիդինների հիդրոքլորիդների փոխազդամար անտիհիստամինային հատկությունների փորձարկման նպատակով սինթեզված են մի շարք 2-(3'-քլոր-4'-ալկոքսիբենզիլ)իմիդազոլիններ, իմինաէսթերների սինթեզի համար անհրաժեշտ 3-քլոր-4-ալկոքսիբենզիլցիանիդներն ստացված են 3-քլոր-4-ալկոքսիբենզիլքլորիդների հետ նատրիումի ցիանիդի ռեակցիայով: 3-քլոր-4-ալկոքսիֆենիլքացախաթթվի էթիլային իմինաէսթերների հիդրոքլորիդներն օգտագործված են նաև 3-քլոր-4-ալկոքսիֆենիլքացետամիդինների ստացման համար:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *R. Meler, R. Muller*, *Schweiz. Med. Wocheschr.*, 69, 1271 (1939); *J. Lussler*, *Rev. can. biol.*, 5, 462 (1946); [*C. A.*, 41, 810b (1947)].
2. *B. N. Halpern*, *Arch. Intern. Pharmacodyn. Therap.*, 68, 339 (1942); [*C. A.*, 38, 597 (1944)].
3. *A. А. Ароян, М. А. Ирадян*, *Арм. хим. ж.*, 23, 185 (1970); *М. А. Ирадян* канд. дисс., Ереван, 1970.
4. *А. А. Ароян, Т. Р. Овсепян, Р. Г. Мелик-Оганджян, В. В. Ледяев*, *Арм. хим. ж.*, 22, 406 (1969).
5. *А. А. Ароян, Т. Р. Овсепян, В. В. Ледяев*, *Арм. хим. ж.*, (в печати).
6. *А. А. Ароян, Р. Г. Мелик-Оганджян*, *Арм. хим.* 22, 498 (1969).

ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

НЕКОТОРЫЕ 5-АЛКИЛ-5-п-АЛКОКСИБЕНЗИЛБАРБИТУРОВЫЕ
 КИСЛОТЫ

А. Л. МНДЖОЯН и А. С. АДЖИБЕКЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
 АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило VII 1970

Для испытания биологических свойств синтезированы 5-алкил-5-п-алкоксибензилбарбитуровые кислоты конденсацией двузамещенных малоновых эфиров с мочевиной. Табл. 2, библиографических ссылок 12.

За последнее десятилетие значительное повышение интереса к производным барбитуровой кислоты связано с их разнообразными биологическими свойствами. Помимо широкого применения в медицинской практике в качестве снотворных, обезболивающих препаратов, а также средств против диабета [1], противоядия против яда гадюки [2] и т. д., производные барбитуровой кислоты находят все большее применение в химической промышленности.

Незамещенная барбитуровая кислота, конденсируясь с формальдепидом, образует смолы [3]. Некоторые ее производные применяются как катализаторы полимеризации галогенных винилов [4] и стирола [5]. По данным ряда авторов [6], эти кислоты принимают участие также в процессах жизнедеятельности. Так, тимин, содержащийся в составе ДНК, при биологическом окислении образует барбитуровую кислоту.

В ряду 5-алкил-5-бензилбарбитуровых кислот только 5-этил-5-бензилбарбитуровая кислота обладает гипнотическим эффектом [7]. Данные, свидетельствующие о перспективности исследований в данной области, послужили основой для синтеза 5,5-дизамещенных барбитуровых кислот. В настоящей работе описывается группа веществ следующего строения.

$R = \text{CH}_3, \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_3\text{H}_7, \text{C}_4\text{H}_9, \text{CH}_2 = \text{CHCH}_3; \quad R' = \text{CH}_3, \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_3\text{H}_7, \text{C}_4\text{H}_9.$

По данным литературы, 5,5-дизамещенные барбитуровые кислоты, в основном, получают конденсацией эфиров циануксусной кислоты, соответствующих малоновых кислот, их эфиров или хлорангидридов с мочевиной [8,9]. Известен еще метод кон-

денсации диамида малоновой кислоты с диалкилкарбонатом в присутствии амида натрия в жидком аммиаке [10].

Нами выбран как более доступный с точки зрения исходных продуктов и простоты проведения реакций метод, основанный на конденсации мочевины с малоновыми эфирами.

Исходные монозамещенные малоновые эфиры получены взаимодействием диэтилового эфира малоновой кислоты с алкилбромидами в абсолютном толуоле в присутствии гидрида лития [11]. Промежуточные монозамещенные производные очищались обычной обработкой и после перегонки в вакууме в аналогичных условиях вводились в реакцию с *n*-алкоксибензилхлоридами (табл. 1). Выходы двузамещенных малоновых эфиров колеблются от 43 до 68%. Конденсация двузамещенных малоновых эфиров с мочевиной проведена обычным способом в присутствии алкоголята натрия [12]. 5,5-Дизамещенные барбитуровые кислоты (табл. 2) выделяются в виде труднокристаллизующихся масел. Очистка конечных продуктов перекристаллизацией была затруднена ввиду их плохой растворимости, вследствие чего некоторые из них были подвергнуты очистке переводом в соответствующие натриевые соли.

Чистота двузамещенных малоновых эфиров проверена хроматографией в тонком слое окиси алюминия второй степени активности с подвижной фазой бензол—ацетон (10:1) и проявлением йодом.

ИК спектры барбитуровых кислот содержат полосы поглощения $-\text{CO}-\text{NH}-\text{CO}-$ ($1720-1755 \text{ см}^{-1}$) и $-\text{NH}-\text{CO}-\text{NH}-$ (1670 см^{-1}) групп.

Экспериментальная часть

Диэтиловые эфиры двузамещенных малоновых кислот. К 0,79 г (0,1 моля) измельченного гидрида лития в 100 мл абсолютного толуола при перемешивании прибавляют в течение 30 минут 0,1 моля свежеперегнанного монозамещенного малонового эфира в 100 мл абсолютного толуола и нагревают при $60-70^\circ$ в течение 2—3 часов, после чего приливают раствор 0,1 моля *n*-алкоксибензилхлорида в 25 мл абсолютного толуола в течение 10 минут. Смесь кипятят 12 часов, охлаждают, отгоняют толуол, к остатку приливают воду, экстрагируют эфиром и после высушивания сульфатом натрия отгоняют растворитель, а остаток перегоняют в вакууме (табл. 1).

*5-Алкил-5-*n*-алкоксибензилбарбитуровые кислоты.* Получают этилат натрия из 60 мл абсолютного этилового спирта и 3,5 г (0,15 г-ат) натрия. К алкогольату прибавляют 6 г (0,1 моля) свежеперекристаллизованной мочевины и нагревают при перемешивании до растворения. Затем приливают 0,05 моля диэтилового эфира алкил-*n*-алкоксибензилмалоновой кислоты. Смесь кипятят 12 часов, отгоняют спирт. После промывки эфиром остаток растворяют в 70—80 мл воды и водный слой при охлаждении льдом подкисляют 18—20%-ной соляной кислотой. Образ-

Таблица 1

R	R'	Выход, %	Т. кип., °C/мм	Молекулярная формула	n_D^{20}	d_4^{20}	MR _D		Анализ, %				R _f
							найдено	вычислено	С		Н		
									найдено	вычислено	найдено	вычислено	
C ₃ H ₅	CH ₃	44,4	188—190/2	C ₁₇ H ₂₄ O ₅	1,0973	1,4940	81,81	82,05	67,18	66,23	7,65	7,84	0,68
C ₃ H ₇	CH ₃	56,2	192—193/2	C ₁₈ H ₂₆ O ₅	1,0957	1,4938	85,63	86,67	67,31	67,05	8,08	8,12	0,78
C ₄ H ₉	CH ₃	50,0	195—200/2	C ₁₉ H ₂₈ O ₅	1,0659	1,4896	91,95	91,29	67,90	67,83	8,80	8,39	0,76
CH ₃	C ₂ H ₅	58,3	190—192/1	C ₁₇ H ₂₄ O ₅	1,0775	1,4911	82,90	82,05	67,76	66,20	6,96	7,84	0,75
C ₃ H ₅	C ₂ H ₅	48,8	198—200/1	C ₁₈ H ₂₆ O ₅	1,0710	1,4882	86,85	86,67	66,66	67,08	8,30	8,13	0,75
C ₃ H ₇	C ₂ H ₅	40,2	190—195/1	C ₁₈ H ₂₆ O ₅	1,0639	1,4898	91,40	91,29	67,64	67,83	7,95	8,36	0,80
C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	59,5	202—203/1	C ₂₀ H ₂₈ O ₅	1,0609	1,4887	95,29	95,91	68,18	68,55	8,20	8,62	0,72
CH ₃	C ₃ H ₇	54,3	195—198/1	C ₁₈ H ₂₆ O ₅	1,0557	1,4848	87,48	86,67	67,20	67,08	8,07	8,13	0,78
C ₂ H ₅	C ₃ H ₇	56,8	196—200/1	C ₁₉ H ₂₈ O ₅	1,0590	1,4898	91,81	91,29	67,88	67,83	8,80	8,36	0,72
C ₃ H ₇	C ₃ H ₇	44,3	206—207/1	C ₂₀ H ₃₀ O ₅	1,0464	1,4890	96,66	95,91	68,35	68,53	8,85	8,60	0,65
C ₄ H ₉	C ₃ H ₇	44,2	207—210/1	C ₂₁ H ₃₂ O ₅	1,0400	1,4888	101,11	100,52	69,15	69,05	8,80	8,78	0,68
CH ₃	C ₄ H ₉	50,6	195—197/1	C ₁₉ H ₂₈ O ₅	1,0442	1,4888	92,84	91,30	68,20	67,83	7,80	8,30	0,67
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	58,5	200—201/2	C ₂₀ H ₃₀ O ₅	1,0947	1,4869	94,55	95,91	68,40	68,55	7,99	8,60	0,58
C ₃ H ₇	C ₄ H ₉	49,6	205—206/2	C ₂₁ H ₃₂ O ₅	1,0403	1,4872	100,80	100,52	68,90	69,05	9,40	8,78	0,57
C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	50,0	208—210/2	C ₂₂ H ₃₄ O ₅	1,0484	1,4868	103,80	105,14	69,60	69,78	9,28	9,44	0,56

вавшиеся маслообразные продукты перекристаллизовывают из этилового спирта; некоторые из них закристаллизовываются после длительного стояния в холодильнике.

Таблица 2

R	R'	Выход, %	Т. пл., С°	Молекулярная формула	А н а л и з, %					
					С		Н		N	
					най- дено	вычис- лено	най- дено	вычис- лено	най- дено	вычис- лено
C ₃ H ₇	CH ₃	43,1	*	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₄	63,95	63,15	7,10	6,62	8,85	9,20
C ₄ H ₉	CH ₃	41,0	208—209	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄	62,89	62,60	6,28	6,25	9,60	9,65
CH ₃	C ₂ H ₅	61,6	*	C ₁₄ H ₁₆ N ₂ O ₄	61,35	60,86	5,84	6,02	10,78	10,13
C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	44,3	105—106	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ O ₄	61,82	62,00	6,64	6,24	9,28	9,60
C ₃ H ₇	C ₂ H ₅	48,3	111—112	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄	63,42	63,15	6,07	6,62	9,84	9,20
C ₄ H ₉	C ₂ H ₅	35,3	109—110	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄	63,82	64,53	7,12	7,00	8,13	8,82
CH ₃	C ₃ H ₇	50,0	136—137	C ₁₅ H ₁₈ N ₂ H ₄	62,18	62,06	6,40	6,24	10,51	9,64
C ₂ H ₅	C ₃ H ₇	32,2	204—205	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄	62,97	63,15	7,87	6,62	10,58	9,20
C ₃ H ₇	C ₃ H ₇	53,6	198—199	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄	64,35	64,10	6,78	6,90	8,85	8,78
C ₄ H ₉	C ₃ H ₇	55,2	162—163	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₄	64,90	65,01	7,40	7,27	8,22	8,43
C ₃ H ₅	C ₃ H ₇	41,5	95—96	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₄	64,69	64,58	6,20	6,37	9,54	8,88
CH ₃	C ₄ H ₉	47,3	122—123	C ₁₆ H ₂₀ N ₂ O ₄	63,23	63,15	6,18	6,62	9,34	9,20
C ₂ H ₅	C ₄ H ₉	46,7	192—195	C ₁₇ H ₂₂ N ₂ O ₄	63,87	64,13	6,35	6,96	8,63	8,78
C ₃ H ₇	C ₄ H ₉	51,0	195—196	C ₁₈ H ₂₄ N ₂ O ₄	64,96	65,04	6,85	7,27	8,32	8,42
C ₄ H ₉	C ₄ H ₉	48,6	216—218	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ O ₄	65,80	65,85	7,16	7,56	8,00	8,08

* Натриевые соли.

ԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱԹԹՎԻ ԱՄԱՆՅՅԱԿՆԵՐ

ՄԻ ՔԱՆԻ 5-ԱԿԻԿ-5- ա-ԱԿԿՕՐՍԻԲԵՆԶԻԲԱՐԲԻՏՈՒՐԱԹԹՈՒՆԵՐ

Ա. Լ. ՄՆՋՈՏԱՆ և Ա. Ս. ՉԱԶԻԲԵԿՑԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Հակացնցումային հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով սինթեզված են բարբիտուրաթթվի մի շարք ածանցյալներ: Մալոնային սինթեզով ստացված միատեղակալված մալոնային էսթերները ալ-ակոբսիբենզիլբրոդիդների հետ լիթիումի հիդրիդի ներկայությամբ բացարձակ չոր տոլուոլի միջա-

վայրում փոխազդելով առաջացրել են երկտեղակալված մալոնային էսթերները: Վերջիններս նատրիումի ալկոհոլատի ներկայությամբ սպիրտի միջավայրում կոնդենսվում են միդանություն հետ, տալով 5-ալկիլ -5- (պ-ալկոքսի-բենզիլ)բարբիտուրաթթուներ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *M. Vigante*, Acta univ. Latviensis, Med. Eakul. Serija. 2, 193 (1935); [С. А., 30 5307 (1936)].
2. *Такадзу, Сэкигуми*, Яп. пат. 6599 (1954); [РЖХ, 1958, 22504].
3. *W. Zerweck, M. Shubert*, Герм. пат. 734139 (1943); [С. А. 38, 1302 (1944)].
4. *H. F. Park*, пат. США 2.664.416 (1953); [С. А., 48, 4252 (1954)].
5. *G. Swann, E. L. Humberger*, Брит. пат. 684489 (1952); [С. А., 47, 7257 (1953)].
6. *Ф. Крик*, Хим. наука и пром., 1, 472 (1956); *F. J. S. Lara*, J. Bacter., 64, 271, 279 (1952); *О. Hayashi, A. Kornberg*, J. Am. Chem. Soc., 73, 2975 (1951).
7. *A. Dox, L. Yoder*, J. Am. Chem. Soc., 44, 1141 (1922).
8. Брит. пат. 468683 (1937); [С. А., 32, 730 (1938)].
9. *K. Abe*, J. Pharm. Soc. Japan, 75, 885 (1955); [С. А., 50, 4978 (1956)].
10. *K. Shtmo, Sh. Wakamatsu*, С. А., 54, 6740g (1960).
11. *О. Л. Мнձոյան, Э. Р. Багдасарян*, Изв. АН АрмССР, ХН, 15, 371 (1962).
12. *S. M. McElvain, H. Burkett*, J. Am. Chem. Soc., 64, 1831 (1942).

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 541.8+678.744.72

РАСТВОРИМОСТЬ СЛОЖНЫХ ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА

М. А. ЭНФИАДЖЯН, Л. Н. НАЗАРЯН и А. Е. АКОПЯН

Ереванский отдел НПО «ПЛАСТПОЛИМЕР»

Поступило 1 VI 1970

Рефрактометрическим методом исследована растворимость винилацетата, винилпропионата и винилбутирата в водных растворах поливинилового спирта. Установлено, что растворимость мономеров возрастает с увеличением концентрации поливинилового спирта.

Изучена кинетика растворения мономеров при 60° и показано, что насыщение раствора поливинилового спирта винилацетатом наступает за 11 часов, а винилпропионатом и винилбутиратом—за 32 часа.

Рис. 1., табл. 2, библиограф. ссылок 8.

При синтезе полимеров и сополимеров сложных виниловых эфиров методом эмульсионной полимеризации в качестве эмульгатора, в основном, применяется поливиниловый спирт.

В связи с этим представляет определенный интерес изучение растворимости сложных виниловых эфирных мономеров, например, винилацетата, винилпропионата и винилбутирата, в водных растворах поливинилового спирта при температуре полимеризации этих мономеров в эмульсии.

Относительно растворимости углеводородов и мономеров в растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ) имеется ряд исследований [1—8]. Однако они, в основном, относятся к растворимости бензола, стирола, гептана, олеофильных красителей, а также мономеров, применяемых в производстве синтетического каучука. Что же касается характера и величины растворимости вышеперечисленных эфирных мономеров в водных растворах поливинилового спирта, то в литературе почти отсутствуют какие-либо указания по этому поводу.

В качестве поверхностно-активного вещества нами был использован поливиниловый спирт марки ПВС-4 с содержанием ацетатных групп 0,92%. Мономеры сложных виниловых эфиров характеризовались показателями, приведенными в таблице 1.

Количество растворенного мономера определяли по изменению коэффициента рефракции по методике, приведенной в работе [8], используя следующее уравнение:

$$v_m = v_s \frac{\frac{n_s^2 - 1}{n_s^2 + 2} - \frac{n_p^2 - 1}{n_p^2 + 2}}{\frac{n_p^2 - 1}{n_p^2 + 2} - \frac{n_m^2 - 1}{n_m^2 + 2}}$$

где n — коэффициент рефракции; v — объем, p , s , m — индексы, относящиеся соответственно к раствору мономера в водном растворе эмульгатора, исходному раствору эмульгатора и мономеру.

Коэффициенты рефракции определяли при помощи рефрактометра ИРФ-23

Таблица 1

Мономеры	Т. кип., °С	ρ_m	n_D^{20}
Винилацетат	72,5	0,932	1,40954
Винилпропионат	92,0	0,915	1,41971
Винилбутират	114,0	0,899	1,42564

Для проведения каждого определения 10 мл раствора поливинилового спирта отмерялось в стеклянный сосуд с притертой пробкой емкостью 50 мл. Туда же вводился при помощи микробюретки определенный объем мономера. Содержимое колбы перемешивалось и термостатировалось при 60° на определенное время. При этой же температуре определяется коэффициент рефракции для раствора (n_p), эмульгатора (n_s) и мономера (n_m). Использовали растворы поливинилового спирта концентраций от 1 до 7%.

Для сравнения в аналогичных условиях определялись растворимости исследуемых мономеров в чистой воде при 20 и 60°. Полученные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Растворимость сложных виниловых эфиров в воде, мл

Мономеры	Температура, °С	
	20	60
Винилацетат	0,15	0,300
Винилпропионат	0,03	0,178
Винилбутират	0,02	0,085

При растворении мономеров в водном растворе поливинилового спирта коэффициент рефракции системы изменяется до насыщения раствора мономером. Так, насыщение раствора поливинилового спирта ви-

нилацетатом имеет место за 11 часов, а винилпропионатом и винилбутиратом—за 32 часа.

На рисунке приведены данные о растворимости мономеров в растворах поливинилового спирта различных концентраций при 60°.

Рис. Зависимость растворимости винилацетата, винилпропионата и винилбутирата от концентрации поливинилового спирта при 60°.

Из приведенных данных следует, что растворимость мономеров линейно возрастает с повышением концентрации поливинилового спирта. При этом увеличение длины цепи кислотного радикала в эфирной группе приводит к уменьшению растворимости мономера, что очевидно, связано с увеличением гидрофобности и фактора асимметричности молекулы мономера.

ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ԷՍԹԵՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈԼԻՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏԻ ԶՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ

Մ. Ա. ԷՆՅԻԱՋՅԱՆ, Լ. Ն. ՆԱԶԱՐՅԱՆ և **Հ. Ե. ՀԱԿՈՐԾԱՆ**

Ա մ փ ո փ ու մ

Ռեֆրակտոմետրիկ եղանակով հետազոտված է պոլիվինիլային սպիրտի ջրային լուծույթում վինիլացետատի, վինիլպրոպիոնատի և վինիլբուտիրատի լուծելիությունը:

Ցույց է տրված, որ պոլիվինիլային սպիրտի կոնցենտրացիայի բարձրացման հետ աճում է մոնոմերների լուծելիությունը:

Ուսումնասիրված է 60°-ում մոնոմերների լուծելիության կինետիկան և ցույց է տրված, որ վինիլացետատով պոլիվինիլային սպիրտի լուծույթի հագեցնալը տեղի է ունենում 11 ժամում, իսկ վինիլպրոպիոնատով և վինիլբուտիրատով՝ 32 ժամում:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. И. Юрженко, ЖОХ, 16, 1171 (1946).
2. С. С. Воюцкий, М. А. Зайцева, Усп. хим., 18, 69 (1947).
3. Л. Е. Перегудова, С. С. Воюцкий, Колл. ж., 10, 309 (1948).
4. А. И. Юрженко, Р. В. Кучер, Колл. ж., 14, 283 (1952).
5. В. А. Пчелин, В. Н. Измайлова, К. Т. Очурова, ДАН СССР, 123, 505 (1958).
6. В. А. Пчелин, В. Н. Измайлова, Г. П. Большова, ДАН СССР, 142, 950 (1962).
7. Г. П. Ямпольская, В. Н. Измайлова, В. А. Пчелин, В. А. Волынская, Высокомол. соед. 7, 1956 (1965).
8. Э. Л. Шакарян, Л. Г. Мелконян, Р. В. Багдасарян, Арм. хим. ж., 23, 10 (1970).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 546.271+547.415

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИБУТИЛБОРАНА С НЕКОТОРЫМИ
 АМИНАМИ

Г. Б. БАГДАСАРЯН, К. С. БАДАЛЯН и М. Г. ИНДЖИКЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 14 I 1971

В ходе работ, предпринятых с целью изучения боразотных соединений, нами исследовано взаимодействие трибутилборана с пиперидином (I), индолом (II) и N-метилпиперидином (III).

Взаимодействие трибутилборана с пиперидином имеет место уже при комнатной температуре. Реакция протекает с саморазогреванием, приводя к вязкому аддукту—пиперидинотрибутилборану (85%), при нагревании которого при температуре бани 150° в течение 30 часов образуются бутен-1 и водород с выходами ~70%. Основное количество газов образуется в течение 20 часов.

Образование бутена-1 и водорода с выходами ~80% наблюдалось и при нагревании трибутилборана с индолом при 150° в течение 23 часов. Однако выделить комплекс нам не удалось ни при комнатной температуре, ни при нагревании при 110°. В обоих случаях компоненты без изменения выделены обратно. Следует отметить, что индол очень плохо растворяется в трибутилборане.

Полученные данные свидетельствуют том, что в этом случае комплекс получается при более высокой температуре.

Согласно литературным данным, первичные амины при взаимодействии с трибутилбораном, наряду с бутеном-1, образуют бутан. Соотношение последних меняется в зависимости от природы взятого амина [1]. Нам не удалось обнаружить и следов бутана ни при разложении пиперидинотрибутилборана, ни при нагревании индола с трибутилбораном. Причина такого различия в поведении первичных аминов и исследованных вторичных аминов нами не выяснена.

Нам не удалось выделить комплекса и при взаимодействии трибутилборана с III. Однако нагревание эквимолекулярной смеси этих веществ при 150° в течение 30 часов привело к образованию бутена-1 и метана с выходами ~10%, что могло иметь место только при промежуточном образовании комплекса.

Взаимодействие аминов I—III с трибутилбораном может протекать по одной из данных схем, одна из которых включает в себя промежуточное образование бутильного аниона (б), вторая—схема шестичленного циклического переноса (а).

Мы отдаем предпочтение схеме (а).

Рассмотрение полученных данных еще раз говорит в пользу того, что в образовании аминборанов решающую роль играет не основность амина, а стерические факторы [2].

Экспериментальная часть

Пиперидинотрибутилборан. К 9,4 г (0,0516 моля) трибутилборана по каплям прибавлено 4,4 г (0,0516 моля) пиперидина. Уже при прибавлении первых капель амина наблюдается сильное разогревание и загустение смеси. Реакционная смесь оставлена на ночь. Перегонкой получено 11,6 г (85%) пиперидинотрибутилборана с т. кип. 110—112°/10,5 мм: d_4^{20} 0,8486; n_D^{20} 1,4688. Найдено %: С 75,75; Н 14,42; В 3,91. $C_{17}H_{28}B$. Вычислено %: С 76,40; Н 14,23; В 4,12.

Разложение аминборанов. Пиперидинотрибутилборан нагревался в течение 30 часов в колбе с обратным холодильником, последовательно соединенным с змеевиковым приемником, охлаждаемым до $-70 \rightarrow -80^\circ$, и газометром, при температуре бани 150° . Бутен собирался в змеевиковом приемнике, а водород—в газометре.

В двух других опытах на такой же установке нагревалась эквимолекулярная смесь амина с трибутилбораном.

Полученные газы идентифицированы с помощью ГЖХ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Б. М. Михайлов, В. А. Вавер, Ю. Н. Бубнов, ДАН СССР, 126, 575 (1959).
2. В. Джерард, «Химия органических соединений бора», Изд. «Химия», Москва, 1966, стр. 122.

Ըճղիւմեաւուր և Ֆիզիկական քիմիա

- Օ. Հ. Վարյապետյան, Հ. Հ. Զալիկյան, Ա. Հ. Մարտիրոսյան — Գերբիզին—կալիումի պերուլֆատ կոմպլեքսի մասին 755
- Ն. Մ. Բեյլեքյան, Ա. Գ. Խաչատրյան, Հ. Հ. Զալիկյան — Գերուլֆատ-իոն—փոփոխական վալենտականութեան կառուցումը զանազակ ընթացող սեպտիկաների կենսոկիւլայի և մեխանիզմի ուսումնասիրութեան համար կալիումի պերուլֆատ—էթանոլ սեպտիկայի կերտուլիութեան հնարավորութեան մասին 759
- Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Գ. Մելրոնյան, Ռ. Վ. Բաղդասարյան, Ի. Ա. Գրիգկովա — էմուլցատորի շերտերի կառուցվածքային առանձնահատկութիւնները ազդեցութեամբ պոլիմերացման կենսոկիւլայի և մեխանիզմի վրայ: IV. Զերմատիւնանի ազդեցութեամբ ջուր-պերուլֆատի ինքնաբերական ընթացող պոլիմերացման արագութեան վրայ 765

Անօրգանական և անօրգանական քիմիա

- Վ. Մ. Քառայան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ա. Վ. Մուշեղյան — Անօրգանական քիմիայում թիւայի պերիզիզմի գործադրութեան մասին: III. Մերկուրի- և մերկուրո-իոնների հետ թիւայի պերիզիզմի սեպտիկայի ուսումնասիրութեամբ 769

Օրգանական քիմիա

- Ա. Ա. Ավետիսյան, Գ. Ն. Քառայան, Մ. Տ. Դանդայան — Հետազոտութիւններ չհագեցած լակտոնների բնագրականում: VII. 3-հարթօքսի-4-մեթիլ-5-դիւալիլ-Δ3-բուտանոլիդների ազդի ստացում և նրանց ջաշարում 777
- Լ. Զ. Ղազարյան, Մ. Խ. Վարդանյան—β-N,N-Դիւալիլամինակարապոլիմերների սինթէզ 782
- Կ. Ա. Անդրիանով, Վ. Վ. Աստախին, Մ. Հ. Մելիքյան, Վ. Կ. Պիտով — α-ա-դի(Ամինա)պոլիօրգանասիւրջանների սինթէզ 786

Ա. Լ. Մնջոյան, Ի. Ա. Մարգարյան, Ռ. Ս. Բալայան, Վ. Մ. Ավագյան, Ա. Ս. Մաւաիւնյան — Արիլալիլամինների ածանցյալներ: III. N-(3,3-Դիւալիլպրոպիլ)-N-աբիլ(դիֆենիլ)ալիլամինների սինթէզ և ֆարմակոլոգիկական հատկութիւնները 791

Գ. Ք. Մարտիրոսյան, Հ. Յ. Ղազարյան, Գ. Գ. Ասատրյան, Ա. Ք. Բաբայան — β,γ-Չհագեցած ամինների սինթէզ և փոխարկումներ: X. β,γ-Չհագեցած ամինների կոնդենսումն արոմատիկ ածխաջրածինների հետ, ալյումինիումի ջրաբիւններէրկայութեամբ 798

Գ. Մ. Պողոսյան, Լ. Մ. Հակոբյան, Վ. Ա. Ասլամազյան, Ս. Գ. Մացոյան — Ստերոլի ածանցյալներ: XXIII. 3-բուտ-4-ալիլօքսիստերոլների սինթէզ և պոլիմերացում 802

Ա. Լ. Մնջոյան, Վ. Գ. Աֆրիկյան, Գ. Հ. Խոսրոնյան, Ռ. Ա. Ալեքսանյան, Ի. Ս. Մարաշյան — Հետազոտութիւններ պ-ալիլօքսիտերոլային թթուների ածանցյալների բնագրականում: XXVIII. 2,4- և 2,6-Դիւալիլօքսի-բենզոլային թթուների մի ջանք ամինաէսթերների սինթէզ 809

Գ. Մ. Պողոսյան, Ք. Բ. Կարապետյան, Ս. Գ. Մուցոյան — Ստերոլի ածանցյալներ: XXII. 2-վինիլբենզոլային թթվի ամինների սինթէզ և պոլիմերացում 816

Հ. Ա. Հարոյան, Ք. Ռ. Հովսեփյան, Ի. Ն. Նիկոլաւա — Բիզուլանիդի ածանցյալների սինթէզ 822

Հ. Ա. Հարոյան, Պ. Ռ. Հակոբյան, Ք. Ռ. Հովսեփյան — 2-(3'-ֆուր-4'-ալիլօքսիտերոլիլ)-իմիդազոլիների սինթէզ 828

Ա. Լ. Մնջոյան, Ա. Ս. Հաշիբեկյան — Բարբիտուրաթթվի ածանցյալներ: Մի ջանք 5-ալիլ-5-պ-ալիլօքսիտերոլարբիտուրաթթուներ 834

<i>A. A. Aroyan, T. P. Ovsepyan, I. N. Nikolaeva</i> — Синтез производных бигуанида	822
<i>A. A. Aroyan, P. P. Akoopyan, T. P. Ovsepyan</i> — Синтез 2-(3'-хлор-4'-алкоксибензил)имидазолинов	828
A. Л. Множоян , <i>A. С. Аджибекян</i> — Производные барбитуровой кислоты. Некоторые 5-алкил-5-п-алкоксибензилбарбитуровые кислоты	834

Химическая технология

<i>M. A. Энфиаджян, Л. Н. Назарян</i> , A. Е. Акоюн — Растворимость сложных виниловых эфиров в водных растворах поливинилового спирта	839
--	-----

Краткие сообщения

<i>Г. Б. Багдасарян, К. С. Бадалян, М. Г. Инджикян</i> — Взаимодействие трибутилборана с некоторыми аминами	843
---	-----

CONTENTS

General and Physical Chemistry

<i>H. A. Vartapetian, H. H. Chaltikian, A. A. Martirosian</i> — On the Pyridine Complex with Potassium Persulphate	755
<i>N. M. Bellerian, A. G. Khachatryan, H. H. Chaltikian</i> — On the Applicability of Potassium Persulphate—Ethanol Reaction to the Study of Kinetics and Mechanism of Persulphate Ion—Changeable Valency Cation Slow Reactions	759
<i>A. A. Hovhannissian, L. G. Melkonian, R. V. Baghdassarian, L. A. Gritskova</i> — Effect of Emulgator Layer Structural Particularities on Polymerization Kinetics and Mechanism. IV. Dependence of Chloroprene Self-Polymerization Rate on the Temperature	765

Inorganic and Analytical Chemistry

<i>V. M. Tarayan, A. A. Sarkissian, A. V. Musheghian</i> — Application of Thiopiperidone in Analytical Chemistry. III. Reaction of Thiopiperidone with Mercury- and Mercurio-ions	769
---	-----

Organic Chemistry

<i>A. A. Avetisyan, G. Ye. Tatevosyan, M. T. Danghian</i> — Studies on Unsaturated Lactones. VII. Preparation of 3-Carboxy-4-methyl-5,5-dialkyl- Δ^3 -butenolide Salts and Their Decomposition	777
<i>Z. Kazarian, Ts. Kh. Vardanian</i> — Synthesis of Dialkyl Acetals of β -N,N-Dialkylaminobutyraldehydes	782
<i>K. A. Andrianov, V. V. Astakhin, M. H. Melkian, V. K. Plzhor</i> — Synthesis of α,ω -di(Amino)polyorganosiloxanes	786
A. L. Mnjoyan , <i>E. A. Markarian, R. S. Balayan, H. M. Avakian, A. S. Tsatikian</i> — Derivatives of Arylalkylamines. III. Synthesis and Pharmacological Properties of N-(3,3-Diarylpropyl)-N-aryl(diphenyl)alkylamines	791
<i>G. T. Martirosian, A. Ts. Kazarian, G. G. Assatryan, A. T. Babayan</i> — Synthesis and Transformations of β,γ -Unsaturated Amines. X. Condensation of β,γ -Unsaturated Amines with Aromatic Hydrocarbons in the Presence of Aluminum Chloride	798

G. M. Poghoslian, L. M. Hakopian, V. S. Aslamazian, S. G. Matsoyan — Styrene Derivatives. XXIII. Synthesis and Polymerization of 3-Bromo-4-alkoxystyrenes	802
A. L. Mnjoyan , V. G. Afrtkian, G. A. Khorenian, R. A. Alexanian, E. S. Marashian — Studies on <i>p</i> -Alkoxybenzoic Acid Derivatives. XXVIII. Amine esters of 2,4- and 2,6-Dialkoxybenzoic Acids	809
G. M. Poghoslian, T. G. Karapetian, S. G. Matsoyan — Styrene Derivatives. XXII. Synthesis and Polymerization of 2-Vinylbenzoic Acid Amides	816
H. A. Haroyan, T. R. Houseplan, I. N. Nikolaeva — Synthesis of Biguanide Derivatives	822
H. A. Haroyan, P. R. Hakopian, T. R. Houseplan — Synthesis of 2-(3'-Chloro-4'-alkoxybenzyl)imidazolines	828
A. L. Mnjoyan , A. S. Hajibekian — Barbituric Acid Derivatives. Some 5-Alkyl-5- <i>p</i> -alkoxybenzylbarbituric Acids	834

Chemical Technology

M. A. Enflajian, L. N. Nazarian, H. E. Hakopian — Solubility of Vinyl Esters in Polyvinyl Alcohol Aqueous Solutions	839
---	-----

Short Communications

G. B. Baghdassarian, K. S. Badalian, M. G. Injikian — Interaction of Tributylboran with some Amines	843
---	-----

Технический редактор Л. А. АЗИЗБЕКЯН

ВФ 01669

Изд. № 3586

Заказ 267

Тираж 935

Сдано в производство 17/VIII 1971 г. Подписано к печати 12/X 1971 г.
 Формат бумаги 70 × 108^{1/16}. Печ. л. 6. Бум. л. 3. Усл. печ. л. 7,28.
 Уч. изд. л. 5,3.

Типография Издательства АН Армянской ССР, Ереван, Барекамутян, 24.