

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

А. Л. Тахтаджян

Заметка о двух новых видах рода *Ulmus* из Южного Закавказья

(Представлено академиком В. О. Гулканяном 26. III 1945)

Представители рода *Ulmus* относятся к числу наименее изученных древесных пород Кавказа. Недостаток гербарного материала, неполнота и случайность сборов сильно затрудняет изучение систематики и географии Кавказских вязов. Но уже просмотр накопившегося к настоящему времени материала убеждает нас в том, что Кавказ имеет свои эндемичные виды вязов и является, таким образом, одним из молодых очагов видообразования для рода *Ulmus*.

Настоящая заметка имеет своей целью обратить внимание закавказских ботаников на две очень интересные формы, полное описание которых не может быть к сожалению дано из-за недостатка материала. Ниже мы даем поэтому лишь предварительное описание этих видов.

1. *Ulmus araxina* Takht. sp. n. Frutex vel arbor. Ramis suberoso alatis, ramulis junioribus laevibus, subglabris. Petioli molliter puberuli, 3—5 mm longi. Gemmae fusco-atratae ovatae 3—3,5 mm longae, squamis breviter ciliatis. Folia adulta coriacea, mediocria, ovata circ. 4,5—5,5 cm longa, 3—4 cm lata, acuminata vel retusa, basi subcordata vel cuneata, subinaequalia, duplicato-serrata, serraturis subobtusis, supra glabra, subtus praeter nervorum axillas barbatae; nervi laterales 10. Flores et samarae ignoti.

Armenia, prov. Megri, prope pag. Lehvaz. 15 IX 1943!!

Typus in Herb. nom. Komarovi Instituti Botanici Academiae Scientiarum Armeniae conservatur.

2. *Ulmus Grossheimii* Takht. sp. n. Arbor. Ramis laevibus, ramulis junioribus pilosis. Petioli molliter puberuli, 5,5—6 mm longi. Gemmae ovatae 2—2,5 mm longae, squamis breviter ciliatis. Folia adulta papyracea, elliptica, circ. 10—11,5 cm longa, 4,5—5 cm lata, acuminata, basi cuneata, subinaequalia, duplicato-serrata, serraturis falcato-incurvis acutis, supra glabra vel parce puberula, subtus praeter nervorum axillas barbatae, caeterum parce molliter pilosa; nervi laterales 12—13. Flores et samarae ignoti.

Distr. Nakhitschevan, inter Ordubad et Megri, 29 V 1923.
A. Grossheim!

Typus in Herb. nom. Komarovi Institutii Botanici Academiae Scientiarum Armeniae conservatur.

Неполнота собранного материала (отсутствие цветов и плодов) не позволяет нам делать какие-либо определенные выводы о родстве описываемых видов. Особенно это касается *Ulmus Grossheimii* m., гербарные образцы которого резко выделяются среди всего имеющегося в нашем распоряжении материала. Характерные эллиптические остроконечные листья этого вида с крупными слегка серповидно загнутыми вверх первичными зубцами и темно-зеленой и слегка блестящей верхней стороной резко выделяют его среди всех кавказских видов. Хранящиеся в гербарии экземпляры были определены в 1924 году А. А. Гроссгеймом как *U. campestris* L. Что касается *Ulmus agachina* m., то он приближается больше всего к *U. suberosa* Moench., от которого отличается уже своими более мелкими кожистыми (а не бумагообразными) листьями и более короткими черешками. Мы надеемся, что сбор дополнительного материала и, в особенности, сбор цветов и плодов позволит более точно и полно описать эти виды и установить их место в системе вязов.

Ботанический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Гербарий им. В. Л. Комарова.
Ереван, 1945, март.

Ա. ՅԱԽՏԱԶՅԱՆ

Դիտարկումն *Ulmus* ցեղի երկու նոր սեռակների մասին
Հարավային Անդրկովկասից

Հեղինակը նկարագրում է *Ulmus* ցեղի երկու նոր տեսակ Հարավային
Անդրկովկասից և նշում է նոր նյութի հավաքման անհրաժեշտութիւնը
լրիվ նկարագրման համար: