

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Д. И. Сосновский, чл.-корресп. АН Груз. ССР

Кавказские астрагалы из секции *Ornithopodium*

(Представлено В. О. Гулканяном 4 XI 1945)

Во втором томе своей „Флоры Кавказа“ Гроссгейм приводит 5 многолетних видов астрагалов из секции *Ornithopodium*: *Astragalus ornithopodioides* Lam., *A. Stevenianus* DC., *A. multijugus* (Trautv.) Grossh., *A. ahtalensis* Freyn. et Conr., *A. Conrathii* Freyn. Оставляя в стороне бесспорно новый вид *A. ornithopodioides*, займемся обзором остальных видов данной секции.

Из них *A. Stevenianus* DC. несомненно представляет собой морфологически хорошо очерченный вид, произрастающий в восточной Грузии к востоку от меридиана Тбилиси, далее в западном предгорном Азербайджане и в низменном Дагестане, преимущественно на сухих каменистых склонах и осыпях. Вид этот впервые был выделен Стевеном под именем *A. gracilis* Stev., но диагноз его нигде не был опубликован. Название это, по номенклатурным соображениям,* было в 1825 г. заменено де Кандоллем⁽³⁾, назвавшим данный вид *A. Stevenianus*. Годом позже тот же вид был описан Ледебуром⁽⁶⁾ под весьма ему подходящим наименованием—*A. junceus* Ledeb. По законам приоритета необходимо удержать за ним более старое название *A. Stevenianus* DC. В качестве синонима сюда же, повидимому, необходимо отнести форму, описанную Траутфеттером, как *A. Stevenianus* v. *paucijuga* Trautv.⁽⁷⁾ Одновременно под именем *A. Stevenianus* v. *multijuga* Траутфеттер⁽⁷⁾ описал форму из Талыша, которую впоследствии Гроссгейм⁽¹⁾ совершенно справедливо возвел в ранг самостоятельного вида под именем *A. multijugus* (Trautv.) Grossh.

Под тем же названием *A. multijugus* многими исследователями определялся астрагал из южной Армении и из Нах. АССР. Пристальное изучение этого растения привело нас, однако, к убеждению, что в данном случае мы имеем дело с особым южно-закавказским видом секции *Ornithopodium*. На этот вид впервые обратил внимание К. Кох, собиравший его в окрестностях Эчмиадзина. Он определил его под невер-

* Название *A. gracilis* было уже использовано раньше.

ным названием *A. dauricus* Pall., но тут же отметил все характерные признаки вида, отличающие его как от *A. dauricus*, так, скажем, и от остальных кавказских видов секции *Ornithopodium*, в частности, он подчеркнул особую форму чашелистиков. Это растение мы описываем в настоящей работе под именем *A. Kochianus* D. Sosn.

Изучение форм, происходящих из юго-западного Закавказья (бывш. Кагызманского, Ольтинского и Артвинского округов), изобличает их тождество с видом *A. ispirensis* Boiss., описанным Буассье (2) из окрестностей Сбера (Испира). Таким образом, *A. ispirensis* Boiss. необходимо внести в список растений Закавказья.

Совершенно неразрешенным остается вопрос относительно двух последних перечисленных выше видов: *A. ahtalensis* и *A. Conrathii*. Подлинных экземпляров этих видов нам не удалось видеть, не приходилось нам видеть также и какие-либо астрагалы, принадлежащие к секции *Ornithopodium* из окр. с. Ахтала. Описание обоих видов у Фрейна (4), хотя и довольно обширное, не дает все же возможности не только установить их отличия от близкого, по словам автора, вида *A. Stevenianus*, но даже не позволяет найти какие-либо резкие черты различия между обоими видами, установленными Фрейном. Вообще, трудно предположить, чтобы в одном и том же географическом пункте (оба вида собраны Конратом на г. Карикатар в окр. Ахталы) могли произрастать совместно два филогенетически столь близких вида. Впоследствии оба вида никем из исследователей не собирались. Было бы желательно, чтобы будущие исследователи Ахталы не только собрали материал по данным видам астрагалов, но и вообще подробно исследовали этот весьма интересный во флористическом отношении район. Из окр. Ахталы Фрейном, по сборам Конрата, было описано еще несколько таких же загадочных видов, которые до сих пор, подобно вышеупомянутым астрагалам, никем не были собраны и продолжают оставаться невыясненными.

Ниже мы помещаем описание установленного нами нового вида.

Astragalus Kochianus D. Sosn. sp. n.—Syn. *A. dauricus* C. Koch in *Linnaea* XV (1841) 719 non Pall.

Caules ascendentes 30—35 cm alti stricte ramosi, juncei, adpressime pilosi. Folia 5—6-juga, stipulae exiguae subulatae, foliola linearia ad 1,5 cm longa, acutiuscula, adpresse pilosa breviter petiolulata. Racemi folio longiores densi, demum laxiusculi, bractaeae exiguae subulatae submembranaceae. Calyx cum dentibus ad 13—18 mm longus adpresse albo nigroque pilosus dentibus lineari subulatis tubi calycini $\frac{3}{4}$ subaequantes, corolla carnea, vexillo ovato-oblongo, stipitato, obscure emarginato, 20 mm longo, 7 mm lato, carina 13 mm longa, alis 11 mm longis. Legumen falcato incurvum, acutum adpresse albobilosum ad 5 cm longum. Perenne.

Ab *A. steventano* DC habitu dentibus calycinis forma, corolla colore sat bene differt. Typus. Armenia, prope Etschmiadzin. 23. VII. 19. fl. fr. leg. A. Grossheim.

Area geogr. Transcaucasia: Armenia merid., Republica Nachitschevan, probabiliter Irania borealis.

Ботанический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1945, октябрь.

Ornithopodium սեկցիայի կովկասյան աստղազայները

Հեղինակը նկարագրում է Astragalus ցեղի մի նոր տեսակ Ornithopodium սեկցիայից:

D. I. Sosnovsky

The Caucasian Astragals of the Section Ornithopodium

The author describes a new species of the genus *Astragalus* of the section *Ornithopodium*: *A. Kochianus* D. Sosnovsky sp. n.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. *A. A. Гроссгейм. Флора Кавказа, 2, Тбилиси, 1930.*
2. *E. Boisser. Flora orientalis, 2, Genevae et Basileae, 1872*
3. *De Candolle. Prodromus Systematis Naturalis, 2, 1825.*
4. *I. Freyn. Bull. de l'Herb. Boiss, 3, Genevae, 1895.*
5. *K. Koch. Linnaea, 15, 1841.*
6. *F. Ledebour. Flora Rossica, 2, Stuttgart, 1826.*
7. *E. R. Trautvetter. Acta Horti Petrop. 4, СПБ, 1876.*