С. К. Даль

**О нахождении подковоноса Мехели (*Rhinolophus Mehelyi*
Matschie) в Армянской ССР**

(Представлено В. О. Гулкавяном 21 XII 1945)

Подковонос Мехели, или румынский был описан в 1901 г. проф. Матчи из окрестностей Бухареста, по последующим исследованиям Миллера (G. S. Miller). Этот вид, как оказалось, встречается в Южной Франции, в Испании и на Сардинии. В последние годы подковонос Мехели был обнаружен в Закавказье (Большая Шушинская пещера в Нагорном Карабахе, пещера Кыз-Каласы около Шамахи и Мцхет).

Подковонос Мехели — летучая мышь, селящаяся в пещерах. Колонии их бывают от нескольких штук до сотен экземпляров. Так например, в Кыз-Каласы, как пишет А. И. Кузякин⁽¹⁾, „скопление этого крайне редкого вида достигало примерно 700—800 зверьков“.

В Армянской ССР подковонос Мехели обнаружен летом 1945 г. экспедицией Зоологического Института Академии Наук Арм. ССР. Лаборантом Института П. П. Гамбарян была найдена большая колония этих интересных животных. Помещалась она в старой заброшенной церкви, около селения Аличалу (Мартунинский район). Здесь подковоносы Мехели держались в количестве нескольких сот штук. Во время экскурсии 18 августа 1945 г. удалось весьма несовершенными способами добыть 7 этих животных.

При посещении этой-же колонии вторично, на следующий день, специально в целях сборов летучих мышей, П. П. Гамбарян не обнаружил в старой церкви ни одной из них. Все подковоносы покинули это место.

Подковоносы Мехели, добытые в Арм. ССР (Аличалу), почти идентичны по размерам и окраске с южно-европейскими. Размеры их по четырем самцам этого вида, хранящимся в коллекциях Зоологического Института АН Арм. ССР (№№ 530, 531, 532, 533), следующие: длина тела—49—51,5 мм, ухо—18,3—18,9 мм, предплечье—49,1—51 мм, разница в длине третьей и четвертой метакарпалий—2,8—3,5 мм, между четвертой и пятой—0,5—1,5 мм. Кондилобазальная длина черепа—

16,8—17,7 մմ, քանակը վերին շարքի շրջանում—6,4—7,0 մմ, սկուլային լայնությունը—9,5—10,0 մմ.

Օրհասը բոլոր մերիկայի շրջանների համար շատ բացահայտված է, որովհետև մեծ մասով դրանք հայտնաբերվում են արևմտյան և հարավարևմտյան հատվածներում:

Rhinolophus Mehelyi լինում է միջերկրածովյան ֆունկցիայի այդ ներկայացուցիչները հայտնի են եղել Իսպանիայից, Սարդինյան կղզուց, Հարավային Ֆրանսիայից, Ռումինիայից և Անդրկովկասից (Լեռնային Ղարաբաղ, Շամախի և Մցխեթ):

Зоологический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1945, декабрь.

Ս. Կ. ԴԱԼ

**Մեհելիի պաշտաքիթ չղջիկի (*Rhinolophus Mehelyi Matschie*)
ՀՍՍՌ-ում հայտարարվելու մասին**

Մեհելիի պաշտաքիթ չղջիկները գաղութներով բնակվում են արևմտյան և հարավարևմտյան հատվածում:

Միջերկրածովյան ֆունկցիայի այդ ներկայացուցիչները հայտնի են եղել Իսպանիայից, Սարդինյան կղզուց, Հարավային Ֆրանսիայից, Ռումինիայից և Անդրկովկասից (Լեռնային Ղարաբաղ, Շամախի և Մցխեթ): 1945 թ. ամառը Մեհելիի պաշտաքիթ չղջիկը գտնված է եղել Ալիչալու գյուղի շրջակայքում (ՀՍՍՌ Մարտունու շրջան), Չափերով և գունավորությամբ այդտեղ հայտարարված կենդանիները գրեթե չեն տարբերվում հարավ-եվրոպականներից:

S. K. Dahl

Horse-Shoe Bats (*Rhinolophus Mehelyi Matschie*) Found in Armenian SSR

The horse-shoe bats of Mehely are those which abide in colonies in the caves of the southern part of Europe. These representatives of Mediterranean fauna have been known from Spain, South France, from the Island of Sardinia, Rumania and Transcaucasia (Upland Kharabagh, Shemacha and Mtskhet).

In the summer of 1945 the horse-shoe bats of Mehely were found in the environs of Alichalu village (Martuni district of the Armenian SSR). In size and colour the animals discovered here, hardly differ from the south European ones.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. И. Кузякин. Рукокрылье. Опр. млекоп. СССР. 1944. 2. С. И. Огнев. Звери Вост. Европы и Зап. Азии, 1, 1928. 3. К. А. Сатунин. Опр. млекоп. Росс. Имп., 1914.