

М. Е. Тер-Минасян

**Новый вид рода *Bradybatus* Germ. из Армении (Coleoptera,
Curculionidae)**

(Представлено В. О. Гулканяном 14 III 1946)

При энтомологическом обследовании диких плодовых зарослей в районе Гехарда были произведены сборы насекомых и с других деревьев, которые цвели одновременно с плодовыми; среди добытых таким образом жуков оказался один новый вид рода *Bradybatus* Germ. Этот род очень близок к долгоносикам—цветоедам *Anthonomus* и приурочен, насколько известно, к кленам, на которых образ жизни его, повидимому, мало отличается от образа жизни *Anthonomus* на розовцветных.

До сих пор из Закавказья были показаны два вида рода *Bradybatus*, а именно *Br. kellneri* Bach и *Br. carbonarius* Reitt. (²), оба из подрода *Bradybatus* s. str. Новый вид, описываемый ниже, принадлежит к другому подроду—*Nothops* Bed. (*Pseudomorphus* Desbr.), виды которого распространены следующим образом: два в Сирии, один в центральной и южной Европе и один в Северной Африке.

Bradybatus grandis sp. nov.

Крупный, овальный, весь красновато-коричневый, или голова сверху, вершина головотрубки, переднеспинка, крупное пятно посредине надкрылий и заднегрудь черные; весь покрыт довольно толстыми светлыми чешуевидными волосками. Головотрубка ♂ почти равна по длине переднеспинке, у ♀ слегка длиннее, покрыта густыми и мелкими точками. Переднеспинка у основания двувыемчатая, равна по ширине надкрыльям, сильно конически суживается к вершине, с перетяжкой перед вершиной, с двойной скульптурой, вся густо и довольно крупно точечная, промежутки между крупными точками покрыты очень мелкой пунктировкой. Надкрылья обратно яйцевидные, от плеч расширены назад, наибольшей ширины за серединой, в полтора раза длиннее своей наибольшей ширины, покрыты правильными рядами точек, промежутки плоские, не блестящие, морщинистые. За серединой надкрылий имеется

широкая перевязь, суженная ко шву и прерванная на нем, на которой волоски отсутствуют или становятся очень редкими, так что она выглядит голой, эта перевязь совпадает приблизительно с темными пятнами надкрылий. Все бедра с явственным зубцом. Длина 3,8—4,2 мм (без головотрубки).

♂: головотрубка толще и короче, матовая, точечная.

♀: головотрубка тоньше и длиннее, блестящая, гладкая.

Армянская ССР, Котайкский район, Гехард, 29 IV 1941 (А. А. Рихтер). Типы (3 ♂ и 4 ♀) в коллекции Зоологического Института Академии Наук Армянской ССР. Три экземпляра этого же вида имеются в коллекции Зоологического Института АН СССР в Ленинграде сбора Е. Кенига из Манглиса (Грузия).

От принадлежащих к тому же подроду видов *Br. ornatoides* Reitt. и *Br. delagrangiei* Desbr., судя по описаниям (^{1,3}), отличается наличием темной оголенной перевязи за серединой надкрылий, от *Br. elongatulus* Boh. тем же признаком, большей величиной, более темной окраской и отсутствием белой узкой перевязи за серединой надкрылий.

Зоологический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1946, январь.

Մ. Է. ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Bradybatus Germ. սեռին սլավոնոզ մի նոր սեռակ հայաստանում
(Coleoptera, Curculionidae)

Գեղարդի շրջակայքի վայրի պտղատուների միջատների ֆաունան ուսումնասիրելու ընթացքում, բզեզներ էին հավաքված նաև այլ ծառերից. այդ բզեզների մեջ կար *Bradybatus* Germ. սեռին պտղատու մի նոր տեսակ ծաղկած Թղկիներից (*Acer campestre* L.). Այդ տեսակի նկարագրությունը բերված է ներկա աշխատանքում:

M. E. Ter-Minassian

A New *Bradybatus* from Armenia (Coleoptera, Curculionidae)

Description

Bradybatus grandis sp. nov.

Body large, ovale, reddish-brown, or head, apex of rostrum, pronotum, a large spot at the middle of elytra, and metasternum black, covered with rather thick, light scalelike hairs. Male rostrum nearly equal to the length of pronotum, the female one slightly longer, densely and finely punctate. The pronotum at base bisinuate, of equal width to the elytra, strongly narrowed forwards, constricted at the fore margin, with the double puncture: dense and large and very fine one. Elytra widened behind the shoulders, return oviform, the most width occurs behind the middle, one and a half longer than broad, covered with regular puncture rows. Interstriae flat, lustreless, rugose. Behind the middle there are a broad bare band narrowed to the suture and interrupted there, overlapping the dark spots of elytra. All the femora with well marked tooth. Length 3,8—4,2 mm (without rostrum).

Male: rostrum thicker and shorter, lustreless, densely punctured.

Female: rostrum thinner, longer, shining scarcely punctured.

Armenia, Kotaik district, Geghard, 29 IV 1941 (A. Richter leg.), on a flowering maple *Acer campestre* L. 3 male and 4 female specimens in the collections of the Zoological Institute of Academy of Sciences of Armenian SSR in Erewan. There are also three specimens in the collections of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of USSR in Leningrad from Manglis, Georgia (E. König leg.).

This species belongs to the subg. *Nothops* Bed. (*Pseudomorphus* Desbr.), differing from *Br. ornatoides* Reitt. and *Br. delagrangi* Desbr. (according to the descriptions) by the presence of obscure bare transverse band behind the middle of elytra, from the European *Br. elongatulus* Boh. differs by the same character, by the larger size, obscure coloration, and absence of a narrow white transverse hairy band behind the middle of elytra.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Desbrochers des Loges, Frelon, 4, 1895:82;
2. K. Penecke. Wien. Entom. Zeitg., 43, 1926, 1:1—6.
3. E. Reitter. Deut. Entom. Zeitschr. 1898:354—355.