Н. Н. Акрамовский

Зоогеографические заметки (1—2)

(Представлено В. О. Гулканяном 8 VII 1946)

1. *Oligodon melanocephalus satunini* (Nikolsky) (Ophidia, Colubridae)
из окрестностей Еревана

Черноголовый олигодон—редкая змея. В Советском Союзе он был найден всего трижды: Мегри, Ордубад, долина Аракса. Все известные из наших пределов экземпляры не превышают величиной 200 мм. Вне наших границ подвид отмечен для Аданы (юго-восток Малой Азии) и из провинции Фарс (Иран) (1,2). Типичный подвид живет в Сирии и Палестине. Таким образом черноголовый олигодон—переднеазиатский эндемик.

23 V 1942 в ближайших окрестностях Еревана, к северу от пруда Комсомоли-лич, на выходах гипса в полынной полупустыне, переворачивая камни, я поймал один экземпляр этой змейки. Живая змейка имела характерный черный рисунок головы; туловище было сверху интенсивного темно-оранжевого цвета с оттенком бурого. Привожу промеры: длина туловища 310 мм; длина хвоста 68 мм; индекс «длина туловища: длина хвоста» 4,6; 225 брюшных щитков; анальный щиток разделен; 64 пары подхвостовых щитков; 7 верхнегубных щитков; височных щитков в первом ряду 1, во втором 2.

Итак, это самая крупная известная из Советского Союза особь и самое северное местонахождение подвида и вида. Наша находка указывает на то, что черноголовый олигодон живет в полупустыне. Экземпляр передан на хранение в Зоологический институт Академии Наук Армянской ССР.

2. *Anguis fragilis* L. (Lacertilia, Anguinae) недалеко от Еревана

Веретенница ломкая—вид, приуроченный главным образом к лесной зоне Европы. Терентьев и Чернов (3) следующим образом характеризуют его ареал: «Алжир, Европа и западная Азия до северного Ирана включительно. Северная граница с 64° с. ш. на Скандинавском полуострове спускается, примерно, до 61° в восточной части ареала.

На восток, видимо, до 61° в. д. В Крыму, на северном побережье Каспия и в Средней Азии отсутствует." В Армении вид известен из северной, лесной ее части. Самое южное указанное в литературе местонахождение — сел. Севан (1).

25 VII 1942 мне удалось поймать один экземпляр веретенницы в ущелье реки Азат, около монастыря Гегарт (40°08' с. ш., 44°48' в. д., 1900 м над ур. м., 24 км к в. от Еревана) на северном, покрытом деревьями и кустарником склоне под увядшими и упавшими на землю травянистыми растениями. Эта находка уточняет южную границу вида в Армении. Она показывает также, что типичные лесные формы проникают в долину реки Аракса, встречаясь здесь спорадично по подходящим местообитаниям, попадающим кое-где в верхнем течении горных речек. Таким же распространением обладает, например, наземный моллюск *Helix lucorum*, L., точно также свойственный лесной зоне и найденный в Гегарте (2).

В настоящее время лесные виды, в особенности такие мало подвижные как моллюски, не могли бы проникнуть на юго-западные склоны Агмаганского Хребта. Сейчас нет путей, которые могли бы использовать эти виды для распространения в юго-восточную Армению. Это произошло ранее. Мы знаем, что еще в историческое время леса имели более широкое распространение (3, 5). Современные остатки лесов на южных склонах, ограничивающих с севера Ереванскую равнину, очевидно были связаны тогда с лесными массивами северной Армении. На лесные виды, встречающиеся в островных местонахождениях на склонах Ереванской равнины вне своих основных ареалов, можно смотреть как на реликты недавнего прошлого.

Зоологический институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1946, июнь.

Ն. Ն. ԱՎՐԱՍՏՈՎՍԿԻ

Կենդանաբանական գիտությունների ակադեմիայի Գիտությունների Գործադիր Կոմիտեի Կենտրոնի Գիտությունների Կոմիտեի Կողմից

1. Երևանի շրջակայքում, համաստի լճի մոտ, օչրնդրային կիսաանապատում՝ գիպսի ելքի վրա, գտնված էր սևագլուխ օչրնդրոն (սղոսկուկ): Այդ օձը հայտնի էր Սովետական Միության սահմաններում միայն Մեղրուց և Օրդուբադից: Մյուս կենթատեսակն ապրում է Փոքր Ասիայի հարավ-արևելյան մասում, Ֆարսում (Իրան): Այդ տեսակը Առաջավոր Ասիայի համար էնդեմիկ է ճանդիտանում:

2. Սղոսկուկը գտնված է Գեղարդի վանքի մոտ, թփերով ու ծառերով ծածկված ձորում: Մինչև այժմ այդ տեսակը հայտնի էր Սևան քաղաքից ափելի հյուսիս: Այդ տեսակը հասակ է Սվրոպայի անտառոտ մասերին: Մեզ մտ սովորական է Հայաստանի հյուսիսային մասերում:

Հարավ-արևմտյան Հայաստանի երկարացած անտառների կղզիները այժմ բաժանված են հյուսիսային Հայաստանի մեծ անտառներից: Բայց հայտնի է, որ հնում Հայաստանում անտառներն ափելի լայն էին տարածված, երբ, ըստ երևույթի, անտառային տե-

սակներն ունեցել են ամբողջական արեալ, զբավելով հյուսիսային և հարավային Հայաստանում որոշ մասերու Հետեապետ, հարավային Հայաստանում մեկուսացած և հազարագած անտառոտ վայրերում այժմ ապրող տեսակները կարող են դիտվել որպես մոտիկ անցյալի ակիկտիբեր:

N. N. Akramovskij

Zoogeographical Notes

1. *Oligodon melanocephalus satunini* (Nikolsky) was found in the nearest neighbourhood of Erivau. Only one specimen was caught in the Artemisia semidesert on the gypsum outcrops. The living snake had the characteristic design of the head and the upper part of the body of intensive dark orange colour.

2. *Anguis fragilis* L. was found in a gorge covered by the trees and the bushes 24 km eastwards Erivan. The chief part of its area in Armenia is the wooded northern districts. The insular degraded groves in southwestern Armenia have been separated from the woody massifs of northern Armenia, but the woods were more widely extended in the historical time yet. Therefore we may consider the species of the woods inhabiting the insular locations in southwestern Armenia as new arisen relics.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. С. А. Чернов. АрмФАН. Зоол. сборн., вып. 1:77—194, 1939. 2. П. В. Терентьев и С. А. Чернов. Кратк. определит. пресмык. и земнов. СССР, изд. 2. Лгр., 184 стр., 1940. 3. Н. Н. Акрамовский. Ерев. Гос. Ун-т, Научн. тр., 22:255—258 (печ.). 4. А. Л. Тахтаджян. Тр. Бот. Ин. АрмФАН. 2:1—180, 1941. 5. А. К. Магакьян. Растит. Арм. ССР. Лгр., 276 стр., 1941.