

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

А. А. Колаковский

Новый вид хохлатки из Западного Кавказа

(Species nova generis *Corydalis* ex Caucaso occidentali)

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 15 VII 1946)


Corydalis Vittae n. sp. nova (Sect. *Pes-gallinaceus* Irmich)

Planta glabra, obscure viridis. Tuber sphaericum, 7—13 mm in diametro. Caulis simplex, erectus vel flexuosus, 10—20 mm altus. Folia caulina 2, tenera, longe petiolata, ambitu ovata: lamina bis vel ter pinatipartita, segmenta petiolulata, lobis in lobulos oblongas vel oblongo-lanceolatas, usque ad 18 mm longas, 2—5 mm latas, profunde incis. Racemus terminalis, laxis, 2—5-florus. Bracteae ovato-ellipticae vel ovato-rhomboideae, integre, pedicellis aequantibus vel subaequantibus. Sepala minora, ad 1 mm longa. Corollae 25—30 mm longae, ochroleucae; lamina petali integra. Calcar petali superioris rectum horizontale apice ipso deorsum incurvum. Petalum inferum non calcaratum. Stigmata reniformia, ad marginem grosse dentata. Capsulae patentes vel subdeflexae, usque ad 20 mm longae, 2—3 mm latae.

A *Corydali caucasicae* DC differt: lamina petali integra, stigmate reniformi ad marginem grosse dentato et a proximo *Corydali Alexeenkoanae*—folia obscure virentibus et bracteis integris.

Typus: Caucasus occidentalis, Abchazia, distr. Gagra, in jugo calcareo Gagry, prope m. Ach-Ag, in prato subalpino, 2200 m, 9 VII 1940. Leg.: A. Kolakovsky et Vitta Jabrova.

Растение зеленое, голое. Клубень шаровидный, 7—13 мм в диаметре, снаружи бурый. Стебель простой, иногда с веточкой, выходящей из пазухи чешуевидного листа, прямой или извилистый, 10—20 см выс. Листьев обычно 2, на черешках, равных пластинке. Пластинка листа нежная, дважды или почти трижды-тройчатая, с сегментами на длинных черешочках; доли их почти сидячие, обычно почти до основания рассеченные на продолговатые или ланцетно-продолговатые, коротко-заостренные дольки, 2—5 мм шир. и до 18 мм дл. Прицветники яйцевидно-овальные или яйцевидно-ромбические, цельнокрайние, туповатые, равны или чуть длиннее цветоножек. Кисти рыхлые, 2—5-цветко-



Объяснение к рисунку.

Corydalis Vittae A. Kolak.—a) общий вид растения, b) цветок, d) клубень, e) рыльце. *C. caucasica* DC—c) цветок, f) рыльце.

Рисунок автора.

вые. Чашелистики почти незаметные, до 1 мм дл. Венчик светло-желтый, 25—30 мм дл. Наружные лепестки с широким отгибом, цельные. Отгиб верхнего лепестка расположен под тупым углом к его шпоре; последняя довольно широкая, на конце вниз загнутая, тупая. Рыльце почковидное, по краю усаженное длинными зубцами. Коробочки отклоненные или почти повислые, около 20 мм дл. и 2—3 мм шир.

Западный Кавказ, Абхазия, Гагринский известняковый хребет, у северного подножия г. Ах-аг, на субальпийском лугу (высокотравие), 2200 м, 9 VII 1940, собр. А. Колаковский и Витта Яброва.

По форме венчика описываемый вид близок к *Corydalis Alexeenkoana* N. Busch., но отличается от него более тупым и широким отгибом верхнего и нижнего лепестков, причем отгиб верхнего лепестка расположен по отношению к его шпоре под более острым углом, а жилки по верхней линии шпоры и в месте отгиба сближены. Форма рылец такая же, как у *C. Alexeenkoana* N. Busch. Другими отличиями его являются темно-зеленый, а не сизый цвет листьев и цельные, более короткие прицветники. Вид *C. Vittae* m. представляет, повидимому, промежуточную форму, которая сочетает в себе признаки, характерные для выделенных М. Поповым рядов *Fabaceae* и *Solidae*.

Вследствие этого *C. Vittae* сближается также с *C. caucasica*—видом, описанным Де-Кандоллем в 1821 г. из лесных районов Кавказа. Им же описана довольно обычная белоцветная форма—*var. albiflora* DC. [*C. caucasica*... *floribus* .. *albidis* (DC. Syst., II 1821)]. Близкую форму к *C. caucasica* представляет также *C. Alboviana* Steup (In sched.), отличающаяся более крупным венчиком и крупным зачатком шпоры у основания нижнего лепестка.

Описываемый вид очень хорошо отличается как от типичной формы—*C. caucasica* DC., так и от ее разновидности цельным отгибом верхнего и нижнего лепестков, причем отгиб верхнего лепестка расположен по отношению к его шпоре под тупым углом, а не почти под прямым, как у *C. caucasica* DC., далее отсутствием зачатка шпоры на нижнем лепестке, мелкими чашелистиками, затем почковидными, по краю крупно-зубчатыми рыльцами и, наконец, совершенно иной экологией. В то время как *C. caucasica* DC лесное растение, *C. Vittae* m.—растение альпийское, произрастающее в луговых ценозах (высокотравие) и развивающееся вслед за тающим снегом в период пока еще не появилась другая, могущая заглушить его высокотравная или луговая растительность.

Сухуми, 1945.

Ա. Ա. ԿՈԼԱԿՈՎՍԿԻ

Անձրտաբ մի նոր տեսակ Արեւմտեան Կովկասից

Հեղինակը նկարագրում է *Corydalis* ցեղի մի նոր տեսակ, որը մոտ է մի կողմից՝ *C. Alexeenkoana*, մյուս կողմից՝ *C. caucasica* տեսակներին և համառոտում է Մ. Գուպի մեկուսացրած *Fabaceae* ու *Solidae* շարքերի համար բնորոշ հատկանիշները: Հավաքված է Գագրիի կրաքարային լեռնազարի վրա, Աբխազիայում, 1940 թվականին:

A New Species of the Crest from the West Caucasus

A new species of *Corydalis*—*C. Vittae*, belonging to the section of *Pes—gallinae* and related, from one side, to *C. Alexeenkoana* N. Busch and to *C. caucasica* DC., from the other, combining the characters, typical for series *Fabaceae* and *Solidae*, is described. The material was collected on the Gagry limestone mountain range in Abkhazia.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. N. Busch. In *Fl. cauc. crit.*, 3, v. 4, 1905. 2. Karl von Poellnitz. *Repert. Spec. novarum*, XLIV, I, 1—4, n. 111/1114, 1938. 3. М. Г. Попов. Род *Corydalis*, „Флора СССР“, 7, 1937.