

ЭНТОМОЛОГИЯ

А. В. Богачев

Новый вид рода *Cyphostethe* Mars. из долины Аракса
(Coleoptera, Tenebrionidae)

(Представлено В. О. Гулканяном 3 III 1947)

В материалах Зоологического Института Академии Наук Азербайджанской ССР имеются экземпляры чернотелок рода *Cyphostethe* Mars. (Tenebrionidae, Epiragini) нового вида из долины Аракса. Большинство Epiragini свойственно пустынной области Палеарктики (в смысле Б. П. Уварова) и обитают от Сахары до границ Монголии. Род *Cyphostethe* Mars. не составляет в этом отношении исключения, и мы видим в составе его виды и из Алжирской Сахары, и из Средней Азии, и из Кашгарии. В фауне Закавказья до сих пор не было известно никаких представителей Epiragini. Не было известно их и в прилегающих частях Ирана, Турецкой Армении и Курдистана.

Нахождение нового вида рода *Cyphostethe* Mars. в фауне долины Аракса (в Нахичеванской АССР, и вероятно в прилегающих частях Армянской ССР) аналогично нахождению многих других представителей родов, свойственных пустынной области, в тех-же местах. Напомним хотя-бы *Trigonoscelis armeniaca* Fald., *Arthrodisia* и др. из чернотелок (Tenebrionidae), обитающих в долине Аракса в Армянской ССР и Нахичеванской АССР.

Ниже даны краткая определительная таблица видов рода *Cyphostethe* Mars. и описание нового вида.

Краткая определительная таблица видов.

- 1 (2). Основание надкрылий окаймлено только на внутренней половине. *C. seidlitzi* Rtt. (Таджикистан).
- 2 (1). Основание надкрылий с тонкой полной каемкой.
- 3 (4). Светло буро-желтого цвета. *C. grombczewskii* Sem. (Кашгария)
и *C. antonovi* Sem. (Ср. Азия).
- 4 (3). От темно-бурого до черного цвета.
- 5 (6). Переднегрудь ♂ с ямкой с волосками.
C. ferruginea Mars. (Алжир).
- 6 (5). Переднегрудь ♂ без ямки.

- 7 (8). Нижняя сторона головы с углубленной по бокам бороздой.
C. sahariensis Chob. (Алжир).
- 8 (7). Нижняя сторона головы с углубленной посредине бороздой.
- 9 (10). Переднеспинка уже, ее ширина немного более длины, бока слабее закруглены, надкрылья с довольно резкими рядами точек.
C. komarovi Sem. (Ср. Азия).
- 10 (9). Переднеспинка шире, поперечная, с сильно закругленными боками. Надкрылья с неявственными, часто спутанными рядами точек, более поверхностных, чем у предыдущего. Промежутки между ними немного шире, с более поверхностными, частично сглаженными точками.
C. semenovi, sp. nov.

Cyphostetha semenovi, sp. nov.

Cyphost. komarovi Sem. (Reitt.) affinis similisque, sed latior, pronoto latiore, transverso (latitudine sua fere duplo longiore) lateribus valde rotundatis, elytris indistincte, confuse, irregulariter, tenuiter seriatopunctatis, interstitiis punctis evanescentibus laxe obsitis.

Продолговатый, в 2,5 раза длиннее своей ширины, черный, почти матовый. Усики заходят за середину переднеспинки, с толстыми, почти квадратными члениками. Третий членик равен двум следующим, вместе взятым. Голова продолговатая. Головной щиток закругленный, выпуклый, мелко негусто пунктированный, так же как и лоб. Около края глаз проходят тонкие кили. Снизу за подбородком резкое поперечное вдавление, более глубокое посредине.

Переднеспинка почти вдвое шире своей длины, наибольшей ширины почти посредине, с сильно закругленными боками, почти прямым передним краем и задним с двумя неглубокими вырезками. Задние углы тупые, но явственные, передние закругленные. Задний край с явственной каемкой, боковые с более тонкой, но резкой каемкой, на переднем каемка посредине сглажена. Переднеспинка выпуклая почти равномерно до краев, густо мелко пунктированная, с намеченной средней линией.

Надкрылья немного шире переднеспинки, с выдающимися плечами, наибольшей ширины недалеко за плечами и почти равной ширины до середины, затем постепенно суживающиеся; почти вдвое длиннее своей ширины, равномерно, но не сильно выпуклые, с полностью окаймленным основанием, сверху со слабо выраженными, частью спутанными рядами довольно нежных точек и более нежными, частью сглаженными и редкими точками в промежутках. Эпиплевры узкие. Проплевры и грудь в густых, брюшко в более редких точках. Ноги довольно короткие, тонкие, задние короче надкрылий.

Длина 8,4—8,6 мм, ширина 3,4—3,5 мм.

Коллекционный материал: Нахичеванская АССР, Баш-Норашен,

9 VI 1924. (Типы 2 экз. в колл. Зоологического Института АН Азербайджанской ССР).

Посвящается памяти покойного крупнейшего советского зоогеографа и энтомолога А. П. Семенова-Тян-Шанского.

Зоологический Институт
Академии Наук Азерб. ССР
Баку, 1947, февраль.

Ա. Վ. ՔՈԳԱՅՈՎ

Cyphostethē սեռի նոր սեռակ Աբախի հովտից

Այս հոդվածում հեղինակը տալիս է *Cyphostethē* սեռի տեսակների համառոտ քննարկում և նկարագրում է այս սեռին պատկանող մի նոր սեռակ Աբախի հովտից (Բաշ-Նորաշեն, Նախիջևանի ԱԾՍՌ)—*Cyphostethē semenovi* sp. nov.