

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Д. И. Сосновский

Новый вид р. *Stellera* из Армении

(Представлено 15 VIII 1947)

До сравнительно недавнего времени для Кавказа было указано два представителя р. *Stellera* (Gmel.) L. Один из них—*St. Lessertii* С. А. М., указанный во Флоре Востока Буассье (1) для окрестностей Батуми, несомненно, приведен по ошибке, по крайней мере для данного местонахождения.*

Единственно достоверным видом для Кавказа оставался тот, который был описан Буассье в том же труде под именем *St. altaica* var. *minor* Boiss. Эта форма, как выяснили исследования Е. Г. Победимовой, на самом деле представляет собою самостоятельный эндемичный северо-кавказский вид. Он был описан ею под именем *St. caucasica* Pobed.

Классическим местонахождением *St. caucasica* является ущелье р. Хассаут, где это растение было впервые собрано К. А. Мейером в 1829 году (2). Спустя почти сто лет, в 1927 году А. Шукина вновь нашла *St. caucasica* в большом количестве экземпляров: „в верхних частях склонов ксерофитных котловин по Чегему, притом исключительно на известняках“ (3).

При изучении гербария, собранного во время паспортизации пастбищ Арм. ССР, любезно предоставленного в наше распоряжение А. К. Магакьяном, нам удалось обнаружить в нем экземпляры *Stellera*, собранные в Микоянском районе близ с. Гнишик, а также и на г. Капутджух.


По сообщению акад. А. А. Гроссгейма, это же растение было обнаружено им во время экспедиции текущего года в Нах. АССР в местности Каракуш (Карачут).

В результате пристального исследования экземпляров из коллекции А. К. Магакьяна выяснилось, что мы имеем дело с особым само-

* В текущем году нам удалось обнаружить несомненные экземпляры *Stellera Lessertii* в сборах Д. Церетели из Ирана (между Хамаданом и Биджаром), хранящихся в Гос. Музее Грузии.

стоятельным видом рода *Stellera*, который мы и решаемся описать в настоящей заметке под именем *St. Magakjani* D. Sosn.

А. А. Гроссгейм, заинтересовавшись этим видом, произвел сравнительное исследование собранных им экземпляров *St. Magakjani* с хранящимися в гербарии БИН СССР экземплярами *St. caucasica* Pobed., а также с экземплярами *St. turcomanica* E. Tschern., описанными Черняковской с Копет-дага (3). Результаты этого сравнения были нам сообщены А. А. Гроссгеймом, за что мы приносим ему нашу живейшую благодарность. Помимо того, мы имели возможность сравнить нашу форму с экземплярами *Stellera altaica* Thieb., хранящимися в гербарии Института Ботаники АН Груз. ССР. Ниже мы помещаем описание нашего нового вида



Stellera Magakjani D. Sosn. sp. nova.

- а) Внешний вид вевчика с просвечивающими тычинками
 б) Венчик в развернутом виде.
 в) Пестик.

Stellera Magakjani D. Sosn. sp. n.

(Sect. *Chamaestellera* C. A. M.)

Basi suffruticosa, caulibus numerosis basi lignosis erectis simplicibus virgatis 12—13 cm altis crebre foliosis; folia sessilia elliptica 8—9 mm longa, 2 mm lata utrinque attenuata, margine subrevoluta sparsissime cillato-pilosa vel glabra. Flores lutei manifeste capitati sessiles erecti, receptaculo infundibuliformi tubuloso, perigonii lobi ovati acutiusculi, 3—4 mm longi, 1—1,5 mm lati, receptaculo subduplo breviores, stigma depresso-globosum, ovarium apice pilosum, gynophoro intus cavo ovario subaequilato insidens, squamula hypogyna brevi inaequaliter subbiloba ovarii basin cingente. Fructus ignotus.

Habitat in Armenia meridionali et in prov. Nakhitchevan.

Typus: Arm. S. S. R. Distr. Mikojan in loco „Kaja-dere“ in pascuis p. Gnishik, in declivis (declivis) N. E. 15. VI. 40. Leg. A. Magakjan.

In m-tis Kaputdzhukh declivis occiden talibus. 2300 m supra mare. 15. VII. 44. A. Magakjan.

Azerbajdzh. S. S. R. Resp. Nakhitchevan. In m-te Karakush (Karakzut). 1947. A. Grosshelm comm.

St. caucasicae Pobed. proxima sed ab ea receptaculo breviori perigonii lobis longioribus stigmatе vix depresso gynophori ac squamulae hypogynae forma differt. Ab affini *St. altaica* Thieb. statura minori, receptaculo breviori pilosiusculo nec glaberrimo inflorescentiaque abbreviata capitata sat bene differt.

A. *St. turcomanica* Tschern. perigonii lobis latioribus brevioribusque et foliorum forma differt atque inflorescentia subcapitata.

Speciem hanc rarissimam amico et discipulo meo florum armenicae scrutatori diligentissimo prof. A. Magakjano dedicamus.

Настоящая находка представляет исключительный ботанико-географический интерес, т. к. она лишний раз указывает на наличие прочных связей между флорами Кавказа и Сибири. Напомним хотя бы о близости кавказского рододендрона к сибирскому *Rhododendron chrysanthum*, о наличии некоторых корреспондирующих форм из сем. зонтичных, как напр. *Bupleurum Sosnowskyi* J. Mand. и *B. flexuosum* Ledb., возможных сибирских истоков происхождения населяющих Кавказ видов р. *Oxytropis*, а также ряда тому подобных фактов. Вместе с тем мы имеем в руках несомненные доказательства того, что это сибирское влияние простиралось не только на Кавказ, но распространялось также на южную Армению и северный Иран.*

Помимо того, мы лишний раз убеждаемся в том, какое количество интересного и ценного флористического материала может дать дальнейшее исследование г. Капутджух.

Невольно приходит в голову мысль о том, что такая форма, как *Soldanella armena* Lipsky, которая некоторыми исследователями низводилась на степень ботанической мистификации, на самом деле все же реально существует в природе и когда-либо вновь будет найдена при изучении растительности г. Капутджух ранней весной.

Тбилиси, 1947, июль.

* Иранская форма р. *Stellera* была отнесена Буассье (*) к той же разновидности *St. altaica* var. *minor* Boiss., что и северо-кавказская форма. По сообщению А. А. Гроссгейма иранская форма в систематическом отношении стоит ближе к среднеазиатскому виду *St. turcomanica* Czern. (*).

Stellera ցեղին սրահաճող մի նոր հեռակ հայտնաբերում

Հեղինակը նկարագրում է *Stellera* Magakjani D. Sosn. sp. n. մի նոր տեսակ, որ
 Հ. Կ. Մազարյանը հավաքել է Կապու-Չուխի լեռն վրա և Միկոյանի շրջանում (Գնդիկ գյու-
 ղի մոտ)։ *Stellera* ցեղը ընդհանրապես առաջին անգամ է բերվում Հայկական ՍՍԻ-ի համար։

ЛИТЕРАТУРА

1. Д. И. Сосновский. Thymelaceae in Flora cauc. сит. III, г. Юрьев. 2. Е. Г. Чер-
 няковская. Новые данные для флоры Туркестана и северной Персии. Изв. Гл. Бот.
 Сада СССР, 29, вып. 1—2. Ленинград, 1931. 3. А. Щукина. К ботанич карте горной
 части бассейна Чегема. Землеведение, 30, вып. III. Москва, 1928. 4. E. Boissier. Flo-
 ra orientalis etc. 4 Genevae et Basiliae. 1879. 5. С. Л. Meyer. Verzeichniss der Pflanzen
 etc. — St-Petersburg, 1831.