

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Академик А. А. Гроссгейм

Новые кавказские колокольчики

(Представлено 15 VII 1947)

1. *Campanula Charadzae* sp. nova (Sectio Medium A. DC subsectio Intermediae Fomin). — Syn.: *C. longestyla* Fomin, Fl. cauc. cr., IV, f. 6, 20 (1904) p. p.

Planta perennis parce hirta. Caules erecti vel ascendentes saepe numerosi, 20—35 cm alti parte superiori ramosi. Folia inferiora late-ovata, ovata vel ovato-lanceolata in petiolum longum attenuata caulinea oblonga sessilia superiora oblongo-lanceolata acutiuscula omnia p. m. dentato-crenulata. Flores violacei subnutantes pedunculis floribus brevioribus. Calyx subpatens.

Lacinii anguste-lanceolatis acutis corolla 3—4-plo brevioribus appendicibus valde reflexis ovato-triangularibus acutis margine revolutis et cum lacinii calycinis ciliatis. Corolla infundibuliformi-campanulata basi non inflata ca 20 mm longa ad tertiam partem lobata extus glabra ore p. m. barbata. Stylus exsertus v. subexsertus corollam aequans v. eam paulo superans stigmatibus 3 interdum 4—5. Receptaculum glaberrimum.

Hab.: in subalpinis Tuschetiae, Chevsuriae et Pschaviae.

Typus: prope p. Dzhvar-woseli, il. 13 VII 76 sub № 316 leg. G. Radde (teste Trautvetter sub *C. sibirica* v. *Hohenackeriana* Trautv.); in herbario Instituti Botanici nom. ac. V. L. Komarovii Academiae Scientiarum URSS in Leningrad conservatur.

Affinitas: differt ab *C. longestyla* Fomin caulibus brevioribus (nec 60—70 cm altis), foliis minoribus, corolla minore (nec 30 mm longa), infundibuliformi-campanulata (nec urceolato-campanulata basi inflata supra medium contracta) stylo breviorе etc.

Многолетник, рассеянно жестко-волосистый. Стебли прямые или приподнимающиеся, часто многочисленные, 20—35 см выс., в верхней части ветвистые. Нижние листья широко-овальные, овальные или овально-ланцетные, оттянутые в длинный черешок, стеблевые продолговатые, сидячие, самые верхние продолговато-ланцетные, островатые, все

б. или м. городчатые. Цветки фиолетовые, слегка поникающие или прямостоячие. Цветоножки короче цветков. Чашечка слегка оттопыренная с узко-ланцетными острыми долями, в 3—4 раза короче венчика, придатки ее вниз отогнутые, яйцевидно-треугольные, острые по краю, как и чашелистики жестко-ресничатые. Венчик ворончато-колокольчатый (при основании не вздутый), фиолетово-синий, около 20 мм дл., до одной трети дольчатый, снаружи голый, в зеве б. или м. бородатый. Столбик равен венчику или немного его превышает; рыльце трехлопастное, реже 4—5-лопастное. Цветоложе голое.

Растет в субальпийском поясе Тушетии, Хевсурии и Пшавии.

Тип, собранный Г. Радде близ с. Джвар-Возели в цвету 13 VII 76 за № 316 (определено Трауфеттером как *C. sibirica* v. *Hohepackiana* Trautv.), хранится в гербарии БИН им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде.

Отличается от *C. longestyla* Fomin более низкими стеблями (у *C. longestyla* стебли 60—70 см выс.), более мелкими листьями, менее крупным венчиком (у *C. longestyla* венчик 30 мм дл.) другой формы (у *C. longestyla* венчик кувшинчато-колокольчатый, т. е. у основания вздутый, выше чего суженный и опять расширяющийся) и более коротким столбиком (у *C. longestyla* столбик обычно сильно выдается из венчика).

Описываемый вид посвящается Анне Лукьяновне Харадзе, знатку грузинских колокольчиков.

Остается непонятным, как мог А. В. Фомин смешать с описанным им видом *C. longestyla* колокольчик, растущий в Тушетии. Правда, известные сомнения у А. В. Фомина все же были, что явствует из следующих его слов во *Flora caucasica critica*: „Так как эта форма (т. е. *C. longestyla* А. Г.) встречалась в гербариях только из Понтийской области с Черноморского побережья, то я был склонен считать и экземпляры Г. И. Радде из Тушетии (Джвари-Возели) тоже по происхождению из Понтийской области и полагал, что здесь произошла путаница в этикетках. Новые находки этого вида Н. А. Бушем в Тушетии вполне оправдали показание Г. И. Радде“. Сущность же дела заключается в том, что в субальпийском поясе Тушетии и в предгорьях Колхиды растет не один вид, а два разных вида, резко и хорошо отличающихся друг от друга морфологически, как это явствует из приведенного здесь описания.

Можно рассчитывать найти *C. Charadzae* также в нагорном Дагестане, но пока оттуда этого колокольчика в гербариях нет.

2. *Campanula Schelkownikowii* sp. nova (Sectio Medium A. DC subsectio Triloculares Boiss. series Sibiricae Fomin.).

Planta biennis (an perennis?) breviter scabrida. Caules numerosi, 20—30 cm alti ascendentes foliosi subracemoso-paniculati pauciflori. Folia inferiora spathulata cum petiolo 5—6 cm longa crenulata in petiolum longum attenuata caulinea diminuta lanceolata in petiolum brevem attenuata superiora parva sessilia lanceolata v. lineari-lanceolata acuta. Flores violaceae subnutantes longiuscule pedicellati.

Calycis lacinae lineari-lanceolatae erectae corolla 4—5-plo breviores. Appendices lineares reflexi cum calycis laciniis margine rigide ciliati. Corolla campanulata 25—30 mm longa. Stylus corolla brevior tripartitus. Capsula....

Typus: in Transcaucasia, Azerbajdzhan, in loco Chamam-tscha] ad pedem montis Ziarat in distr. Kirovabad, 1800 m, fl. 27 VI 09 leg. A. B. Schelkownikow; in herbario Instituti Botanici nom. ac. V. L. Komarovii Academiae Scientiarum URSS in Leningrad conservatur.

Differt ab omnibus speciebus seriei Sibiricae floribus magnis campanulatis (nec tubulosis v. anguste-infundibuliformibus).

— Двулетник (или многолетник?), коротко жестковато-волосистый. Стебли из одного корня многочисленные, 20—30 см выс., приподнимающиеся, облиственные, малоцветковые, заканчивающиеся кистевидной метелкой. Нижние листья лопатчатые с продолговато-обратно-ланцетной пластинкой, суженной в длинный черешок, вместе с черешком 5—6 см дл., городчатые, стеблевые уменьшенные, ланцетные, суженные в короткий черешок, верхние мелкие сидячие, ланцетные или линейно-ланцетные, острые. Цветки фиолетово-синие, слегка поникающие на тонких довольно длинных цветоножках. Доли чашечки прямые, линейно-ланцетные, в 4—5 раз короче венчика. Венчик колокольчатый, 25—30 мм дл. Столбик короче венчика, с трехлопастным рыльцем.

Собран в Азербайджане в Кировабадском районе в местности Хамам-чай у подножия г. Зиарат на выс. 1800 м в цвету 27 VI 09 А. Б. Шелковниковым. Тип хранится в гербарии БИН им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде.

Отличается от всех видов серии Sibiricae крупными цветами и более широкой колокольчатой формой венчика (у других известных видов серии Sibiricae венчик трубчато-колокольчатый или узко-ворончатый).

Описываемый колокольчик, повидимому, относится к установленной А. В. Фоминым серии Sibiricae, с представителями которой схож своими лопатчато-продолговатыми листьями, характерным опушением чашечки и ее придатков, но форма и величина венчика резко отличают его от других представителей. Вид описан нами по одному экземпляру и необходимы дальнейшие сборы его для окончательного уточнения секционной принадлежности.

Ленинград, 1947, апрель.

Ա. Ա. ԳՐՈՍՍԶԵՅՍ

Campanula ցեղի կազկառյաճ երկու ճագ անուններ

Հեղինակը նկարագրում է Campanula ցեղի երկու ճագ, կազկառյաճ անուններ: