

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Академик А. А. Гроссгейм

Новый вид *Muscari* из Закавказья и северного Ирана

(Представлено 15 IX 1947)

Muscari atropatanum sp. nova.—Syn.: *M. longipes* non Boiss. auct. cauc.—*M. longipes* v. *brevipes* A. Grossheim, Фл. Кавк., II, 176 (1940)—*M. tenuiflorum* v. *latifolium* A. Grossheim, Тр. АзОЗФАН, т. I, 51 (1933).—Ис.: А. Гроссгейм, Фл. Кавк., II, таб. 21, рис. 7 (sub *M. longipedi*) (1940).

Planta 40—70 cm alta. Bulbus magnus ad 6 cm altus, ad 5 cm latus squamis rufescentibus. Folia 3—7 latiuscule-linearia apice angustata ad 30 cm longa, 8—15 (30) mm lata. Inflorescentia elongato-conica demum cylindracea, (20—30) 50—120—flora. Pedicelli horizontaliter patentes, 2—3 (5) cm longi. Flores fertiles fusco-virides urceolato-tubulosi lobis nigrescentibus. Flores steriles numerosi longe pedicellati anguste-tubulosi violacei. Capsula trigona anguste-alata, 6—7 mm alta, ad 9 mm lata. Semina nigra, 2—3 mm longa tenuiter tuberculata.

Ha b. in Transcaucasia australi et in Atropatania iranica.

Typus: Transcaucasia, Azerbajdzhan, in steppa Mugan inter Karadonly et Alpaut, fl. 18 V 28 leg. L. I. Prilipko; in herbario Instituti Botanici nom. ac. Komarovii Academiae Scientiarum RSS Azerbajdzhanicae in Baku conservatur.

Longe differt ab *M. longipedi* Boiss. inflorescentia multiflora cylindracea pedicellis brevioribus etc.

Выс. (30) 40—70 см. Луковица крупная, до 6 см выс., до 5 см шир., с коричневыми влагалищами. Листья в числе 3—7, продолговато-линейные, книзу и кверху постепенно суженные, до 30 см дл., 8—15 (30) мм шир. Соцветие цилиндрически-пирамидальное, весьма многоцветковое, содержащее от 50 до 120 плодущих цветков (в редких случаях 20—30) и большое количество (также несколько десятков) бесплодных цветков. Цветоножки плодущих цветков при плодах 2—3 (5) см дл., горизонтально-оттопыренные. Венчик темно-коричнево-зеленоватый, трубчатый, с широкой перетяжкой выше основания, 8—9 мм дл., 2—3 (4) мм шир., с более темными зубчиками. Цветоножки

бесплодных цветков немного короче, сами цветки узкотрубчатые, интенсивно сине-фиолетовые. Коробочка трехгранная, по ребрам узкокрылатая, 6—7 мм выс., до 9 мм шир. Семена черные, 2—3 мм дл., тонко бугорчатые.

Растет в южном Закавказье и северном Иране.

Тип: Мугань, между Карадонлы и Алпаутом, цв. 18 V 28 соб. Л. И. Прилипко; хранится в гербарии БИН им. В. Л. Комарова Академии Наук Азербайджанской ССР в Баку.

Отличается от *M. longipes* Bolss. весьма многоцветковым соцветием и более короткими цветоножками.

Буассье описал свой вид *M. longipes* в 1853 году (*Diagnoses ser. I*, 13, 37) из Иудеи и Месопотамии. Позже во *Flora Orientalis*, V, 290—291 (1884) к этим экземплярам он присоединил также сборы Шовица из Сеидхоя, почему последующие авторы и стали определять южнозакавказское растение, неотличимое от экземпляров Шовица, как *M. longipes*. В 1940 году я выделил разновидность *v. brevipes*, но не распространил это название на весь южнозакавказский и североиранский материал. Между тем, в южном Закавказье и северном Иране произрастает одна единственная, хорошо очерченная форма, которая представляет особый самостоятельный вид и соответствует тому, что было мною названо *M. longipes v. brevipes*.

Хотя экземпляров из Иудеи и Месопотамии, по которым описан вид *M. longipes*, мне не удалось видеть (они отсутствуют в общем гербарии БИН им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде), описание и диагноз Буассье и в *Diagnoses*, и во *Flora Orientalis* не оставляют сомнения в том, что растение из Иудеи и Месопотамии резко отличается от нашего.

1. У *M. longipes* цветоножки при плодах 5—7 см дл., у нашего вида, как правило, 2—3 см (только в одном случае, на экземплярах, собранных А. Б. Шелковниковым близ Алпаута, цветоножки при плодах достигают 5—6 см, но это единичное явление на фоне массового развития более коротких цветоножек в 2—3 см дл.).

2. Буассье пишет о том, что высота соцветия (при плодах) у *M. longipes* почти равна его ширине, что часто бывает у представителей рода *Bellevallia*. Это дает повод Буассье сказать о своем виде: „species insignis inflorescentia Bell. ciliatae et floribus Muscarum“. Сравнить соцветие нашего вида с соцветием *Bellevallia* никак нельзя.

3. Наше растение отличается крайней многоцветковостью, чего не отмечает Буассье для *M. longipes*, этот признак настолько характерен, что Буассье не мог бы обойти его в своем описании.

4. Буассье пишет, что у *M. longipes* стерильные цветки „congestis“, „pedicellis subaequilongis suffultis“, у нашей же формы цветоножки стерильных цветков не скученные, длинные.

5. Ареал нашей формы совершенно оторван от палестинско-месопотамского ареала *M. longipes*.

Все сказанное приводит к несомненному выводу, что у нас рас-

тет не *M. longipes*, и не разновидность этого вида, а свой самостоя-
тельный вид. По внешнему виду наше растение напоминает более
пышно развитые формы европейского *M. comosum* Mill., но отличается
от него более узким и длинным околоцветником.

Ленинград—Баку, 1947, апрель.

Ա. Ա. ԳՐՈՍՄԵՅՍ

Muscari-ի մի նոր տեսակ Անդրկովկասից եվ հյուսիսային Իրանից

Հեղինակը նկարագրում է Muscari-ի մի նոր տեսակ Անդրկովկասից և հյուսիսային
Իրանից: