ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. И. Исагулянц, действ. чл. АН Армянской ССР и А. А. Мелик-Адамян

**Изменение запаха в ряду эфиров ацетиленкарбоновых кислот
 в зависимости от положения тройной связи и строения
 углеродной цепочки. I. Синтез эфиров децин- и новин-
 карбоновых кислот**

(Представлено 16 X 1947)

Среди факторов, оказывающих влияние на запах органического соединения, как наличие осмофорных групп, положение замещающих групп, величина молекулы и т. д., наиболее важное значение имеет взаимное расположение осмофорных групп, а также местоположение двойной и тройной связей.

В литературе известно много примеров, когда изомерные вещества, отличающиеся друг от друга лишь положением замещающих групп или местоположением двойной связи, обладают различными запахами. Например, гераниол и линалоол, являющиеся спиртами терпенового ряда, с двумя двойными связями, но с различным расположением последних, обладают совершенно различными запахами: гераниол пахнет геранью, а линалоол — ландышем. Часто перемещение двойной связи внутри молекулы приводит к полному изменению, а иногда и исчезновению запаха.

Все, сказанное относительно двойной связи, может быть отнесено и к тройной связи. Следует отметить, однако, что влияние тройной связи на изменение запаха изучено совершенно недостаточно. Среди органических соединений, содержащих тройную связь, в качестве душистых веществ известны только эфиры ацетиленкарбоновых кислот, содержащих в молекуле от 8 до 11 углеродных атомов. Причем, в описанных объектах, тройная связь находится в положении I по отношению к карбоксилу.

В промежутке от C_7 до C_{11} в литературе описано лишь 9 кислот и 19 соответствующих эфиров, а именно:

- 1) гептинкарбоновая — $CH_3(CH_2)_4C \equiv CCOOH$,
- 2) октинкарбоновая — $CH_3(CH_2)_5C \equiv CCOOH$,
- 3) 2-метилгексин-5-карбоновая — $CH_3CH(CH_2)_4C \equiv CCOOH$,

мещали оба водорода ацетоуксусного эфира на изоамиловый и аллиловый радикалы, действуя в первом случае изоамилбромидом, а во втором — аллилбромидом на натриевое производное ацетоуксусного эфира. В ряде опытов вместо ожидаемого двузамещенного ацетоуксусного эфира получались продукты его расщепления, кипящие значительно ниже (до 100—110°/12 мм). Было установлено, что причиной, вызывающей расщепление молекулы, была обработка реакционной смеси водой (с целью выделения плохо растворяющегося в ней эфира). Во всех случаях выделения продукта без помощи воды (путем отделения осадка отсасыванием и последующей разгонкой), расщепление двузамещенных ацетоуксусных эфиров не наблюдалось. Полученный изоамилаллилацетоуксусный эфир подвергался кислотному расщеплению действием спиртоводного раствора едкого кали:

Образующаяся калиевая соль изоамилаллилуksусной кислоты разлагалась слабой соляной кислотой и выделенная ненасыщенная кислота подвергалась бромированию в среде четыреххлористого углерода. Путем действия спиртовым раствором едкого кали, от бромида были отняты 2 молекулы HBr:

в результате чего была получена изонониякислотная кислота (изоамилбутинкислотная кислота). Этерификация этой ацетилкислотной кислоты проводилась, как обычно, — нагреванием с соответствующим спиртом (в нашей работе — метиловым) в присутствии крепкой серной кислоты:

Аналогичным методом, с той только разницей, что вместо аллилбромида был взят другой непредельный галогеналкил, а именно — 1,3-дихлорбутен-2 (удобный еще тем, что он содержит уже галонд при двойной связи и тем самым избавляет от бромирования в стадии после кислотного расщепления), нами была получена изодецилкарбонная (изоамилпентинкарбонная) кислота и ее метиловый эфир

Обе ацетиленкарбонные кислоты, их метиловые эфиры, а также и

№ п. п.	Название и формула	Брутто формула	Мол. вес	Темпер. плавления °С	Темпер. кипения °С	Остаточ. давл. в мм Нг
1	Изоамилацетиленуксусный эфир $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2-\text{CO}-\text{C}-\text{COOC}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	$\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{O}_2$	240	—	97—100	3
2	Изоамила-γ-хлоруксусный эфир $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CCl}-\text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_2-\text{CO}-\text{C}-\text{COOC}_2\text{H}_5 \\ \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	$\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{Cl}$	288,5	—	169—170	19
3	Изононинкарбоновая кислота $\begin{array}{c} \text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$	168	—	149—150	4
4	Изодецинкарбоновая кислота $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	$\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$	182	—	145—146	6
5	Децинкарбоновая кислота $\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	$\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$	182	40—41	146—148	4
6	Метил эфир изононинкарбоновой кислоты $\begin{array}{c} \text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOCH}_3 \\ \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	$\text{C}_{11}\text{H}_{18}\text{O}_2$	182	—	115—118	3
7	Метил эфир изодецинкарбоновой кислоты $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOCH}_3 \\ \\ \text{C}_5\text{H}_{11} \end{array}$	$\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$	196	—	113—114	9
8	Метил эфир децинкарбоновой кислоты $\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_8\text{COOCH}_3$	$\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{O}_2$	196	—	113—114	4

Все указанные в таблице вещества, кроме децинкарбоновой кислоты, получены Крафтом. описываются впервые.

спектр, их эфиров и некоторых промежуточных веществ

d_s	n_d	MR найд.	MR вычисл.	Элементарный анализ					
				галонд		найдено		вычислено	
				найдено по Карису	вычисл.	С	Н	С	Н
$d_s^{16} = 0,9552$	$n_d^{16} = 1,4492$	67,86	69,05	—	—	70,03	10,09	70,00	10,08
$d_s^{16} = 1,0187$	$n_d^{16} = 1,4603$	77,57	77,53	12,19	12,90	—	—	—	—
$d_s^{16} = 0,996$	$n_d^{16} = 1,4630$	47,41	47,91	—	—	70,2	10,01	71,4	9,57
$d_s^{16} = 0,9588$	$n_d^{16} = 1,4600$	52,30	52,66	—	—	70,85	9,81	72,5	9,91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$d_s^{20} = 0,954$	$n_d^{20} = 1,4485$	52,39	52,85	—	—	—	—	—	—
$d_s^{20} = 0,924$	$n_d^{20} = 1,4468$	57,13	57,27	—	—	—	—	—	—
$d_s^{20} = 0,917$	$n_d^{20} = 1,4412$	56,99	57,27	—	—	72,4	9,92	73,4	10,2

промежуточные продукты — двузамещенные ацетоуксусные эфиры в литературе до сих пор описаны не были.

Желая иметь для сравнения эфир кислоты с тройной связью в наиболее удаленном от карбоксила положении, нами была повторена работа Крафта (4) по получению дегидроундециленовой (9-децинкарбоновой) кислоты, а также получен ее метиловый эфир:

который ни Крафтом, ни другими исследователями получен не был. (Крафт получил лишь этиловый эфир и из его свойств указал только температуру кипения).

Все полученные метиловые эфиры трех упомянутых ацетиленкарбоновых кислот обладают запахом. В то время, как эфир дегидроундециленовой кислоты обладает фруктовым запахом, напоминающим запах эфиров кислот жирного ряда нормального строения, запах метиловых эфиров двух других ацетиленкарбоновых кислот резко отличается от запаха первого эфира. Они обладают ярко выраженным цветочно-медовым запахом. Как и следовало ожидать, запах эфира изононинкарбоновой кислоты более интенсивен по сравнению с запахом эфира изодецинкарбоновой кислоты, хотя они и имеют почти одинаковую структуру; интенсивность запаха эфира изононинкарбоновой кислоты объясняется меньшим молекулярным весом.

Как известно, эфиры ацетиленкарбоновых кислот, описанные ранее (2), где тройная связь находится в положении I по отношению к карбоксилу, обладают запахом свежести, подобным запаху зеленых листьев фиалки. Весьма интересно отметить, что в синтезированных двух новых эфирах сохраняется цветочный запах, когда тройная связь удалена до положения 3. Если же при одном и том же числе C-атомов тройная связь в молекуле удалена до положения 9, то эфир обладает запахом фруктовым, очень похожим на запах эфиров жирных кислот нормального строения.

Исследования продолжаются в различных направлениях.

Академия Наук Армянской ССР
Ереван, 1947, сентябрь.

Վ. Ի. ԻՍԱԳՈՒԼՅԱՆԵ ԵՎ Ա. Ա. ՄԵԼԻՔ-ԱՅԱՍՅԱՆ

Հասի փոփոխութիւններ ացետիլենկարբոնաթթուների էրեդների ստրուկտուրայի հասկի գիրքի եվ արտածնային օգրայի կառուցվածքի կապակցութիւնը,
I. Դեցիւն- եվ նոնիենկարբոնաթթուների էրեդների սիներեզ

Մշակված է, կարողութիւն նկատմամբ 3 գիրքում եւսակի կապով հանդերձ, ացետիլենկարբոնաթթուների և նրանց էթերների ստացման նոր մեթոդ, վերջինս հիմնված է ացետոքսոնաթթվային սինթեզի վրա՝ ացետոքսոնաթթվային էթերի մոլեկուլի մեջ մտնելով հազեցած և ոչ հազեցած հալոգենալիլներ, այնուհետև՝ երկտեղակալված ացետոքսոնաթթվական էթերի թթվային ճեղքումով, ստացված ոչ հազեցած թթվի կրկն-էրեդի հազեցմամբ բրումով և կծու կալիումի ազդեցութիւնը HBr-ի երկու մոլեկուլների պակասով:

Ստացված են գրականութան մեջ չնկարագրված իզոնոնինկարբոնաթթու (իզոամփրուտինկարբոնաթթու), իզոդեցինկարբոնաթթու (իզոամփրուտինկարբոնաթթու) և նրանց մեթիլային էթերները, 9-գեցինկարբոնաթթվի (գեհիդրոունդեցիլենաթթվի) մեթիլային էթեր, ինչպես նաև, որպես միջանկյալ պրոդուկտներ, իզոամփրուտիլացետաթթվի և իզոամփրուտիլացետաթթվի էթերներ:

Այդտիպիկարբոնաթթուների ստացված բոլոր երեք էթերներն էլ անուշահոտ են: Գեհիդրոունդեցիլենաթթվի մեթիլային էթերն ունի մրգի հոտ, որը միանգամայն նման է նորմալ կառուցվածք ունեցող ճարպային շաբբի թթուների էթերների հոտին, իսկ իզոնոնին և իզոդեցինկարբոնաթթուների էթերներն ունեն ծաղկա-մեղրային հոտ: Ընդ որում իզոնոնինկարբոնաթթվի էթերների հոտն ավելի ինտենսիվ է, քան իզոդեցինկարբոնաթթվի էթերի հոտը, որ բացատրվում է ավելի փոքր մոլեկուլար քաշով: Նախկինում նկարագրված ցետիլենկարբոնաթթուների էթերները, որոնց եռակի կապը գտնվում է կարբոքսիլի նըկամամբ 1 դիրքում, ունեն թարմության, մանուշակի կանաչ տերևների հոտի նման հոտ: Հետաքրքրական է նկատել, որ սինթեզված երկու նոր էթերների մեջ, եռակի կապը 3-դիրքը տեղաշարժելու գեպքում, ծաղկային հոտը պահպանվում է, բայց եռակի կապը մինչև 9 դիրքը տեղաշարժվելու և ամիտոնային առումների նույն թիվը պահպանելու գեպքում, էթերն ստանում է մրգի հոտ, որը նման է նորմալ կառուցվածք ունեցող ճարպային թթուների էթերների հոտին:

ЛИТЕРАТУРА

1. D. R. P. № 132802. 2. Moureu, Delange. В (3) 23, 618. 3. Фаворский и Е. Опель. ЖРФХО, 50, 74, 1918. 4. F. Krafft. В 29, 2233. 5. Welander. В 28, 1448.
6. Г. Т. Татевосян и Е. Т. Бабаян. ДАН Арм. ССР, 6, № 2, 1917. 7. Moureu, Delange. В (3), 31, 583. 8. D. R. P. № 158252. 9. В. И. Исагулянц. „Святетические душистые вещества“, Гизлегпром, 1936.