

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Академик А. А. Гроссгейм

Новый вид лютика из Армении

(Представлено 5 I 1948)

Ranunculus Aragazii sp. nova (Subg. *Chrysanthé* Spach). — *Planta perennis*, 2—4 *cm* alta glabra. *Rhizoma abbreviatum*. *Radices* tenues fasciculati. *Caullis* uniflorus. *Folia* radicalia 2—3, p. m. longe petiolata, lamina 1.5—2(3) *cm* longa ambitu late triangulari=ovata, profunde usque ad basin tripartita segmentis linearibus tripartitis v. trilobis v. tridentatis lobis acutis; rarius folia subpinnata segmento medio pedunculato. *Folia* caulina 1—2 sessilia 3—5 partita. *Sepala* horizontalia petalis duplo breviora. *Petala* late—obovata supra lutea basi flavo—maculata. *Carpella*

Hab. in regione alpina (2800—3500 *m*) montis Aragaz (olim Alagez) in Armenia.

Typus: Armenia, in m-te Aragaz in faucibus Gecharot (Dalitschaj), 2800 *m*, 20 VII 1932 fl. leg. E. et N. Busch; in Herb. Inst. bot. nom. ac. V. L. Komarovii Ac. Sc. URSS in Leningrad conservatur.

Affinis *R. merovensi* A. Grossh. sed differt statura humilliori, caulo unifloro, foliis tripartitis (nec pinnatis), petalorum macula flava (*R. merovensis* petalam concoloram habet).

Многолетнее, маленькое, голое растение, 2—4 см выс. Корневище укороченное, основание стебля окутано сеткой из влагалищ старых листьев. Корни тонкие, пучком. Стебель одноцветковый. Прикорневые листья в числе 2—3, на б. или м. длинных черешках, с пластинкой 1.5—2 (3) см дл., в очертании широко-овально-треугольные, глубоко, почти до основания рассеченные на три сегмента; сегменты линейные, в свою очередь рассеченные на три дольки, или же трехлопастные или трехзубчатые с острыми дольками; редко листья почти перистые, так как в этом случае средний сегмент сидит на явственном черешочке 4—5 мм дл. Стеблевые листья в числе 1—2, сидячие. 3—5-раздельные на тонкие дольки. Цветок одиночный, 15—20 (до 30) мм в диаметре. Наружные листочки околоцветника горизонтально распростерты, прижатые, вдвое короче внутренних. Внутренние листочки широко обратно-яйцевидные, золотисто-желтые, с верхней стороны в нижней части с ржаво-желтым пятном. Семянки ...

Растет в альпийском и нивальном поясе (2800—3500 м) горы Арагац (Алагёз) в Армении.

Тип, собранный на г. Арагац в ущелье Гехарот (Дали-чай) на выс. 2800 м на альпийских лугах 20 VII 1932 в цвету Е. и Н. Буш, хранится в гербарии БИН им. В. Л. Комарова АН СССР в Ленинграде.

Близок к *R. megovensis* A. Grossh., но отличается незначительным ростом, всегда одноцветковым стеблем, листьями трехрассеченными (у *R. megovensis* листья doubly перистые) и присутствием ржаво-желтого пятна на верхней стороне внутренних листочков околоцветника (у *R. megovensis* внутренние листочки околоцветника сверху сплошь золотисто-желтые, без пятна).



Ranunculus Aragazii A. Grossh.
(натуральная величина)

Описываемый здесь вид, судя по следам оставленным в гербарии, уже намечался П. Н. Овчинниковым к описанию при обработке им рода *Ranunculus* для „Флоры СССР“, но впоследствии П. Н. Овчинников, повидимому, отказался от этого вида и описание его не появилось. Между тем, данное растение несомненно представляет самостоятельный, высокогорный вид, относительно близкий к тоже высокогорному *R. megovensis*. Надо полагать, что

распространение *R. Aragazii* не ограничивается одним Арагацом и в дальнейшем он будет обнаружен и на других высоких вершинах южного Закавказья.

Впервые вид этот был собран на Арагаце Радде еще в 1875 году; Траутфеттер, который видел эти экземпляры, не решился их определить, но позднее Н. А. Буш неправильно определял их как *R. parvifolius* DC. Этот последний западно-малоазиатский вид, на Кавказе вовсе не встречающийся, резко отличается от описываемого здесь своими крупными doubly перистыми листьями и рядом других признаков.

Ленинград, 1947, декабрь.

Ա. Ա. ԳՐՈՍՍԶԵՅՍ

Պրոգնոզիկ ցեղի մի ետ անուկ Հայաստանից

Հեղինակը նկարագրում է զորանուկ ցեղի մի նոր տեսակ Արագած լեռան ալպյան գոտից: