

ЗООЛОГИЯ

Н. К. Верещагин и С. К. Даль

О распространении дикобраза в Закавказье

(Представлено В. О. Гулканяном 18 IV 1948)

Распространение дикобраза *Hystrix hirsutirostris* Brandt в Азии было characterized К. А. Сатуниным в 1920 г. следующим образом: „От Палестины она (область распространения) идет через Сирию и Малую Азию, захватывает юго-восточный угол Закавказья, всю Персию до Белуджистана на юге, Закаспийскую область и Туркестан“.

Что касается Закавказья — в пределах границ закавказских республик, то все печатные сведения о распространении дикобраза ограничивались указаниями на обитание его в Талыше.

Верещагин обнаружил, однако, в 1945 г. дикобраза высоко в верховьях Виляж-чая, близ сел. Ярдымлы, в ксероморфной и обезлесенной ныне верхней зоне Талыша. Со слов А. В. Богачева авторам было известно также, что А. Б. Шелковников в 1923 г. получил сведения о наличии дикобраза близ сел. Мегри, в теснине Аракса, а в 1929 г. Г. В. Соснину в окрестностях Мегри удалось найти в пещере пару коротких игл дикобраза.

В ноябре 1946 г. несколько коротких игл дикобраза были представлены авторам Ю. А. Абдурахмановым, получившим их из Джебраильского района Азербайджана, на южном склоне Карабахских гор. В феврале месяце 1948 г. короткие иглы дикобраза были доставлены нам А. Ханмамедовым из сел. Сарыл Кубатлинского района Азербайджана. По нашей просьбе А. Ханмамедов выяснил, что дикобразы встречаются по долине р. Акера-чай у селений Бартаз, Агали и Ребснд. Здесь зверька называют „тиряндаз“, т. е. „бросающий стрелу“. 5 ноября 1946 г. председатель РИК-а Кубатлинского района Мамедов видел ночью дикобраза, перебежавшего дорогу под огнем автомобильных фар близ сел. Мамедбеглы у речки Ходж, притока Акера-чая.

На территории Армянской ССР дикобраз был убит в 1940 г. в ближайших окрестностях Кафана.

В Зоологический Институт Академии Наук Армянской ССР от него было доставлено несколько игл (инв. № 5483). В 1944 г. пограничником Оганяном был убит дикобраз в саду у берега Аракса, в

окрестностях селения Алидара (12 км северо-восточнее Мегри, в долине реки Малев); сад, где был убит дикобраз, находится в 800—900 м от русла Аракса.

Таким образом, дикобраз хотя и редко, но несомненно встречается в ксероморфных лесах и безлесных скалистых ущельях левого склона Араксинской теснины.

Дикобраз в Закавказье является элементом ирано-малоазиатской фауны. Северная граница его ареала сдвигается к югу под влиянием истребления животного человеком. Это прослежено во всяком случае как для юго-востока Армянской ССР, так и для южной Мугани.

Зоологический Институт
Академии Наук Азербайджанской ССР
и Зоологический Институт
Академии Наук Армянской ССР
Баку—Ереван, 1948, апрель.

Ն. Կ. ՎԵՐԵՇՉՍՅԱՆ ԵՎ Ս. Կ. ԴՍԼ

Խոզուկի (*Hystrix hirsutirostris* Brandt) ստրածուժը Անդրկովկասում

Ըստ գոյություն ունեցող գրականության՝ Անդրկովկասում խոզուկը (дикобраз) հանդիպում է միայն Քալիշում, Հայկական և Ադրբեջանական Գիտությունների Ակադեմիաների հենդանարանական ինստիտուտների կողմից կատարված աշխատանքների հետևանքով վերջին ժամանակներս հաստատված է, որ խոզուկը, բացի իր հիմնական տարածման վայրից, Անդրկովկասում անդ-տեղ հանդիպում է նաև ափելի հյուսիսում և արևմուտքում: Խոզուկի հանդիպումը նշված է Ադրբեջանական ՍՍՌ-ի Զերբաիլի և Կուրաալյուի շրջանների և ափելի արևմուտք ընկած՝ Հայկական ՍՍՌ-ի Մեղրու շրջանի մի շարք վայրերում:

Ներկայումս Անդրկովկասում խոզուկը հանդիսանում է իրանա-փոքրասիական ֆաունայի ներկայացուցիչ: Նրա տարածման հյուսիսային սահմանը, մարդու կողմից ոչնչացվելու հետևանքով, շարժվում է դեպի հարավ: