

А. М. Оганджян

**О нахождении *Ixodes vespertilionis* Koch, 1844 (Acarina, Ixodidae)
в Армянской ССР**

[Представлено В. О. Гулканяном 11 VI 1949]

Клещи *Ixodes vespertilionis* Koch являются паразитами летучих мышей и в основном паразитируют на представителях рода *Rhinolophus* (Nuttall and Warburton, 1911). Распространены в Европе, север-




Рис. 1. *I. vespertilionis* Koch, насосавшаяся самка с вентральной стороны.

ном Иране, Алжире, известны также из южной Австралии (Nuttall and Warburton, 1911; Померанцев, 1946). В СССР найдены в Крыму и Туркмении (Оленев, 1931; Померанцев, 1946).

В мае 1948 г., во время экспедиции Зоологического института Академии Наук Армянской ССР в селение Ньюади Мегринского района, учениками школы было доставлено С. К. Далю 12 экземпляров летучих мышей *Rhinolophus hipposideros* Bechs. На трех из них были обнаружены одна самка и две личинки *I. vespertilionis* в хорошо сохранившемся состоянии.

Летучие мыши *Rhinolophus hipposideros* встречаются обычно в сухих местах, в скалах, на чердаках, но в сел. Ньюади они были пойманы на сенном складе, который представлял собой глинобитное помещение с плоской крышей, состоящей из бревен, переплетенных хворостом и залитых глиной. Помещение сильно затемненное и сырое. Эта микростация—по устному сообщению С. К. Даля—для *Rh. hipposideros* является необычной.

Краткое описание обнаруженной самки Ixodes vespertilionis. Щиток удлинненный; наибольшей ширины достигает в средней части. Латеральные бороздки не выражены, цервикальные хорошо выделяются на задней части щитка. Пунктировка мелкая, многочисленная. Половое отверстие находится на уровне III пары кокс. Анальная бороздка впереди анального отверстия не сходится, позади нее ветви идут параллельно друг к другу. Перитрема большая, округлая. Основание хоботка без дорзальных корнуа; поровые поля продолговатые; гипостом заостренный с $\frac{1}{4}$ рядами зубцов. Коксы без шипов. Ноги очень длинные, лапки без вздутий у вершины.

В основном наше описание самки сходится с описанием Nuttall and Warburton, отклонение имеется только в форме анальной бороздки.




Рис. 2. *I. vespertilionis* Koch, личинка, capitulum и щиток с дорзальной стороны, capitulum и коксы с вентральной стороны и лапка 3.

(По Nuttall and Warburton).

У видов, описанных Nuttall and Warburton, анальная бороздка впереди анального отверстия сходится и образует овал, на нашем же экземпляре анальная бороздка впереди анального отверстия разобщена, но края ее идут параллельно позади апуса, как у экземпляров, описанных у Nuttall and Warburton (рис. 1).

Описание личинки (рис. 2). Основание хоботка с вентральной стороны без auriculae, хоботок и пальпы сравнительно длинные. Щиток широкий со слабо намеченными цервикальными бороздками. Коксы округлые, без шипов; ноги длинные.

Описанный вид клеща для фауны Кавказа указывается впервые.

Институт фитопатологии и зоологии
Академии Наук Армянской ССР
Ереван, 1949, май.

**Հայաստանում *Ixodes vespertilionis* Koch, 1844 (Acarina, Ixodidae)
եզի հայեցողական մասին**

I. vespertilionis-ը հանդիսանում է չղջիկների պարազիտ: Տարածված է Եվրոպայում, հյուսիսային Իրանում, Ալժիրում, Ավստրալիայում: ՍՍՄ-ում նշված է Ղրիմում և Թուրքմենիստանում: Կովկասի Փառնայի համար մինչ այժմ նշված չէր: *I. vespertilionis*-ը նշվում է մեր կողմից առաջին անգամ Հայկական ՍՍՌ-ի Մեղրու շրջանի Նյուվադի գյուղից, *Rhinolophus hipposideros* Bechs. չղջիկի վրայից: Մեր հայտնաբերած էգն իր արտաքին տեսքով համապատասխանում է Nuttall and Warburton-ի կողմից նկարագրված էգին, միայն մեր ունեցած անհատի մոտ անալ ախոսը anus-ի առջևի մասում միացված չի:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. Н. О. Оленев. ДАН СССР, 14, 1927.
2. Н. О. Оленев. Паразитические клещи Ixodoidea фауны СССР. Изд. АН СССР, 1931.
3. Е. Н. Павловский. Наставления к собиранию и исследованию клещей (Ixodoidea). Из-во АН СССР.
4. Б. И. Померанцев. Клещи (сем. Ixodidae) СССР и сопредельных стран. Из-во АН СССР, 1946.
5. Nuttall a. Warburton. A Monograph of the Ixodoidea, part II, 1911.