

С. М. Хнзорян

Новый представитель семейства пластинчатоусых (Coleoptera, Scarabaeidae) из Армянской ССР—*Tanuproctus (Tetraproctus) antennatus* sp. nov.

(Представлено Г. Х. Бунятяном 4 II 1953)

Армянская ССР—Ереван—Канакер, 1 самец, 9 IV 1926 (А. Б. Шелковников). Чернобурый, блестящий, длина 9 мм, ширина 4,5 мм.

Наличник эллиптический с предглазными лопастями и слабым вдавлением посередине (рис. 1, 1), блестящий, покрыт довольно редкими крупными неглубокими точками (как у *T. ordubadense* Reitt.), отделен от лба ясным швом, лоб и темя в густых мелких точках. Усики с булавой желтые, 9-члениковые, булава 4-члениковая, короче стебелька (рис. 1, 3). Последний членик челюстных щупиков узколанцетовидный, без ямки, в нежной продольной штриховке.




Рис. 1. *Tanuproctus antennatus* sp. nov. 1—наличник (сверху); 2—большой коготок лапок; 3—левый усик.

Переднеспинка широкая, ее передние углы тупые, задние закруглены. Все края окантованы, спереди, кроме густых мельчайших ресничек, имеющих у всех видов этого рода, голая, только у передних углов, с каждой стороны, имеется несколько торчащих волосков. Задний край переднеспинки с рядом негустых, коротких прилегающих волосков. Пунктировка диска редкая и неглубокая. Щиток голый, в редких точках.

Надкрылья почти параллельные, едва расширены кзади, голые, в рассеянных точках и плоских ребрах. Низ и лапки красно-бурые, в длинных, желтых волосках. Стерниты брюшка, вдоль основания, с рядом точек, несущих длинные волоски, в остальной части, посередине голые и почти гладкие (за исключением последнего стернита, покрытого густым пунктиром по всей своей длине). Передние голени с тремя зубцами, их шпора расположена напротив второго зубца. Передние лапки самца слегка расширены, от первого до четвертого членика с обычными волосистыми щеточками, имеющимися также на 2—4-м члениках нерасширенных средних лапок. Задние лапки длинные, их второй членик много длинней первого. Коготки всех лапок расщеплены (рис. 1, 2).

В общем, этот вид напоминает *T. ordubadense*, но легко от него отличается структурой усиков, формой наличника, тупыми углами переднеспинки, а также более гладким брюшком.

Ввиду своеобразного строения усиков, этот вид мы выделяем в особый подрод: *Tetraproctus* nov., охарактеризованный 9-члениковыми усиками с 4-члениковой булавой. Тип и единственный известный представитель подрода: *T. antennatus* sp. nov.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ս. Ս. ԽՆԶՈՐՅԱՆ

**Թերթիկաբեղիկավոր բզեզների (Coleoptera, Scarabaeidae)
նոր ներկայացուցիչ Հայկական ՍՍՌ-ից,
Tanyproctus (Tetraproctus) antennatus sp. nov.**

Ա. Բ. Շելկովնիկովի կողմից Փարաբարում (Իրևանի շրջակայք) հայտնաբերված է մի յուրահատուկ բզեզ, որը պատկանում է *Tanyproctus* սեռիկառային սեռին և առանձնացված է որպես հատուկ ենթասեռ, քանի որ բեղիկի գուրգը (булава) 4 և ոչ 5 հասվածանի է: Այս տեսակը, հավանաբար, հանդիսանում է Արաքսի հովտի կիսաանապատային սուբարոպիկական հին ֆաունայի մնացորդ: