

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Хнзорян

Новый долгоносик из Арм. ССР *Curculio* (*Balanobius*) *excellens* sp. n.

(Представлено Г. Х. Бунятяном 18 IX 1953)

Арм. ССР: Гергер (Азизбековский район), 2 экз., самец и самка, на ивах вдоль реки, 22–24.V.53. Тип (самец) и паратип (самка). в колл. ЗИН АН Арм. ССР.

Черный, в черных волосках, длина 2,3 мм.

Голова черная, лоб в белых чешуйках; хоботок длинный, тонкий, кривой, более длинный и искривленный у самки, блестящий, в редкой пунктировке. Усики тонкие, прикреплены у середины хоботка, их первые три членика желтые, остальные черные. Первые два членика жгутика почти равной длины, третий в полтора раза короче второго. Переднеспинка с тремя полосами светлых чешуек, боковые полосы шире средней, ее диск в глазчатой пунктировке, промежутки между точек много меньше самих точек. Надкрылья овально сужены к вершине, черные, с Т-образным рисунком из светлых легко стирающихся чешуек, расположенных вдоль основания и шва; на шве чешуйки простираются на весь первый промежуток бороздок в основных 2/3 надкрылий. Все чешуйки верха закруглены у вершины, палочковидные, белые или желтоватые. Промежутки бороздок широкое, плоские, с тройным рядом темных волосков, бороздки узкие с рядом светлых чешуек. Весь низ и бока переднеспинки в сплошном белом покрове из круглых чешуек. Ноги длинные, узкие, черные в белых чешуйках, все бедра с острым зубцом.

Этот вид очень близок к европейскому *C. stux* F., от которого легко отличается сплошным чешуйчатым покровом низа, рисунком надкрылий, формой чешуек и их присутствием в бороздках надкрылий, наконец, желтым, а не рыжим основанием усиков. и занимает промежуточное положение между ним и *C. ochreatus* Fahrs, низ которого также полностью одет чешуйками.

Зоологический институт
 АН Армянской ССР

Ս. Մ. ԽՆՁՈՐՅԱՆ

Նոր երկարակցճիթ Հալկակաճ ՍՍՈ-ից—Curculio (Balanobius) excellens sp. n.

Հերհեր գետի ափին, նույնանուն գյուղի մոտ (Աղիդրեկովի շրջան), ուսենու վրա
հայտնաբերված է երկարակնճիթի նոր տեսակ, որը մոտ է եվրոպական տեսակին C.
crux F:

