ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

А. Л. Мнджоян, действ. чл. АН Армянской ССР, В. Г. Африкян, Г. Л. Папаян и
 А. Н. Оганесян

Исследование в области производных фурана

Сообщение IV. Некоторые 5-алкил-, арил-, аралкилоксиметил- фуран-2-карбо-
 новые кислоты и соответствующие им алкиловые эфиры

(Представлено 5. III. 1953)

Рассмотрение строения многих физиологически активных соеди-
 нений приводит к выводу, что в числе веществ природного происхож-
 дения, а также полученных синтетическим путем, большое место за-
 нимают производные органических кислот алифатического и аромати-
 ческого рядов. Из ароматических кислот в природных продуктах наи-
 более часто встречаются бензойная кислота и некоторые ее произ-
 водные.

С развитием синтеза заменителей природных продуктов, на при-
 мере многих активных препаратов, исследователи пришли к убежде-
 нию, что замена в бензойной кислоте водородов ядра на окси-, алкок-
 си-, амино-, тио- и др. группы приводит часто к повышению биологи-
 ческой активности. Поэтому с годами все более стала расширяться об-
 ласть применения замещенных бензойных кислот в различных синтезах
 физиологически активных соединений.

Наряду с бензойными, довольно широкое использование нашли
 также кислоты гетероциклического ряда, как, например, пиридин-, хи-
 нолин-, тиофен-, фуран- и прочие карбоновые кислоты. По данным ли-
 тературы фуран-2-карбоновая кислота была использована для получе-
 ния фуроильных аналогов кокаина (1), стоваина (2), эстрадиола (3) и

R	Выход в %	Температура кипения в °C	Давление в мм	M	d_4^{20}	n_D^{20}	MRD		Эмпирическая формула	Анализ в %			
							вычислено	найдено		C		H	
										вычислено	найдено	вычислено	найдено
CH ₃ —	80,0	134—135	14	170	1,1910	1,4905	40,95	41,37	C ₉ H ₁₀ O ₄	56,47	56,28	5,88	6,13
CH ₃ —CH ₂ —	83,3	119—120	4	184	1,1561	1,4858	45,72	45,56	C ₉ H ₁₂ O ₄	58,69	58,51	6,52	6,30
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	76,4	146—148	7	198	1,1482	1,4769	50,18	50,54	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	60,60	60,38	7,07	6,85
CH ₃ —CH—	67,0	186—187	6	198	1,2599	1,5060	50,18	49,74	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	60,60	60,43	7,07	7,29
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —	82,3	155—160	8	212	1,0742	1,4700	54,80	55,10	C ₁₁ H ₁₆ O ₄	62,26	62,19	7,54	7,81
CH ₃ —CH—CH ₂ —	70,0	150—155	8	212	1,0802	1,4730	54,80	55,32	C ₁₁ H ₁₆ O ₄	62,26	61,98	7,54	7,28
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —	85,8	180—185	4	226	1,0201	1,4680	59,42	61,64	C ₁₂ H ₁₈ O ₄	63,71	63,64	7,96	7,78
CH ₃ —CH—CH ₂ —CH ₂ —	70,0	168	8	226	0,9961	1,4630	59,42	62,54	C ₁₂ H ₁₈ O ₄	63,71	63,53	7,96	7,88
85,1	47—48*	—	232	—	—	—	—	C ₁₃ H ₁₂ O ₄	67,24	66,94	5,17	5,36
—CH ₂ —	71,5	205—210	6	246	1,1880	1,5420	65,06	65,24	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	68,29	68,02	5,69	5,51
—CH ₂ —CH ₂ —	62,5	210—215	7	260	1,1549	1,5420	69,68	70,93	C ₁₅ H ₁₆ O ₄	69,23	69,20	6,53	6,47

* Температура плавления.

Таблица 2

R	Выход в %	Темпера- тура плавле- ния в °С	M	Эмпирическая формула	А н а л и з в %			
					С		Н	
					вычис- лено	най- дено	вычис- лено	най- дено
CH ₃ -	72,6	65-66	156	C ₇ H ₈ O ₄	53,84	54,13	5,12	5,36
CH ₃ -CH ₂ -	75,0	55-57	170	C ₈ H ₁₀ O ₄	56,47	56,17	5,88	5,69
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -	78,3	43-44	184	C ₉ H ₁₂ O ₄	58,69	58,41	6,52	6,24
CH ₃ } CH-	71,5	45-47	184	C ₉ H ₁₂ O ₄	58,69	58,51	6,52	6,45
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	76,0	53-54	198	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	60,60	60,34	7,07	7,01
CH ₃ } CH-CH ₂ -	76,3	58	198	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	60,60	60,41	7,07	6,86
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -	82,9	69-70	212	C ₁₁ H ₁₆ O ₄	62,26	62,09	7,54	7,91
CH ₃ } CH-CH ₂ -CH ₃	76,1	66	212	C ₁₁ H ₁₆ O ₄	62,26	62,42	7,54	7,77
-	80,0	173-174	218	C ₁₂ H ₁₀ O ₄	66,05	65,96	4,58	4,69
-CH ₂ -	83,3	91-92	234	C ₁₃ H ₁₂ O ₄	71,79	71,85	5,17	5,23
-CH ₂ -CH ₂ -	73,0	79-80	246	C ₁₄ H ₁₄ O ₄	68,29	68,03	5,69	5,77

R	R ₁	Выход в %	Температура кипения в °С	Давление в мм	M	d ₄ ²⁰	n _D ²⁰	MR _D		Эмпирическая формула	Анализ в %			
								вычислено	найдено		C		H	
											вычислено	найдено	вычислено	найдено
CH ₃ —	CH ₃ —CH ₂ —	75,1	143—144	5	184	1,1614	1,4840	45,56	45,35	C ₉ H ₁₂ O ₄	58,69	58,37	6,52	6,41
CH ₃ —CH ₂ —	CH ₃ —CH ₂ —	75,1	185—186	4	198	1,1463	1,4855	50,17	49,59	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	60,60	60,40	7,07	7,19
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	CH ₃ —CH ₂ —	72,2	129—130	4	212	1,0861	1,4680	54,80	54,30	C ₁₁ H ₁₆ O ₄	62,26	62,48	8,75	8,96
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —	CH ₃ —CH ₂ —	70,0	164—166	8	226	1,0392	1,462	59,42	60,31	C ₁₂ H ₁₈ O ₄	63,71	63,61	8,00	8,16
CH ₃ —	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	70,0	114—116	3	198	1,2011	1,4950	50,18	49,82	C ₁₀ H ₁₄ O ₄	60,60	60,40	7,07	7,28
CH ₃ —CH ₂ —	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	88,1	125—126	3	212	1,1264	1,4780	54,80	53,75	C ₁₁ H ₁₆ O ₄	62,26	61,97	7,54	7,44
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	73,0	140—142	5	226	1,0400	1,4680	59,42	60,45	C ₁₂ H ₁₈ O ₄	63,71	63,75	8,00	8,04
CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —CH ₂ —	CH ₃ —CH ₂ —CH ₂ —	79,0	152—154	5	240	1,0435	1,4672	64,04	64,84	C ₁₃ H ₂₀ O ₄	65,00	64,76	8,33	8,05

Как показывает приведенная схема, полученный реакцией хлорметилирования метилового эфира фуран-2-карбоновой кислоты 5-хлорметилпродукт вводился в реакцию со спиртами через их алкоголяты, и промежуточные сложные эфиры омылялись щелочью до соответствующих кислот.

Некоторые физико-химические свойства метиловых эфиров 5-алкоксиметилфуран-2-карбоновых кислот и соответствующих им кислот приведены в табл. 1 и 2.

Литературные данные о сложных эфирах незамещенной фуран-2-карбоновой кислоты говорят о том, что они проявляют местноанестетическую активность, возрастающую с увеличением спиртового остатка. В связи с этим и с точки зрения связи между строением и биологическим действием органических соединений нас интересовал вопрос влияния R-оксиметильных остатков в положении 5-фуранового кольца на анестетическую активность алкиловых эфиров.

При исследовании биологических свойств сложных эфиров различных кислот многими исследователями констатирован факт, что метиловые эфиры, по своим свойствам, несколько отклоняются от закономерностей, установленных для остальных представителей гомологического ряда. В силу этого мы нашли целесообразным, помимо метиловых эфиров, являющихся в наших исследованиях промежуточными продуктами, получить и некоторые другие. Из спиртов были выбраны наиболее широко применяемые в синтезах физиологически активных препаратов—этиловый, пропиловый. В качестве примера можно привести хотя бы сложные эфиры указанных спиртов и п-аминобензойной кислоты, нашедшие применение в практической хирургии под названием анестезина (5), пропезина (6):

Предварительные данные по испытанию местноанестетических свойств полученных нами соединений показали, что введение R-оксиметильных остатков в положение-5 фуранового кольца сложных эфиров фуран-2-карбоновой кислоты несколько удлиняет (8—12 мин.) время наступления анестезии, но одновременно увеличивает продолжительность и силу действия.

Формулы и физико-химические свойства сложных эфиров 5-R-оксиметилфуран-2-карбоновой кислоты приведены в табл. 3. Выход эфиров колеблется в пределах 62—88% теории. Не совсем высокие

выхода объясняются тем, что в процессе синтеза имеет место частичный гидролиз и от 5 до 10% кислоты выделяется из водного слоя. Выход кислот приведен, считая на исходный хлорметилпродукт с учетом омылившейся части.

Экспериментальная часть. Алкиловые эфиры фуран-2-карбоновой кислоты. В 1-литровую круглодонную колбу помещают 1 г мол. фуран-2-карбоновой кислоты и 0,5 литра соответствующего спирта. К полученному раствору при помешивании приливают 10 мл концентрированной серной кислоты.

Смесь кипятят на водяной бане в течение 4 часов, и, заменив обратный холодильник нисходящим, отгоняют большую часть (около 400 мл) спирта. К охлажденному остатку приливают 500 мл воды, отделяют выделившийся маслообразный продукт, а водный слой экстрагируют 3 порциями эфира по 100 мл каждая. Эфирный экстракт присоединяют к основному продукту, промывают 5% раствором соды, затем водой до нейтральной реакции и сушат над прокаленным сернокислым натрием. После отгонки эфира остаток перегоняют, в случае метилового и этилового эфиров при атмосферном давлении и в случае остальных эфиров в вакууме.

Выход чистых эфиров колеблется в пределах 80—85% теории.

Хлорметилирование алкиловых эфиров фуран-2-карбоновой кислоты. В литровую четырехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой, изогнутой трубкой, доходящей до дна колбы, термометром, погруженным в жидкость и газоотводной трубкой, помещают 1 г мол. алкилового эфира фуран-2-карбоновой кислоты, 250 мл сухого хлороформа, 45 г параформальдегида (что в пересчете на формальдегид составляет 1,5 г мол.) и 34 г (0,25 г мол.) безводного хлористого цинка. Перемешивая смесь, пропускают в колбу через промывную склянку с серной кислотой ток сухого хлористого водорода. При этом температура смеси постепенно повышается; во избежание осмоления реакцию ведут при охлаждении колбы водой, поддерживая температуру реакционной смеси не выше 24—26°. Реакция длится около 2 часов; конец ее определяют переходом в раствор всего количества параформальдегида и постепенным прекращением самоподогревания. Смесь принимает светло-желтую окраску.

Смесь сливают в колбу, содержащую 0,5 литра воды, отделяют нижний слой хлороформа и промывают его 3 порциями воды по 100 мл. После высушивания хлористым кальцием отгоняют растворитель и остаток перегоняют в вакууме.

Указанные хлорметилпродукты синтезированы по ранее описанному методу (1).

Алкиловые эфиры 5-хлорметилфуран-2-карбоновой кислоты раздражают не только слизистую оболочку, но и кожный покров лица и рук, вследствие чего обработку реакционной смеси и выделение продукта следует проводить под тягой, соблюдая необходимые меры предосторожности.

5-алкил, аралкилоксиметилфуран-2-карбоновые эфиры. В полулитровую трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой с ртутным затвором, капельной воронкой и обратным холодильником с хлоркальцевой трубкой, помещают 150—170 мл соответствующего спирта (взят в избытке) и небольшими кусочками вносят 0,5 г атома свеженарезанного металлического натрия.

К образовавшемуся алкоголяту при механическом перемешивании, в продолжение 1—1,5 часов по каплям приливают 0,5 г мол. хлорметилпродукта, растворенного в 100 мл соответствующего спирта. При этом наблюдается обильное выделение хлористого натрия. После прибавления всего количества, реакционную смесь кипятят на масляной бане (температура бани 100—130°) в течение 3 часов и, заменив обратный холодильник нисходящим, продолжая перемешивание, полностью отгоняют избыток спирта. К охладившейся до комнатной температуры реакционной массе приливают 150 мл воды и отделяют выделившийся маслянистый слой. Водный слой экстрагируют 2—3 порциями эфира по 50 мл и присоединяют к основному продукту. Эфирный раствор высушивают над прокаленным сернокислым натрием, отгоняют растворитель и остаток перегоняют в вакууме.

Метилловый эфир 5-феноксиметилфуран-2-карбоновой кислоты. Этот эфир также получают по описанию, данному для алкиловых эфиров 5-алкил, аралкилоксиметилфуран-2-карбоновых кислот.

В реакцию введено 0,5 г мол. фенола с 0,5 г атомов металлического натрия в среде 200 мл абсолютного бензола. Обработка продукта реакции обычная. После отгонки растворителя вещество кристаллизуется, отфильтровывается, тщательно промывается водой и высушивается на воздухе. Т. п. 47—48°.

Омыление сложных эфиров 5-алкил-, арил-, аралкилоксиметилфуран-2-карбоновой кислоты. В полулитровую трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой, помещают раствор 35—40 г едкого натрия в 130 мл 96%-ного спирта и при перемешивании медленно приливают 0,3 г мол. метилового эфира 5-алкил, арил, аралкилоксиметилфуран-2-карбоновой кислоты.

Смесь кипятят на водяной бане в течение 2—3 часов и, заменив обратный холодильник нисходящим, при перемешивании отгоняют возможно большее количество спирта (около 100—110 мл). К охлажденному до комнатной температуры остатку приливают 130—150 мл воды, щелочной раствор экстрагируют эфиром и обрабатывают соляной кислотой до кислой реакции на конго. Выделившуюся в виде масла кислоту отделяют, водный слой экстрагируют 2—3 раза эфиром, порциями по 50 мл каждая и присоединяют к основному продукту. После высушивания над прокаленным сернокислым натрием и отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме. Отгон полностью кристаллизуется.

В случае 5-изобутокси-, Н-амилокси-, изоамилокси-, фенокси-, бензилокси-, и фенэтилоксиметилфуран-2-карбоновых кислот при обработке щелочного раствора соляной кислотой осаждаются кристаллические продукты, которые отсасывают и перекристаллизовывают из органических растворителей.

Лаборатория фармацевтической химии
Академии наук Армянской ССР

Ա. Լ. ՄՆՁՈՅԱՆ, Վ. Գ. ՍՖԻԻԿՅԱՆ, Զ. Լ. ՊՍՊԱՅԱՆ ԵՎ Ա. Ն. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հետազոտությունն Ֆուրանի ածանցյալների բնագավառում

Հաղորդում IV: Մի բանի 5-ալկիլ, ալիլ, ալիլօքսիմեթիլ ֆուրան-2-կարբոնաթթուներ և նրանց ալկիլ էսթերները

Քիմիոգիական ակտիվությունն ցուցաբերող, ինչպես բնական, նույնպես և սինթետիկ ճանապարհով ստացված միացությունների կառուցվածքները վերլուծելիս ակնհայտ է դառնում այն հանգամանքը, որ նրանցից մեծ մասն իրենց ստրուկտուրաներում ունենալով կարգի օրգանական թթուների մնացորդներ: Արոմատիկ շարքի թթուներից ամենահաճախ հանդիպող թթուն դա բենզոական թթուն է և նրա մի քանի ածանցյալներ:

Ակտիվ բնական նյութերին փոխարինող սինթետիկ միացությունների ստացման բնթացքում կամաց-կամաց մեծացել է հետաքրքրությունը դեպի բենզոական թթվի օքսի-, ալիլօքսի-, ամինո-, թիո և այլ ածանցյալները, որոնք սկիզբ են դրել ավելի հետաքրքիր հատկություններով օժտված ֆիզիոլոգիական ակտիվ նյութերի ստացմանը:

Բենզոական թթվին և նրա ածանցյալներին դուրսհան կիրառություն են գտել նաև հետաքրքիր կլիկ օդակ ունեցող թթուները, ինչպես օրինակ պիրիդին, խինոլին, տիոֆեն-ֆուրան և այլ կարբոնաթթուներ:

Գրականությունից հայտնի է, որ ֆուրան-2-կարբոնաթթուն օգտագործված է կոկայինի (1), ստովայինի (2), էստրադիոլի (3) և այլ ֆիզիոլոգիական ակտիվ պրեպարատների ֆուրանային անալոգներ ստանալու համար: Այս կարգի բազմաթիվ միացությունների ֆարմակոլոգիական ուսումնասիրություններից ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ֆուրոլիլային խմբի օգտագործումը բենզոլիլայինի փոխարեն, շատ քիչ չափով է անդրադառնում նշված միացությունների հիմնական հատկությունների վրա:

Մինչդեռ հայտնի է, որ բենզոլիլ խմբի մեջ մեկ կամ մի քանի ջրածինների փոխարինումը նոր էլեմենտներով կամ խմբերով, առաջ է բերում այս նյութերի հատկությունների խորը փոփոխում: Այս կապակցությամբ հետաքրքրական էր պարզել, թե նույնանման խմբերի մուտքը ֆուրոլիլային մնացորդների մեջ ինչ չափով կանդրադառնա որոշակի ակտիվություն ունեցող միացությունների հատկությունների վրա:

Նախորդ հաղորդումներից մեկում (1) նկարագրված ֆուրան-2-կարբոնաթթվի էսթերների մրում և բյուրմեթիլացման ռեակցիաները մատչելի դարձրին ոչ միայն 5-մեթիլֆուրան-2-կարբոնաթթվի, այլև 5-րդ դրությունում մեջ բազմաթիվ այլ փոխարկյալներ կրող ֆուրան-2-կարբոնաթթուներին ստացումը:

Առաջին հերթին մեզ հետաքրքրեցին 5-ալկիլօքսիմեթիլ ֆուրան-2-կարբոնաթթուները (5), քանի որ ալիլօքսի խմբավորումները բենզոական թթուների բազմաթիվ միացությունների կառուցվածքներում արդարացրել են իրենց իրրև հաջող կոմպոնենտներ ֆիզիոլոգիական ակտիվ պրեպարատների ստեղծման գործում:

Մեր այս հաղորդման մեջ նկարագրված են մի քանի R-օքսի մեթիլ ֆուրան-2-կարբոնաթթուները և նրանց էսթերները, որոնց մեջ R ներկայացնում է մեթիլից-ամիլ (ներառյալ և համապատասխան իզոտագիկալները) և ֆենիլ, բենզիլ, ֆենէթիլ:

Ստացված էսթերներին, ինչպես նաև թթուների ֆիզիոլոգիական հատկությունները բնորոշող մի քանի տվյալներ բերված են 1, 2 և 3 աղյուսակներում:

Նշված էսթերների անեսթետիկ հատկությունների նախնական ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ R-օքսիմեթիլ խմրերի մուտքը ֆուրան-2-կարբոնաթթվի էսթերների մեջ ֆուրանի օդակի Ծ-րդ դիրքում բերում է անեսթեզիայի հասունացման աննշան ուշացում: Սակայն երկարացում է անեսթեզիայի տևողությունը և բարձրացում ակտիվությունը:

ЛИТЕРАТУРА — ԿՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ А. Л. Мнджоян, В. Г. Африкян и М. Т. Григорян, ДАН Арм. ССР, т. XVII, 170 (1953).