

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. А. Вардикян

Описание нового вида пяденицы из рода *Eupithecia* Curt. (Lepidoptera, Geometridae) из Армянской ССР

(Представлено Г. Х. Бунятяном 14 XII 1953)

В результате обработки материала, собранного автором в течение 1952 года, и просмотра коллекции бабочек ЗИН Академии наук СССР (Ленинград), обнаружен новый вид пяденицы, описание которого приводится ниже.

Eupithecia richteri sp. nov. По строению полового аппарата (рис. 1 и 2) и рисунку крыла относится к группе *Eupithecia graphata* Tr.

Размах крыльев 15—18 мм. Общая окраска буровато-серая; ко-
стальное поле слегка темное. Из многочисленных перевязей на пе-
редних крыльях более выражена наружная. Она несколько шире дру-
гих, беловатая, с более резким внешним окаймлением (у некоторых
особей окаймление почти черноватое, его угол на радиусе слабо
выражен, часто почти отсутствует). Остальные перевязи менее разли-
чимы, нередко смыты, с более тонким окаймлением. Все перевязи
слабо волнистые. Наружное поле почти одноцветное. Задние крылья
с тем же рисунком, но более смытым, а в прикорневой области рису-
нок почти отсутствует. Дискальные пятна на всех крыльях выражены
в виде черных точек, которые более отчетливы снизу.

Снизу крылья беловатые, с более заметным рисунком лишь в
наружной части крыла. Краевая линия образована из черных прямых
штрихов. Бахрома, особенно на задних крыльях, светлая, с темными
пятнами по жилкам.

Голова и брюшко одного цвета с крыльями.

Вид *Eupithecia richteri* sp. nov. отличается от *graphata* Tr. фор-
мой восьмого стернита (Ventralplatte Петерсена) и ункуса. Задний
край стернита образует две широкие округлые лопасти, примыкаю-
щие одна к другой (рис. 1, I). У *graphata* задний край стернита по
бокам несет два узких, округлых и коротких выступа, которые раз-
делены неглубокой выемкой.

В отличие от *graphata* вершина нижней ветви ункуса тупая, широко отставлена от верхней (рис. 1, 10).

Отличия в строении копулятивной сумки менее отчетливы, так как детали ее вооружения и у *graphata* колеблются.

Тип самец хранится в коллекциях Зоологического института Академии наук Арм. ССР (окрестности г. Еревана, Зоопарк, 20.VIII.1952, Вардикян). Паратипы находятся в коллекциях Зоологического института Академии наук Арм. ССР (окрестности г. Еревана, Зоопарк, 20—27.VIII.1952, Вардикян) и Зоологического института Академии наук СССР (Нахичеванская АССР, Ордубад, 1.VI.1934, Рябов). Вид держится в скалистых ущельях и, очевидно, дает два поколения в год.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ս. Ա. ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ

**Երկրաչափ թիթեռի նոր տեսակի նկարագրություն Eupithecia սեռից
(Lepidoptera, Geometridae)**

Մշակելով հեղինակի կողմից հավաքած 1952 թ. նյութը և նայելով ՍՍՏՄ Գիտությունների ակադեմիայի կենդանաբանական ինստիտուտի երկրաչափ թիթեռների կոլեկցիաները, հայտնաբերված է երկրաչափ թիթեռի նոր տեսակ՝ *Eupithecia richteri* sp. nov.:

Այս տեսակը պատկանում է *Eupithecia graphata* Tr. խմբին, որից տարբերվում է ութերորդ ստերնիտի և ունկուսի ձևով:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Վ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ *Pierse*, The genitalia of the group Geometridae of the Lepidoptera of the British Islands. Liverpool, 1914. ² *Petersen*, Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Tephroclystia* Curt. Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“. Band XXII, 1909. ³ *Staudinger O. und Rebel H.*, Catalog der Lepidopteren des Palaarktischen Faunengebietes. I Teil. Berlin, 1901.

