

С. М. Хнзорян

Новый трубковерт из Армянской ССР (Coleoptera, Attelabidae)

Rhynchites amygdali sp. n.

(Представлено Г. Х. Бунятяном 5 V 1954)

Арм. ССР: Арени (Азизбековский р-н), вдоль правого берега Арпы, у самой границы Нах. АССР, на диком миндале, 15.V.1953, 2 экз. (самец и самка), типы; Гергер (тот же р-н), в можжевелевом редколесьи ниже селения, на диком миндале, 22.V.53, 2 самки. Встречается вместе с *R. zaitzevi* Kies., но много реже этого последнего. Тип в коллекциях ЗИН АН Арм. ССР.

Золотистокрасный, в густых торчащих белых волосках. Длина 5 мм (без хоботка).

Голова (рис. 1) покрыта густой пунктировкой, у самца с маленькой очень короткой бороздкой на лбу, лоб широкий, глаза маленькие, круглые, у самца немного крупней, чем у самки, виски много длиннее глаз, расширяются к основанию, у самки много длиннее, чем у самца, темя широкое, шире головы у глаз, у самки на одну треть шире, чем у самца. Головотрубка в густой морщинистой пунктировке, без килей, к вершине уплощенная, у самца явственно кривая, слегка расширенная у основания и еще слабее у вершины (наименьшая ширина головотрубки находится у места прикрепления усиков и относится к наибольшей, как 2:3); у самки почти прямая, длиннее, чем у самца, у основания сильно расширенная, у места прикрепления усиков в два раза уже, чем у основания, к вершине заметно расширенная. Длина головотрубки самца равна $9/8$ -м, а самки $10/8$ -м длины переднеспинки. Усики узкие, почти голые, в редких полуприлегающих темных волосках, их первые два членика равной длины, 4-й самый длинный, немного длиннее третьего и в $5/3$ раза длиннее 5-го, все членики жгутика продольные. Усики самца прикреплены у середины головотрубки, у самки чуть ближе к основанию. Переднеспинка самца с двумя шипами, направленными криво вперед, ее боковые края закругленные, без явственной перетяжки, с морщинистой пунктировкой. У самки переднеспинка обычной грушевидной формы, у вершины конусообразная, без перетяжки. Основание переднеспинки окаймленное, вершинный край без каймы.

Щиток полукруглый, покрыт густыми белыми волосками, скрывающими покровы, на фоне надкрылий выделяется белым пятном. Надкрылья с выдающимися плечами и глубоким вдавлением у передней трети (такого глубокого вдавления не имеется ни у одного другого из кавказских видов этого рода), в полтора раза длиннее своей общей ширины. Скульптура надкрылий густая и грубая, состоит из




Рис. 1. Голова обоих полов *Rhynchites amygdali*.

мелких и крупных точек, эти последние мало заметны и образуют неявные ряды, вдоль шва совсем незаметные. Низ, в особенности средне-зadнегрудь, в густых белых торчащих волосках, эпистерны заднегрудки покрыты редким, однообразным волосным покровом, сгущенным у вершины эпистерн. Ноги покрыты густыми белыми волосками, торчащими перпендикулярно к покровам (характерно для этого вида).

Для быстрого определения этого вида можно прибегнуть к следующей таблице, учитывающей все виды этого рода, встречающиеся в пределах Европейской части СССР.

1 (2) Головотрубка короткая, у самца кривая, у самки прямая, короче переднеспинки, у вершины зачерненная, с 3 продольными килем; центральный киль явственен лишь в основной половине, боковые кили резкие. Усики сравнительно толстые. У самца переднеспинка с 2 коническими шипами. 1. *microsaepae* T.-Min.

2 (1) Головотрубка длиннее переднеспинки, без килей.

3 (4) Эпистерны заднегрудки в длинных белых волосках и с голым блестящим зеркальцем по середине. Крупный (9—11 мм), в густых белых волосках, усики также в густых белых волосках, щиток выделяется белым пятном на фоне надкрылий. Переднеспинка самца с 2 шипами 2. *zaitzevi* Kies.

4 (3) Эпистерны заднегрудки покрыты более или менее однообразным, густым или редким волосным покровом, без следа зеркальца.

5 (6) Щиток покрыт густыми волосками, выделяется белым пятном на фоне надкрылий. Усики тонкие и почти голые, их 4-й членик самый длинный, в $5/3$ раза длиннее 5-го и длиннее 3-го. Надкрылья без явственных точечных рядов. Ноги в густых белых торчащих волосках. У самки головотрубка у основания вдвое шире, чем у середины. У самца переднеспинка с 2 шипами. Длина: 5 мм. 3. amygdali Khnz.

6 (5) Щиток не выделяется своим цветом на фоне надкрылий. Усики толще, их 4-й членик примерно равен по длине 3-му и 5-му (только у splendidulus намного длиннее 5-го), часто в длинных черных волосках. Надкрылья с явственными точечными рядами, обычно на всем диске, изредка только вдоль шва, ноги в менее густых волосках. Головотрубка у основания лишь слегка шире, чем у середины, переднеспинка самца с шипами или без них.

R. auratus Scop., splendidulus Kryn., giganteus Kryn., bacchus L., lenaeus Fst.

Ս. Ս. ԽՆԶՈՐՅԱՆ

Նոր ռինխիտ Հայկական ՍՍՌ-ից (Coleoptera, Attelabidae)

Արփայի հովտի ավազանում լճայրի նշենու վրա հայտնաբերված է ռինխիտի նոր տեսակ՝ Rhynchites amygdali sp. n.

Հոգվածում տրվում է այս տեսակի արուի և էգի նկարագրությունը, և աղյուսակ որը թույլ է տալիս հեշտ որոշել այս տեսակը ռինխիտես սեռի ՍՍՌ-ի եվրոպական մասում հանդիպող այլ ներկայացուցիչների համեմատությամբ: