ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XIX 1954 2

ЭНТОМОЛОГИЯ

С.М. Хнзорян

Новый вид блошек из Армянской ССР (Coleoptera, Chrysomelidae) Haltica armeniaca sp. n.

(Представлено Г. Х. Бунятяном 5 V 1954)

Арм. ССР: Шурнух (Зангезур), 10. VI. 1950, тип. там же 20.VI. 1950, много экземпляров. Горис, восточный склон над городом, 23.VI. 1950, Иджеван, во всех окрестных лесах, обычен, 7—11.VI. 1949. Тип в коллекциях ЗИН АН Арм. ССР.

Металлически зеленая синяя или фиолетовая, одноцветная. Длина 4,5—5 *мм*, ширина 2,2—2,5 *мм*.

Челюсти с 3 зубцами. Лобные бугорки довольно выпуклые, небольшие, хорошо вырисованы лобными линиями, лобный киль узкий, выпуклый, резко ограничен по всей своей длине; 3-й членик усиков несколько длиннее 2-го, в полтора раза короче 4-го. Переднеспинка уширена в полтора раза, ее наибольшая ширина за серединой; боковая каемка узкая, утолщена в форме бугорка у передних углов. На этом бугре имеется щетинкообразная шпора, расположенная у самой вершины угла. Поперечная бороздка перед основанием надкрылий довольно глубокая, заканчивается по бокам неглубоким вдавлением. Пунктировка переднеспинки очень нерегулярная, из мелких рассеянных точек, местами несколько сгущающихся. Щиток гладкий. Надкрылья в плечах примерно в $1^1/_4$ раза шире основания переднеспинки, сзади немного расширяются, несколько сильнее у самок. Шов перед вершиной немного более вдавлен. Пунктировка надкрылий довольно густая, двойная, нерегулярная, преобладают крупные точки, которые вдвое крупнее, чем на переднеспинке. Лапки стройные, первый членик задних лапок по длине равен 2-му и 3-му вместе, следующие прогрессивно удлиняются.

Самец: первый членик передних лапок расширенный; последний стернит с глубокой полукруглой вырезкой у вершины и неглубоким вдавлением, замыкающим этот вырез со стороны основания (рис. 1).

Пенис: слегка расширен спереди, внешние углы его переднего края тупоугольные, по середине переднего края с широким, на вершине округленным треугольным острием: с нижней стороны несет две неглубокие бороздки, начинающиеся несколько ниже середины пениса и почти достигающие вершины, где они вливаются в две почти

круглые ямки. Эти бороздки у основания расходятся затем сходятся у вершинной четверти, чтобы снова разойтись у вершины. Там, где они наиболее сближены, они разделяют пенис примерно в пропорции: 0,3—0,4—0,2. В центральной половине края пениса кнаружи от бороздок покрыты глубокими косыми штрихами.



Рис. 1.

По строению своего полового органа этот вид стоит между H. saliceti Wse и H. ampelophaga Guer. Первый из этих видов имеет ту же общую структуру нижней части пениса и бороздок, но эти последние очень глубокие и вырисовывают гораздо более извилистый рисунок. Второй из этих видов имеет сходный пенис и, в частности, совершенно тождественные косые штрихи по бокам его нижней стороны. Но у типичных экземпляров бороздки доходят до вершины пениса и делят вершинный край в пропорции примерно 0,3—0,4—0,3, следовательно, расходятся здесь гораздо слабее, чем у Армянской блошки. Отсутствуют также и ямки. У H. amp. pontica Oglob, описанной из Трапезунда, рисунок бороздок напоминает таковой нашего вида, но ямки также отсутствуют, и весь участок между бороздками покрыт регулярными штрихами, чем легко отличается от пенисов соседних форм (эти данные установлены на типах Оглоблина, хранящихся в ЗИН АН СССР). Наконец, ни один из двух упомянутых нами видов не имеет ямки на последнем стерните самца, а pontica отличается также более маленькими размерами тела.

Экология: личинки питаются листьями дуба, граба и розы. Взрослые особи питаются листьями всевозможных травянистых, кустарниковых и древесных пород. Придерживаются лесного полога, предпочитают свежие дубовограбовые леса с подлеском.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ս. Մ. ԽՆԶՈՐՅԱՆ

Նոր լվիկ Հայկական ՍՍՌ-ից (Coleoptera, Chrysomelidae)

Haltica armeniaca sp. n.

*Հոդվածում տրվում է Հայաստանի անտառներից նոր լվիկի—*Haltica armeniaca sp. n. *նկարագրությունը։*

Այս տեսակը հանդիպանում է մեր անտառների ճնասատուս, սնվում է կաղնու, բոխու և անտառային վարդերի տերևներով։ Գտնված է Զանգեզուրում և Իջևանի շրջանում՝ միշտ խիտ անտառներում։