

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Хнзорян

Новый трубковерт из Армянской ССР (Coleoptera, Attelabidae)
Coenorrhinus phryganophilus Khnzorian sp. nov.

(Представлено Г. Х. Бунятяном 30. VIII. 1955)

Арм. ССР: Ньюади (Мегринский р-н), в ущельи выше селения, на цветущих *Cerasus mahaleb*, 30. VI. 1954, один самец. Тип в коллекциях ЗИН АН Армянской ССР.

Черный, блестящий, с едва заметным пурпуровым отливом, без металлического блеска, надкрылья, ноги и передние тазики желтые, жгутик усиков желтобурый, его 2 первых членика затемнены, булава черная. Длина (без хоботка) 2 мм.

Голова (рис. 1) поперечная, глаза сильно выступающие, виски длиннее диаметра глаз, кзади постепенно, но значительно сужены до шейки, эта последняя кзади расширенная, покрыта густой поперечной штриховкой. Лоб выпуклый, грубо негусто точечный, покрыт, как и вся голова с хоботком, короткими темными приподнятыми волосками, спереди несет ямку, из которой исходит хоботковый киль. Хоботок узкий, к вершине слегка расширенный, длинный, длиннее переднеспинки, но короче, чем голова и переднеспинка вместе взятые, при осмотре сбоку слегка изогнутый, покрыт грубыми густыми точками, вытянутыми в длину, их промежутки вырисовывают три киль, из них срединный почти достигает вершины хоботка, боковые к вершине неясные. Усики длинные и узкие, их первые два членика овальные, шире последующих, 3-й и 4-й почти цилиндрические, 3-й слегка короче 4-го, четыре последующих овальные, примерно равной длины, каждый из них чуть шире предыдущего; булава широкая, резко обособлена от жгутика.



Рис. 1

Переднеспинка поперечная, сильно конически сужена вперед и едва заметно назад, ее диск покрыт довольно грубыми и рассеянными

точками, диаметр которых слегка меньше диаметра точек лба и явно меньше промежутков точек. Как и диск надкрылий, передне-спинка несет негустую, более или менее приподнятую волосистость. На надкрыльях, особенно по краям, волосистость густая и торчащая. Щиток маленький, темный, блестящий. Надкрылья с рядами точечных бороздок, промежутки которых выпуклые, без видимых точек. 1-я бороздка цельная, достигает шва, 2-я сзади слита с 8-й, 9-я укорочена, не связана с соседними, начинается за плечом и достигает уровня задних бедер. Низ покрыт густыми светлыми волосками.

От всех прочих видов того же рода этот вид легко отличается окраской и суженными кзади висками; от *C. aequatus* L. также рассеянной пунктировкой переднеспинки.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ս. Ս. ԽՆԶՈՐՅԱՆ

Նոր սինխիտ Հայկական ՍՍՌ-ից (Coleoptera, Attelabidae)
Coenorrhinus phryganophilus Khnzorian sp. nov.

Մեզրու շրջանում Նյուֆադի դյուդի մոտ հայտնաբերված է սինխիտի նոր տեսակ՝
Coenorrhinus phryganophilus sp. n.

Այդ բզեզներից միայն մի նմուշ է հայտնաբերված ծաղկած *Cerasus mahaleb*-ի վրա: