

Г. Д. Авакян

Новый вид саранчевых (Orthoptera, Acrididae) из Армении

(Представлено Р. Х. Бунятыном 22.VI.1956)

Chorthippus mistshenkoi Avakjan, sp. n. (рис. 1, 2 А—С).

♀. Тело мелких или средних размеров. Лоб ясно наклонный. Лобное ребро книзу постепенно и слабо расширено. Темя слабо вдавлено; вершинная часть плоская; ширина темени между глазами почти в 1,5 раза больше своей длины. Теменные ямки глубокие, с резкими краями; длина теменной ямки почти в 3 раза больше своей наибольшей ширины. Затылок в профиль слабо выпуклый, сверху с двумя боковыми слабыми вдавлениями. Усики нитевидные, немного не достигают заднего края переднеспинки, 20—22-члениковые. Переднеспинка



Рис. 1. *Chorthippus mistshenkoi* Avakjan, sp. n. ♀ паратип.

гладкая; передний край очень слабо выдающийся, почти прямой; задний край тупоугольный, закругленный; боковые кили у середины сильно вогнутые, в задней части окаймлены светлыми полосками; срединный киль ясный, пересечен задней поперечной бороздкой. Боковые лопасти переднеспинки с 3 поперечными бороздками; задний нижний угол закругленный. Заднегрудь с широким промежутком и с широкими боковыми лопастями; наибольшая ширина промежутка в 1,5—2 раза превышает его длину. Надкрылья сильно укорочены, едва достигают заднего края 3-го тергита брюшка; костальное поле довольно широкое; вершина надкрылья закругленная. Задние бедра сверху в редких волосках и иногда с 2 неясными или же ясными поперечными перевязями; внутренняя сторона в основной части с резкой косой продольной черной полосой и с неясной неполной темноватой перевязью в вершинной части; нижняя сторона желтая, иногда мутно-зеленая. Задние голени желтоватые, в редких волосках, по наружному краю с 10—12, по внутреннему краю с 11—12 шипами; вершина шипов черная. Брюшко снизу оливковое. Яйцеклад короткий,

с широким основанием. Общая окраска буровато-коричневая, с темными пятнами.

Длина тела ♀ 15,2—19,6 мм; переднеспинки 3,2—3,6 мм; надкрылья 4,6—6,2 мм; заднего бедра 8,4—9,7 мм.

Самец неизвестен.

Южная Армения: Капутджух, главная вершина Зангезурского хребта, 3917 м над уровнем моря, 17.IX.1937, 4 ♀ (включая тип), А. Тахтаджян.

Альпийская и субальпийская зона, луга и пастбища.

Тип и один паратип хранятся в коллекциях ЗИН АН СССР два паратипа — в коллекциях ЗИН АН Армянской ССР.

Наиболее близок к *Ch. demokidovi* (Rme.), отличаюсь от него большей величиной тела, более длинными усиками, у которых срединные членики удлиненные, а длина отдельного срединного членика значительно превосходит его наибольшую ширину (рис. 2C), и более длинными надкрыльями. У *Ch. demokidovi* (Rme.) усики короткие, срединные членики усиков почти квадратные, а длина отдельного срединного членика едва меньше его наибольшей ширины, равна ей или только едва превышает ее (рис. 2D).

Вид назван в честь талантливого ортоптеролога Л. Л. Мищенко.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР




Рис. 2. А—*Chorthippus mistshenkoi* Avakjan, sp. n., средне- и заднегрудь, ♀, тип; В—*Ch. mistshenkoi* Avakjan, sp. n., средне- и заднегрудь, ♀, паратип; С—*Ch. mistshenkoi* Avakjan, sp., левый усик, ♀, паратип; D—*Ch. demokidovi* (Rme.), правый усик, ♀.

Գ. Դ. ԱՎԱԳՅԱՆ

Մորեխի (Acrididae) նոր տեսակ Հայաստանից

Chorthippus mistshenkoi Avakjan sp. nov.

Հեղինակը ինստիտուտի կոլեկցիաների մեջ հայտնաբերել է Համուջուղից հավաքված մորեխի մի տեսակ, որը գիտության համար նոր տեսակ է հանդիսանում: Այս նոր տեսակը նվիրված է շնորհալի օրթոպտերոլոգ Միշենկոյին:

Chorthippus mistshenkoi sp. n. ամենից ավելի մոտ է *Ch. demokidovi* (Rme.) տեսակին, սակայն նրանից տարբերվում է իր ավելի մեծ մարմնով, երկար թևերով, ավելի երկար բեղիկներով, որոնց միջին հատվածները երկարացած են, իսկ առանձին վերջրմիջին հատվածի երկարությունը նշանակալից չափով գերազանցում է նույն հատվածի ամենամեծ լայնությանը (նկ. 2C): Ապրում է Զանգեզուրի լեռնաշղթայի ենթալպյան և ալպյան գոտիների մարգագետիններում ու արոտավայրերում: