З. А. Киракосян

Пробеги поглощения протонов в графите и свинце

(Представлено А. И. Алиханяном 23. X. 1956)

При помощи магнитного спектрометра, схема которого представлена на рис. 1, были проведены измерения пробегов поглощения протонов в графите и свинце. Измерения производились на высоте 3200 м над уровнем моря.

Рис. 1. Схема магнитного спектрометра

Определение импульса частицы производилось по измерению радиуса кривизны траектории частицы в магнитном поле с помощью координатных рядов счетчиков Гейгера-Мюллера k_1 , k_2 и k_3 , составляющих телескоп.

Под магнитным зазором помещались медные поглотители Π_1 — Π_2 с рядами счетчиков между ними. Общая толщина указанных поглотителей равнялась 178 г/см^2 . Над магнитным зазором располагались поглотители Γ_1 и Γ_2 из исследуемого вещества т. е. графита или свинца.

Весь цикл измерений состоял из трех вариантов:

1. С графитовыми поглотителями над зазором,
2. Со свинцовыми поглотителями над зазором,
3. Без поглотителей (воздушный вариант измерений).

Получая таким образом интенсивность потока протонов с поглотителями и без них, можно было по ослаблению потока вычислить пробег поглощения протонов в этих веществах. Обозначим интенсивность протонов в воздушном варианте измерений через N_0 , в вариантах с поглотителями Γ_1 и Γ_2 —через N , тогда, принимая экспоненциальный закон поглощения, можно получить значения пробега поглощения из выражения

$$L = \frac{x}{\ln \frac{N_0}{N}}, \quad (1)$$

где x —общая толщина поглотителей Γ_1 и Γ_2 , выраженная в г/см^2 , L —пробег поглощения протонов.

При измерениях пробегов поглощения частиц в плотных веществах существенное значение имеет обеспечение одинаковой вероятности регистрации исследуемых частиц используемой установкой в воздушной серии измерений и в измерениях с поглотителями. Нашей установкой во всех вариантах измерений в основном регистрировались одиночные частицы, прошедшие через телескоп без сопровождения.

Ясно, что при этом вероятность регистрации протонов в воздушном варианте оказывалась больше, чем при измерениях с поглотителями Γ_1 и Γ_2 . Действительно, протоны, рожденные в актах взаимодействия частиц ядерно-активной компоненты космического излучения с ядрами воздуха, регистрировались установкой с большей вероятностью, чем аналогичные протоны, рожденные в поглотителях над зазором. Первые из них образовывались на достаточно большом расстоянии от установки, ввиду малой плотности воздуха и доходили до регистрирующей системы как одиночные частицы, а вторые, образовываясь в поглотителе близко над зазором и имея сопровождающие частицы, регистрировались преимущественно как двойные частицы, импульсы которых не всегда можно было определить. Для введения поправки на указанный эффект нами проводились контрольные измерения. Удаляя генераторы Γ_1 и Γ_2 на расстояние l м от верхнего края полюсов, мы и

значительной мере уменьшили число таких сопровождений и оценили число сопровождений по отношению к одиночным для разных областей импульсов. Обозначим это отношение через β . Для нахождения числа частиц, прошедших через установку, необходимо число одиночных умножить на $K=1+\beta$. Значения K для каждого варианта измерений приводятся в табл. 1. В рассматриваемых измерениях необходимо было учитывать также изменение барометрического давления при переходе от воздушного варианта измерений к варианту с поглотителями. По барометрическому давлению нами использовались данные метеорологической станции Арагац. Измерение давления производилось четыре раза в сутки. Среднее давление $\bar{P}$ для каждого варианта измерений вычислялось согласно выражению

$$\bar{P} = \frac{\sum P_i t_i}{\sum t_i}, \quad (2)$$

где t_i — интервал времени от одной зарядки фотоаппарата до другой ($\sim 20-25$ часов), $\bar{P}_i$ — среднее значение давления за каждый интервал времени t_i . Получены следующие средние значения давления для трех вариантов измерений:

$\bar{P}_C = 706,6$ г/см² для графитового варианта,

$\bar{P}_{Pb} = 696,6$ г/см² — свинцового и $\bar{P}_B = 693$ г/см² воздушного варианта. Увеличение давления эквивалентно введению дополнительного слоя поглотителя над зазором. Поэтому при вычислении пробега поглощения необходимо учитывать изменение интенсивности протонов из-за изменения давления. Эта поправка значительна только при графитовых измерениях. Изменение давления при переходе от графитовых измерений к воздушным составляет 13,6 г/см², поэтому в выражение (1) следует подставлять значение $x = 40$ г/см² С + 13,6 г/см² воздуха. Данные по пробегу поглощения протонов в графите и свинце, полученные после введения указанных поправок, приведены в табл. 1. Для пробегов приводятся среднеквадратичные ошибки с учетом ошибок при определении коэффициента K . В первом столбце таблицы указаны интервалы энергией. Во втором, третьем и четвертом — число протонов, наблюдаемых в этих интервалах энергий соответственно в графитовом, свинцовом и воздушном вариантах. В этой же последовательности в следующих трех столбцах приводятся значения коэффициента K . В девятом, десятом и одиннадцатом столбцах приведены числа протонов с энергией больше заданой (эти энергии указаны в восьмом столбце), зарегистрированных установкой в единицу времени. В последних двух столбцах указаны значения пробега поглощения этих протонов в соответственно графите и свинце. Для частиц с энергией $E > 5,49$ Бэв значение пробегов не приводится, так как число частиц мало и ошибки велики. Из наших данных следует, что пробег поглощения протонов

Таблица 1

Пробег поглощения протонов в графите и свинце

Интервалы энергии в Бэв	Число протонов наблюдаемых			Ливневые коэффициенты			$E >$ в Бэв	Число протонов в одну сек. $\cdot 10^{-6}$			Пробег поглощения в графите L_C	Пробег поглощения в свинце L_{Pb}
	под граф. N_C	под свинц. N_{Pb}	и возд. N_B	K_C	K_{Pb}	K_B		N_C	N_{Pb}	N_B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,37—0,47	1525	494	720	1,23	1,31	1,07	0,37	1465	945	1960	183 ± 17	275 ± 13
0,47—0,64	1443	507	671	1,24	1,32	1,07	0,47	1080	729	1450	183 ± 20	292 ± 18
0,64—0,91	1103	374	477	1,26	1,35	1,07	0,64	715	505	955	183 ± 25	318 ± 25
0,91—1,38	857	329	422	1,28	1,38	1,07	0,91	429	292	612	150 ± 22	271 ± 24
1,38—2,38	554	221	317	1,31	1,42	1,07	1,38	201	139	310	$124,5 \pm 21$	249 ± 27
2,38—5,49	180	59	104	1,33	1,48	1,07	2,38	53	34	82,4	123 ± 38	224 ± 41
5,49— ∞	11	9	11	1,45	1,6	1,07	5,49	3,19	4,77	7,89		

в графите с ростом энергии убывает. Для свинца эта зависимость выражается в более слабой форме.

Имея величины пробега поглощения протонов L_n и пробега взаимодействия L_v , можно определить долю энергии α , сохраняемую протоном после элементарного акта взаимодействия. Эти три величины связаны соотношением ⁽¹⁾

$$L_n = \frac{L_v}{1 - \alpha^{\gamma-1}}, \quad (3)$$

где γ — показатель спектра протонов. Пробег взаимодействия протонов с энергией $E > 1,38$ Бэв в графите был определен в последующих экспериментах, проведенных в нашей лаборатории ⁽²⁾ и оказался равным 100 г/см^2 С. Величина, совпадающая с этой, была получена в работе ⁽³⁾, проведенной на космотроне с нейтронами, энергия которых $\sim 1,4$ Бэв. Подставляя в выражение (3) значения $L_n = 124 \text{ г/см}^2$ и $L_v = 100 \text{ г/см}^2$, для графита получаем $\alpha = 0,38$. Для свинца при $L_n = 249$ и $L_v = 198 \text{ г/см}^2$ ⁽³⁾ получается $\alpha = 0,43$. Приведенные значения α относятся к протонам с энергией $E > 1,38$ Бэв. Ошибки в величинах α обуславливаются в основном ошибками в значениях пробега взаимодействия и поглощения и составляют $\sim 20-25\%$. Однако если исходить из приведенных значений для α , то следует, что в этой области энергий протоны в одиночном акте взаимодействия с ядрами графита или свинца сохраняют за собою одну и ту же долю энергии порядка 40% . В работе ⁽⁴⁾ найдено, что при столкновении протонов с энергией $0,6$ Бэв. на образование π — мезонов в среднем уходит 80% доступной энергии в системе центра инерции. Это соответствует 44% в лабораторной системе (при этом предполагается изотропное распределение π — мезонов в системе центра инерции). Полученные нами результаты качественно согласуются с рассмотренными выше.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить благодарность Н. М. Кочаряну и Г. С. Саакяну за ценное обсуждение результатов настоящей работы.

Физический институт Академии наук
Армянской ССР

Ձ. Ա. ԿԻՐԱՎՈՍՅԱՆ

Պրոտոնների կլանման վազրը գրաֆիտում եվ կապարում

Մագնիսական սպեկտրոմետրի միջոցով, որի սխեման տրված է նկար 1-ում, կատարվել են պրոտոնների կլանման վազրի մեծության չափումներ ծովի մակերևույթից 3200 մ բարձրության վրա:

Կատարվել են երեք տարրեր չափումներ.

1. Երբ սարքավորման վերևում դրված է գրաֆիտյա կլանիչներ (նկ. 1-ին Γ_1 և Γ_2):

2. Երբ սարքավորման վերևում դրված է կլանիչներ կապարից:

3. Երբ սարքավորման վերևում կլանիչներ չեն եղել:

Այսպիսով ստանալով պրոտոնների հոսքի մեծությունը կլանիչների առկայության և

բացակայութեան պայմաններում, հնարավոր է այդ մեծութեան փոփոխութեան հիման վրա հաշվել պրոտոնների կլանման վազքի մեծութիւնը ուսումնասիրվող նյութերում:

Կլանման վազքի մեծութիւնը հաշվելու համար կիրառված է ⁽¹⁾ բանաձևը, որտեղ N_0 -ն պրոտոննային հոսքի մեծութիւնն է, Γ_1 , Γ_2 կլանիչների բացակայութեան ղեպ-
օճում, իսկ N -ը նույն մեծութիւնն է կլանիչների առկայութեան ղեպում: X -ը Γ_1 և Γ_2 կլանիչների ընդհանուր հաստութիւնն է արտահայտված $q/\text{սմ}^2$ միավորներով: աղյու-
սակի վերջին երկու սյունակում բերված են ստացված արդյունքները:

Ունենալով կլանման վազքի L_{11} և փոխադրեցութեան վազքի L_{12} երկարութիւնները, կարող ենք ⁽³⁾ բանաձևից ⁽¹⁾ հաշվել α -ն՝ էներգիայի այն մասը, որ պրոտոնը սահ-
պանում է փոխադրեցութեան ամեն մի ղեպից հետո:

Պրոտոնների փոխադրեցութեան վազքի մեծութիւնները վերցվան են ⁽²⁾ և ⁽³⁾ աշխատանքներից:

$E > 1,45 \text{ էՎ}$ էներգիա ունեցող պրոտոնների համար մենք ստացել ենք $\alpha = 0,38$ գրա-
ֆիտի ղեպում և $\alpha = 0,43$ կապարի ղեպում:

Այսպիսով ստացվում է, որ նշված էներգիա ունեցող պրոտոնները գրաֆիտի կամ
կապարի միջուկների հետ փոխադրեցութեան ղեպում պահպանում են իրենց էներգիայի
մոտավորապէս 40%: Այս տվյալները համընկնում են ⁽⁴⁾ աշխատանքում բերված տվյալ-
ների հետ:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ Г. Г. Зацепин, ЖЭТФ 19. 1105, 1949. ² Н. М. Кочарян, Г. С. Саакян, А. С. Алексанян и Х. Б. Пачаджян, Изв. АН. АрмССР (в печати). ³ Т. Кур, Д. А. Хилл, В. Ф. Хорняк, Л. В. Смит, Г. Сноу, Phys. Rev. 98, 1369, 1955. ⁴ М. Г. Мещеряков, В. П. Зрелов, Б. С. Неганов, И. К. Взоров и А. Ф. Шабунин, Тезисы докладов на Всесоюзной конференции по физике частиц высоких энергий — Москва, издательство АН, 1956. стр. 19.