Г. С. Слакян, З. А. Киракосян и А. С. Алоксанян

Энергетический спектр протонов на высоте 3200 м над уровнем моря

(Представлено А. И. Алиханяном 23. X. 1956)

В этой работе излагаются результаты трех независимых экспериментов по определению энергетического спектра протонов на высоте 3200 м.

Опыт I. В качестве первого источника, исходя из которого были определены три ординаты дифференциального спектра протонов, служил первичный экспериментальный материал Н. М. Кочаряна, любезно предоставленный в наше распоряжение. Мы имеем в виду его экспериментальный материал по определению энергетического распределения μ -мезонов (¹). Описание установки приведено в цитированной работе. В этих измерениях над магнитным зазором не было вещества, за исключением легкого перекрытия из дерева и кровельного железа с общей толщиной 7 г/см². Под магнитным зазором находились шесть поглотителей П₁—П₆. П₁ был свинцовый (45,2 г/см²), остальные были медными и имели толщины соответственно 8,9; 37,4; 16; 53,4 и 17,8 г/см². Импульс частиц, измеренный в единицах $\frac{Бэв}{c}$ был связан с их отклонением в магнитном поле соотношением $\rho = \frac{7}{\delta}$.

Проекции траекторий всех частиц были нанесены на трафареты (под трафаретом мы подразумеваем вертикальные разрезы установки, параллельный и перпендикулярный силовым линиям поля, начерченные в масштабе) и подвергались тщательному анализу. В результате удавалось установить, в каких случаях частицы испытывают неупругие ядерные взаимодействия в поглотителях П₁—П₆ и в каких случаях проходят без взаимодействия. В данном случае взаимодействия представляли собою: звезды, остановки частиц в поглотителях без видимого сопровождения и рассеяние на угол порядка 10° и больше. Взаимодействующие частицы с положительным знаком заряда отождествлялись с протонами и π^+ -мезонами, а отрицательные — с π^- -мезонами.

Измерения производились в течение 267 часов. В интервалах

импульсов $2,33 < p < 3,5$; $3,5 < p < 7$ и $7 < p < \infty$ $\frac{\text{БэВ}}{c}$ было зарегистрировано соответственно 1650; 1715 и 1448 положительных частиц. Просмотром было установлено, что из них соответственно 160, 111 и 57 испытывали неупругие ядерные взаимодействия. В этих же интервалах импульсов было зарегистрировано соответственно 1086, 1212 и 768 отрицательных частиц, из которых соответственно 5, 9 и 6 испытывали неупругие ядерные взаимодействия. Разумно предположить, что на высотах гор число π -мезонов обоого знака заряда в воздухе равны. Поэтому разность чисел положительных и отрицательных взаимодействующих частиц представляет собою число протонов, претерпевших взаимодействие в поглотителях $\Pi_1 - \Pi_6$. Согласно (²⁻⁵) при рассматриваемых здесь энергиях поперечное сечение неупругого взаимодействия нуклонов в тяжелых элементах составляет примерно 75% от геометрического сечения ядер. Следовательно, вероятность взаимодействия нуклонов в поглотителях $\Pi_1 - \Pi_6$ приблизительно равна

$1 - e^{-\frac{x}{\lambda}} = 0,68$, где $x = 45,2 \text{ г/см}^2 \text{ Рb} + 133,5 \text{ г/см}^2 \text{ Cu} = 1,52\lambda_0$, суммарная толщина поглотителей (λ_0 — пробег, соответствующий геометрическому сечению ядер); $\lambda = \frac{\lambda_0}{0,75}$ — средний пробег неупругого взаимодей-

действия. Отношение чисел взаимодействующих протонов и вероятности взаимодействия 0,68 дает число протонов в рассматриваемом потоке μ -мезонов. Для отношения чисел протонов и μ -мезонов мы получили

$$\frac{N_p(p)}{N_\mu(p)} = \begin{cases} 0,0354 \pm 0,0041 & \text{при } \bar{p} = 14 \frac{\text{БэВ}}{c} \\ 0,0546 \pm 0,0045 & \text{" } 4,66 \text{ " } \\ 0,0917 \pm 0,0061 & \text{" } 2,8 \text{ " } \end{cases} \quad (1)$$

При этих значениях импульсов, в работе (¹) для ординат дифференциального спектра μ -мезонов найдено соответственно $N_\mu(p) = 4,7 \cdot 10^{-5}$; $6,4 \cdot 10^{-4}$ и $1,74 \cdot 10^{-3}$. Отсюда, с учетом (1) для ординат дифференциального спектра энергии протонов, находим

$$N_p(E) = \begin{cases} (1,66 \pm 0,23) \cdot 10^{-6} & \text{при } \bar{E} = 13 \text{ БэВ} \\ (3,57 \pm 0,36) \cdot 10^{-5} & \text{" } 3,9 \text{ " } \\ (1,68 \pm 0,14) \cdot 10^{-4} & \text{" } 2 \text{ " } \end{cases} \quad (2)$$

Опыт II. Для определения полного дифференциального спектра на высоте 3200 м были произведены специальные измерения. В этих измерениях над магнитным зазором находился свинцовый поглотитель толщиной 32 г/см^2 , предназначенный для удаления фона позитронов из спектра протонов. Под магнитным зазором находились шесть медных поглотителей $\Pi_1 - \Pi_6$ с общей толщиной $178 \text{ г/см}^2 = 1,65\lambda_0$.

За время $t = 1,77 \cdot 10^6$ сек. измерений было зарегистрировано 6852 протона с энергией большей 30 Мэв, остановившихся в $\Pi_1 - \Pi_6$. Распределение этих частиц по их энергиям приведено в пятом столбце табл. 1. Протоны с импульсами $p < 1 \frac{\text{Бэв}}{c}$ остановились в поглотителях благодаря ионизационным потерям энергии, а при $p > 1 \frac{\text{Бэв}}{c}$ они могли остановиться вследствие неупругих ядерных взаимодействий. Последний ряд счетчиков, расположенный под поглотителем Π_6 , был соединен с каналом антисовпадений, и поэтому регистрировались лишь те частицы, которые не проходили через этот ряд, т. е. частицы, остановившиеся в поглотителях $\Pi_1 - \Pi_6$.

Итак, по наблюдаемым числам протонов при $p < 1 \frac{\text{Бэв}}{c}$ можно непосредственно построить спектр этих частиц, а для распределения этого спектра в области импульсов $p > 1 \frac{\text{Бэв}}{c}$ необходимо знать вероятность остановки протонов в поглотителях $\Pi_1 - \Pi_6$ как функцию энергии. Эта вероятность, которую мы будем обозначать буквой W , была определена из первого опыта. Это оправдано тем, что физические условия в обоих экспериментах были одинаковыми, за исключением одной несущественной разницы, состоящей в том, что поглотитель Π_1 в первом опыте был свинцовый, а во втором — медный. Общая толщина поглотителей $\Pi_1 - \Pi_6$, измеренная в единицах пробега λ_0 , соответствующая геометрическому сечению ядер, в первом опыте равнялась 1,52, а во втором опыте — 1,65. Таким образом, в смысле ядерных взаимодействий и остановок частиц, физические условия были почти одинаковы. В рассматриваемом вопросе имеют значение и размеры поверхностей поглотителей, а также рядов счетчиков, расположенных между поглотителями. В этом отношении условия были совершенно одинаковыми.

В первом опыте было найдено, что за все время наблюдения через установку прошло 84,163 и 235 протонов с импульсами $7 < p < \infty$; $3,5 < p < 7$ и $2,33 < p < 3,5 \frac{\text{Бэв}}{c}$. Здесь мы не считаем нужным вычесть фон π -мезонов. Просмотром проекций траекторий взаимодействующих частиц на трафаретах было установлено, что соответственно в 12,37 и 71 случаях протон вместе со своими вторичными продуктами остановился в поглотителях $\Pi_1 - \Pi_6$. Отсюда находим, что при импульсах $\bar{p} = 14; 4,7$ и $2,8 \frac{\text{Бэв}}{c}$ вероятность остановки соответственно равна $0,143 \pm 0,044$; $0,227 \pm 0,041$ и $0,302 \pm 0,041$. Эта вероятность изображена на рис. 1. Теперь для вычисления ординат дифференциального энергетического спектра протонов, необходимо числа

Таблица 1

Распределение остановившихся в поглотителях протонов по их энергиям и импульсам

Интервал отклонений	Интервалы импульсов	Интервалы энергий	Средняя энергия	Число наблюдаемых частиц	Светосила	Вероятность остановки	Ординаты дифференциального спектра	
							импульсный $\text{см}^{-2} \text{сек.}^{-1} \text{стер}^{-1}$	энергетический $\text{см}^{-2} \text{сек.}^{-1} \text{стер}^{-1}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26—21	0,245—0,303	0,03—0,05	0,04	105	0,732	1,00	$42 \pm 4,1$	150 ± 15
21—17	0,303—0,376	0,05—0,07	0,06	228	0,815	1,00	$65,4 \pm 4,3$	193 ± 13
17—14	0,376—0,455	0,07—0,10	0,08	369	0,875	1,00	$93,2 \pm 4,9$	221 ± 11
14—12	0,455—0,531	0,10—0,14	0,12	436	0,905	1,00	103 ± 5	234 ± 11
12—11	0,531—0,579	0,14—0,16	0,15	281	0,92	1,00	110 ± 6	220 ± 13
11—10	0,579—0,636	0,16—0,19	0,18	398	0,93	1,00	128 ± 6	252 ± 13
10—9	0,636—0,707	0,19—0,24	0,21	506	0,94	1,00	129 ± 6	208 ± 9
9—8	0,707—0,795	0,24—0,29	0,26	617	0,95	1,00	126 ± 5	209 ± 8
8—7	0,795—0,91	0,29—0,37	0,34	731	0,96	1,00	114 ± 6	162 ± 9
7—6	0,91—1,06	0,37—0,47	0,44	827	0,97	1,00	$99,7 \pm 6,3$	145 ± 9
6—5	1,06—1,27	0,47—0,64	0,60	772	0,98	0,91—0,04	$70,2 \pm 6,2$	87 ± 6
5—4	1,27—1,60	0,64—0,91	0,80	562	0,99	0,66—0,06	$41,6 \pm 3,8$	$54,5 \pm 5,0$
4—3	1,60—2,10	0,91—1,38	1,20	503	1,0	0,46—0,05	$37,3 \pm 3,5$	$39,5 \pm 4,4$
3—2	2,10—3,20	1,38—2,38	1,9	386	1,0	0,33—0,04	$18,6 \pm 2,9$	$20,5 \pm 2,5$
2—1	3,20—6,36	2,33—5,50	3,9	108	1,0	$0,23 \pm 0,04$	$2,53 \pm 0,46$	$2,56 \pm 0,44$
1—0	6,36— ∞	5,50— ∞	14	13	1,0	$0,14 \pm 0,04$	$0,055 \pm 0,023$	$0,055 \pm 0,023$

Таблица 2

К распределению протонов по их энергиям на высоте 3200 м над уровнем моря

Интервалы импульсов в Бэв/с	Средний им- пульс	Число взаимодей- ствий в потоке		Средняя кинетическая энер- гия протонов	Вероятность взаимодей- ствия	Число протонов		Отношение чисел протонов и μ -ме- зонов в воздухе	Ординаты диффе- ренциального энергетического спектра протонов $\text{см}^{-2}\text{сек}^{-1}\text{стер}^{-1}$
		положи- тельных частиц	отрица- тельных частиц			взаимо- дейст- вующих	всех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,06—2,82	2,38	76	4	1,62	0,365	72 ± 7	197 ± 19	$0,071 \pm 0,007$	$(1,58 \pm 0,15) \cdot 10^{-4}$
2,82—3,88	3,25	49	5	2,45	0,365	44 ± 6	121 ± 16	$0,049 \pm 0,006$	$(6,72 \pm 0,82) \cdot 10^{-5}$
3,88—5,20	4,45	33	3	3,6	0,365	30 ± 5	82 ± 14	$0,047 \pm 0,008$	$(3,76 \pm 0,64) \cdot 10^{-5}$
5,20—7,8	6,3	29	2	5,4	0,365	27 ± 4	74 ± 11	$0,043 \pm 0,006$	$(1,68 \pm 0,23) \cdot 10^{-5}$
7,8 — 16	10,5	18	4	9,6	0,365	14 ± 4	38 ± 11	$0,024 \pm 0,007$	$(3,12 \pm 0,91) \cdot 10^{-6}$
16 — ∞	32	15	(3)	31	0,48	12 ± 3	25 ± 6	$0,027 \pm 0,006$	$(2,7 \pm 0,7) \cdot 10^{-7}$
33,2 — ∞	66	7		65	0,48			$0,032 \pm 0,012$	$(4,5 \pm 1,7) \cdot 10^{-8}$

остановившихся протонов, приведенные в пятом столбце табл. 1, разделить на величину

$$S\omega t\sigma fW(E)\Delta E = 5,88\sigma W(E)\Delta E \cdot 10^6. \quad (3)$$

где ΔE — ширина рассматриваемого интервала энергии протонов, $t = 1,77 \cdot 10^6$ сек. — продолжительность наблюдений, S — площадь самого

Рис. 1. Зависимость вероятности остановки протонов в поглотителях от импульса $\left(\text{в } \frac{\text{Бэв}}{c}\right)$.

нижнего ряда счетчиков, ω — телесный угол установки, σ — светосила установки, $f = 0,78$ — эффективность регистрации частиц и $W(E)$ — вероятность остановки протонов в поглотителях $\Pi_1 - \Pi_6$. В этих измерениях $S \cdot \omega = 4,26 \text{ см}^2$ стеррад. В столбцах 8 и 9 приведены соответственно ординаты дифференциального спектра импульсов и энергии протонов.

Опыт III. В 1955—56 годах были произведены измерения по определению энергетического спектра μ -мезонов ⁽⁶⁾.

В этих измерениях над установкой не было вещества и полученный экспериментальный материал позволяет определить энергетический спектр протонов. По сравнению с предыдущими измерениями, импульсы частиц в этих измерениях определялись с большой точностью. Все необходимые данные приведены в табл. 2. В первых двух столбцах указаны соответственно интервалы импульсов и средние импульсы частиц. В столбцах 3 и 4 дается число взаимодействующих частиц в потоках μ^+ и μ^- -мезонов, прошедших через установку за время наблюдения. При этих измерениях под магнитным зазором находились пять графитовых поглотителей $\Pi_1 - \Pi_5$ с общей толщиной 43 г/см^2 . Ядерные взаимодействия в поглотителях устанавливались путем тщательного просмотра проекций траекторий всех частиц на трафаретах. В шестом столбце дана вероятность взаимодействия протонов в пог-

лотителях $\Pi_1 - \Pi_5$. Вероятность взаимодействия равна $W = 1 - e^{-\frac{x}{\lambda}}$, где $x = 43 \text{ г/см}^2$ и λ — пробег неупругого взаимодействия протонов. В соответствии с работами ^(3, 7, 8) для первых пяти интервалов импульсов было принято $\lambda = 95 \text{ г/см}^2$ и соответственно $W = 0,365$. Для последних двух интервалов энергии ($E > 16 \text{ Бэв}$) было предположено, что поперечное сечение неупругого ядерного взаимодействия протонов в графите равно геометрическому сечению ядра и соответственно было принято $\lambda = 67 \text{ г/см}^2$ и $W = 0,48$. Числа в столбце 7 представляют собою разность чисел положительных (столбец 3) и отрицательных (столбец 4) взаимодействующих частиц. Эти частицы отождествлялись с протонами. Общие числа протонов, имеющих в потоке μ -мезонов, даны в восьмом столбце. Они получены делением чисел предыдущего столбца на вероятность W . В девятом столбце приведены отношения чисел протонов и μ -мезонов. Умножая эти

отношения на соответствующие ординаты дифференциального энергетического спектра μ -мезонов (⁶), получаем ординаты дифференциального энергетического спектра протонов (столбец 10). При импульсах $p > 33 \frac{\text{Бэв}}{c}$ установка не позволяла определить знак частиц. В этой

области импульсов было наблюдено 388 μ -мезонов и 7 взаимодействий среди них. Отсюда находим, что отношение чисел протонов и π -мезонов к числу μ -мезонов в атмосфере равно $0,039 \pm 0,005$. В работе (⁹) определен энергетический спектр рождения π -мезонов в атмосфере. Из этого спектра было вычислено относительное число π -мезонов на высоте Арагаца, было найдено, что при энергии 66 Бэв отношение чисел π - и μ -мезонов на этой высоте равно приблизительно 0,007. Следовательно, отношение чисел протонов и μ -мезонов при $p = 66 \frac{\text{Бэв}}{c}$ равно $0,032 \pm 0,005$.

Энергетический спектр протонов изображен на рис. 2. Точки с обозначениями в виде прямоугольников, черных и светлых кружков

Рис. 2. Дифференциальный энергетический спектр протонов на высоте 3200 м над уровнем моря. По оси абсцисс отложена кинетическая энергия протонов в Бэв, а по оси ординат число протонов на $1 \text{ см}^{-2} \text{ сек}^{-1} \text{ стер}^{-1} \text{ Бэв}^{-1}$.

изображают соответственно результаты, полученные в опытах I, II и III. Полученный спектр при $E \gtrsim B_{\text{эв}}$ можно аппроксимировать формулой

$$4,6 \cdot 10^{-3} (2 + E)^{-2,8} dE, \quad (4)$$

где E — кинетическая энергия.

В заключение выражаем благодарность С. Н. Вернову и Н. М. Кочаряну за ценное обсуждение работы.

Физический институт
Академии наук Армянской ССР

Գ. Ս. ՍԱՀԱԿՅԱՆ, Զ. Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԵՎ Ա. Ս. ԱԼԵԲՍԱՆՅԱՆ

Պրոտոնների էներգետիկ սպեկտրը ծովի մակարդակից 3200 մ. բարձրության վրա

Այս աշխատանքում շարադրված են պրոտոնների էներգետիկ սպեկտրի չափման արդյունքները երեք անկախ փորձերում, որոնք կատարված են եղել 3200 մ. բարձրության վրա (Արագածում): Երկու փորձերում պրոտոնների դիֆերենցիալ էներգետիկ սպեկտրի տեսքը հնարավոր է եղել որոշել էներգիայի $E \lesssim 15$ Bev տիրույթի համար:

Երրորդ փորձում զգալի մեծացնելով մասնիկների իմպուլսների չափման ճշտությունը, պրոտոնների էներգետիկ սպեկտրի որոշումը հնարավոր է եղել տարածել մինչև $E \approx 65$ Bev էներգիաները:

Պրոտոնները տարբերվել են μ -մեզոններից ըստ այն միջուկային փոխազդեցությունների, որոնք փորձարկել են նրանք մագնիսի բևեռների բացվածքի տակ դրված կլանիչներում: Պրոտոնների հետ խառնվող π^+ -մեզոններից ազատվելու համար, կլանիչներում փոխազդեցող դրական մասնիկների քանակից հանվել են լիցքի բացասական նշան ունեցող փոխազդեցող մասնիկների քանակը (այսինքն ենթադրվել է որ π^+ և π^- - մեզոնների քանակը օղում իրար հավասար են):

Փորձի ընթացքում դիտված պրոտոնների իսկական քանակը գտնելու համար, անհրաժեշտ է գիտենալ նաև նրանց փոխազդեցություն հավանականությունները կլանիչներում: Այդ հավանականությունը որոշված է եղել մեր մի այլ աշխատանքում (?):

Բոլոր փորձերի արդյունքները ամփոփված են (1) և (2) բանաձևերում, աղյուսակներ 1-ում և 2-ում, և նկ. 2-ում: $E \gtrsim 3$ Bev էներգիաների համար նկար 2-ում

պատկերված պրոտոնների էներգետիկ սպեկտրը կարելի է մոտարկել

$$4,6 \cdot 10^{-3} (2 + E)^{-2,8} \cdot dE$$

բանաձևով, որտեղ E — չափված է Bev միավորներով:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ Н. М. Кочарян, М. Г. Айвазян, З. А. Киракосян и А. С. Алексанян., ДАН АрмССР. XX, 169, (1955). ² Н. М. Кочарян, Г. С. Саакян, М. Т. Айвазян, З. А. Киракосян и А. С. Алексанян, ДАН СССР. 107, 668, (1956). ³ Г. А. Сноу, Т. Купр, Д. А. Хилл и др. Bull. Am. Phys. Soc., 29, 54, 1954. ⁴ Л. В. Смит, С. Р. Ливит и др., Bull. Am. Phys. Soc., 28, 15, 1953. ⁵ Г. Фридлендер, Г. М. Миллер и др., Phys. Rev., 94, 727, 1954. ⁶ Н. М. Кочарян, Г. С. Саакян, ДАН АрмССР (в печати). ⁷ Н. М. Кочарян, Г. С. Саакян, А. С. Алексанян и Х. Б. Пачаджян, Известия АН АрмССР (в печати). ⁸ Т. Купр, Д. А. Хилл, В. Ф. Горняк, Л. В. Смит и Г. А. Сноу. Phys. Rev., 98, 1369 1955. ⁹ Г. С. Саакян, ДАН АрмССР (в печати).