

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Я. И. Мулкиджанян

Новый вид ежевики из Зангезура.

Species nova Rubus floraе Zangezur

(Представлено Г. Х. Бунятяном 11.X.1956)

В Зангезуре, основном батологическом районе Армении, представлено большинство видов ежевик, встречающихся в республике. За последние два года отсюда описано два новых и приведены 3 новых для флоры Армении вида ежевики.

В настоящей заметке приводится описание нового вида ежевики, которая названа нами в честь одного из лучших знатоков флоры Армении А. Л. Тахтаджяна — Ежевика Тахтаджяна.

Rubus takhtadjanii Mulk. sp. nov.-Frutex magnus, sat validus. Ramuli hornotini arcuati, 3—4 m longi, 10—15 mm crassi, obtuse costati vel canaliculato-laterati, griseo-virides, patule albo pilosi, interdum pilis solitariis glandulosis longe cauliculatis tecti. Aculei tenues, debiles, 4—5 mm longi, plani, flavidi, deorsum reclinati, basi tantum abrupte dilatati, sat numerosi subaequales, ad costas interdum ad latera dispositi. Folia ramulorum hornotinorum quina supra pilis paucis, adpressis, nitidis simplicibus tecta, viridia, subtus praeter tomentum tenue griseum patule albo pilosa, nervis elevatis, marginibus irregulariter tenuiter, serrato-dentata, dentibus apice acuminatis. Stipulae in foliorum petiolis in 5 cm a basi eorum dispositae, anguste lineares, ad 1,5—1,8 cm longae, pilosae. Petioli ad 10 cm longi, teretes, basi haud dilatati, pilosi, densius glanduloso-pilosi, aculeis minoribus caulinis conformibus densius obsiti. Foliola tenuia, apicale orbiculato-cordatum 11 cm longum et latum, basi vix sinuata vel semirotundata, apice subacuminato, petiolulo ad 6 cm longo praeditum lateralia superiora obovata, ad 10 cm longa, 6 cm lata, apice acuminata, basi rotundata, petiolulis, ad 3 cm longis, lateralia inferiora subelliptica, ad 7 cm longa, 4—4,5 cm lata, apice acuta petiolulis 0,5—1 cm longis praedita. Folia ramorum fertilium terna, foliolis eis hornotinorum minoribus. Pedunculi ad 50 cm et longiores, in inflorescentia subflexuosi, canaliculato-laterati, densius pilosi, pilis cauliculatis glandulosis numerosioribus intermixtis, aculeis eis ramulorum hornotinorum forma similibus. Inflorescentia plus minusve compacta, ad apicem angustata, in dimidio inferiore interrupta, ad apicem fere foliosa, ramulis omnibus erectis, axi plus minusve appressis, flores a 2 (in parte inflorescentiae

inferiore) ad 7 (in parte inflorescentiae media) gerentibus; sepalis oblongoovatis, apice longe acute attenuatis, dense albo tomentosus et pilosis, post anthesin deorsum incurvatis; petalis pallide roseis; staminibus filamentis tenuibus, antheris ellipticis, glabris; ovariis apice tantum pilorum fasciculo praeditis. Fructus nigri, nitidi, globosi, 1 cm in diam. et majores.

Habitatio in regionibus montanis inferiore et media; ad margines silvarum, in faucium declivibus, in argilloso-lapidosis

Typus: Armenia. Zangezur; districtus Cafan, ad declivitatem dextram angustiarum fluminis Zav, supra pagum Zav, 8—IX—1955 flores et fructus J. I. Mulkidjanian legit. In herbario nomine V. L. Comarovii Instituti Botanici Academiae Scientiarum Armeniae (Erevan) conservatur.

Area geographica Transcaucasia. Caucasus minor, ad declivitatem septentrionalem brachii jugi Megriensis.

Specimina examinata; Armenia, Zangezur, districtus Cafan; ad declivitatem septentrionalem brachii jugi Megriensis, ad declive dextrum fl. Zav, prope pagum Zav, in fluxu fluminis superiore, 8—IX—1955 J. I. Mulkidjanian legit (spec. 5).

Affinitas: Planta nostra notas omnes sectionis silvatici habet, sed locum sejectum tenet et ab omnibus speciebus ad sectionem hanc pertinentibus valde differt.

Крупный довольно мощный кустарник. Годовалые побеги дугообразно изогнутые, 3—4 м дл и 10—15 мм в поперечнике, тупо ребристые и желобчато гранистые; серо-зеленые, слабо оттопыренно бело-волосистые иногда с единичными длинностебельчатыми железистыми волосками. Шипы тонкие, слабые, 4—5 мм дл., плоские, желтоватые, вниз отклоненные, у самого основания вдруг расширенные, довольно многочисленные, почти одинаковые, расположены по ребрам, иногда некоторые шипы сдвинуты к граням. Листья на годовалых побегах пятерные, сверху с прижатыми блестящими немногочисленными простыми волосками, зеленые; снизу помимо тонкого серо-войлочного опушения слабо оттопыренно бело-волосистые, с выдающимися жилками, по краю тонко неравномерно пильчатозубчатые, зубцы на верхушке с остроконечием. Прилистники на черешках листьев в 5 мм в верх по черешку, узко-линейные до 1,5—1,8 см дл., волосистые. Черешки до 10 см дл., округлые у основания, не расширенные, волосистые, с более частыми железистыми волосками и мелкими шипами, которые не отличаются от стеблевых. Листочки тонкие; конечный округло сердцевидный, со слабо выемчатым или округлым основанием, 11 см дл., на верху с небольшим заострением, на черешочке, достигающем 6 см дл.; верхняя пара боковых листочков обратнойцевидная, до 10 см дл., 6 см шир., наверху с заострением, внизу округлые на черешочке до 3 см дл.; нижние два листочка почти эллиптические, до 7 см дл., 4—4,5 см шир., наверху острые, на черешочках 0,5—1 см дл. Листья на плодущих ветвях тройчатые, их листочки отличаются от листочков годовалых побегов лишь более

мелкими размерами. Цветоносы до 50 и более см дл., в соцветии слабо извилистые, желобчато-гранистые, более густо волосистые с примесью многочисленных стебельчатых, железистых волосков; шипы на них сходные с шипами на годовалых побегах. Соцветие более или менее компактное, к вершине суженное, в нижней половине прерывистое, облиственное почти до верху; все его веточки к оси более или менее прижатые. несут от 2 (в нижней части соцветия) до 7 цветков (в средней части). Чашелистики продолговато яйцевидные, наверху длинно остро оттянутые, густо бело-войлочные и волосистые, при отцветании вниз отогнутые. Лепестки бледно-розовые. Тычинки с тонкими нитями, пыльники эллиптические, голые. Завязи наверху с пучком волосков. Плоды черные лоснящиеся, шаровидные больше 1 см в диаметре.

Произрастает в нижнем и среднем горных поясах. По опушкам, склонам ущелий, глинистым осыпям, каменистым местам.

Тип: Армянская ССР, Зангезур, Кафанский район, правый борт ущелья р. Цав, выше с. Цав, 8—IX—1955, цветы, плоды. Я. И. Мулкиджанян. Хранится в Гербарии им. В. Л. Комарова Ботанического института АН АрмССР (Ереван).

Географическое распространение: Закавказье, Малый Кавказ, Сев склон отрога Мегринского хребта.

Виденные экземпляры:

Армянская ССР; Зангезур, Кафанский район, Сев. склон отрога Мегринского хребта, по правому борту р. Цав, близ с. Цав. вверх по течению реки. 8—IX—1955., цветы, плоды. Я. И. Мулкиджанян (5 экз.).

Сродство. Полностью укладываясь в признаки секции *silvatici*. наше растение занимает в ней обособленное положение, габитуально отличаясь от всех, входящих в эту секцию видов.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

ՅԱ. Ի. ՄՈՒԼԲԻՋԱՆՅԱՆ

Մուշի նոր տեսակ Զանգեզուրից Species nova Rubus florum Zangezur

Հոդվածում բերվում է վարդազգիների ընտանիքին պատկանող մուշ ցեղի նոր տեսակի՝ *Rubus takhtadjanii* Mulk. նկարագրութունը, որը հայտնաբերված է հեղինակի կողմից Զանգեզուրում, Ղափանի շրջանի Մավ գյուղի շրջակայքից: Մուշը թուփ է, որի միամյա ընձյուղները ունեն 10-ից մինչև 15 մմ տրամագիծ, բույս կողավոր և ակոսավոր նիստերով, երբեմն պատած եզակի մազմզուկներով: Փշերը բազմաթիվ, բարակ, թույլ՝ 4—5 մմ երկ. տափակ, դեղնավուն, դեպի ցած թեքված, հիմքի մոտ հանկարծ լայնացած համարյա միանման, դասավորված կողերի երկարությամբ կամ երբեմն նիստերի վրա: Միամյա ընձյուղների տերևները հնգաբաժան, տերևնիկները բարակ, ծայրայինը կլոր-սրտաձև, թույլ փոսիկավոր կամ բուրբաձև հիմքով, մինչև 11 սմ երկարության, վերևում թեթև սրածայր, մինչև 6 սմ երկ. կոթունների վրա: Կողային տերևների վերին գույգը հակառակ ձևաձև, մինչև 10 սմ երկ. ստորին 2 տերևները համարյա էլիպսաձև մինչև 7 սմ երկ., կարճ 0,5—1 սմ երկ. կոթունիկով: Պտղաբեր ընձյուղների տերևները եռաբաժան: Մազկակիբ ընձյուղները մինչև 50 սմ և ավելի երկ., խիտ մազմզուկավոր, բազմաթիվ զեղձային մազիկներով: Մազկարույլը բավականաչափ խիտ, գազաթի մոտ նեղացած, ներքևում՝ ընդհատվող, համարյա մինչև ծայրը տերևապատ: Ծյուղերը որոշ շափով սեղմված առանցքին. պսակը բաց վարդագույն: Առեջաթելերը բարակ, փոշանոթները մերկ. էլիպսաձև: Պտուղները սև, գնդաձև, խոշոր՝ 1 սմ-ից ավել տրամագծով, ուտվող: