

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Хнзорян

Новый жук пыльцеед из Армянской ССР
(Coleoptera, Alleculidae)

Heliotaurus emmae Khnzorian, sp. nov.

(Представлено академиком АН Армянской ССР
В. А. Фанарджяном 15. XII. 1958)

АрмССР: Уз (Сисианский р-н), у кладбища, 16. VI. 1957, 2 самца и 1 самка (сбор Э. Акрамовской). Тип в коллекциях Зоологического ин-та АН АрмССР.

Тело черное, покрыто черными волосками, основание усиков от первого до третьего, четвертого или пятого члеников, щупики, шпоры и лапки всех ног желтые, передние голени темно-бурые. Длина 6—6,5 мм. Рис. 1.

Голова поперечная, сравнительно узкая, глаза слабо выступающие из контура головы, виски кзади закругленно сужены, лоб точечный, посередине почти гладкий, покрыт торчащими волосками, направленными косо вперед. Усики достигают передней трети надкрылий. Челюстные щупики самца слабо расширены к вершине, у самки почти цилиндрические. Переднеспинка в 1,5 раза шире длины, кпереди сужена больше, чем кзади, неравномерно рассеянно точечная с гладкими зеркальцами на диске и длинными торчащими волосками; все ее края окаймлены, кайма бокового края очень тонкая, этот край не отогнут, задние углы тупые, обозначены резко. Надкрылья узкие, блестящие, в два раза длиннее общей ширины, покрыты точечными рядами, промежутки которых несут такую же точечность, как и сами ряды; волосистость надкрылий косо торчащая, хорошо заметна по бокам и в вершинной половине



Рис. 1. *Heliotaurus emmae* Khnzorian, sp. nov. Вид сверху.

диска. Эпиплевры цельные, широкие, достигают пришовного угла. Ноги покрыты густыми прилегающими, средние и задние, кроме того, менее густыми длинными торчащими волосками.

Вторичные половые признаки. Самец: передние голени снутри с густой светло-желтой бахромкой из коротких волосков, начинающейся в основной трети и кончающейся у вершины голени. 5-й стернит брюшка с большим широким вдавлением, 6-й также с большим вдавлением и двумя клешнями, острие которых почти прямоугольное; вырезка между клешнями неглубокая, почти треугольная. У самки внешний край передних голеней покрыт густыми черными шипиками. Последний стернит вытянут в длинный отросток, последний тергит с цельным краем, без срединной вырезки.

Этот вид—первый представитель рода *Heliotaurus* Muls. в фауне Советского Союза. От прочих видов этого рода легко отличается окраской и малыми размерами тела, в частности, у немногочисленных прочих одноцветно черных видов этого рода усики окрашены иначе.

Позволяю себе назвать этот вид именем Эммы Герасимовны Акрамовской, обнаружившей его.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ս. Մ. ԽՆՁՈՐՅԱՆ

Նոր փոսեհափկակեր բզեզ Հայկական ՍՍՌ-ից
(Coleoptera, Alleculidae)

Նկարագրվում է ՍՍՌ-ի ֆաունայի համար նոր տեսի նոր ներկայացուցիչ—*Heliotaurus emmae*, գտնված է. Գ. Ակրամովսկայայի կողմից Ուզ դյուզի (Սիսիանի շրջան) շրջակայքից:

