ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. Д. Азатян

Синтез кетонов в присутствии металлического алюминия

(Представлено Академиком АН АрмССР А. Л. Минджояном 14.IV.1959)

Ранее нами сообщалось о применении металлического алюминия в реакции алкилирования галоидопроизводными ароматических соединений: углеводородов (¹), галоидариллов, фенола, эфиров фенола и др. (²).

Развивая эти исследования, мы установили, что металлический алюминий, без предварительной активации и без прибавления к нему промоторов, пригоден в качестве катализатора также для получения кетонов из галоидангидридов кислот и ароматических углеводородов и их разнообразных производных (галоидариллов, эфиров фенолов и ароматических кислот и др.).

Как известно, при подобных синтезах с применением хлористого алюминия последнего берется в реакцию большое количество, иногда — моль и даже более на моль хлорангидрида кислоты, применяемого для ацилирования, а реакция проводится почти всегда в растворителе.

При применении металлического алюминия вместо хлористого алюминия катализатора требуется ничтожное количество и не требуется растворителя; проведение синтезов этим способом проще и экономичнее, чем проведение ее с хлористым алюминием; при этом выходы кетонов в ряде случаев не уступают выходам, получаемым при применении для этой цели безводного хлористого алюминия.

Нами установлено также, что в присутствии металлического алюминия с ароматическими соединениями вступают в реакцию и такие соединения, как, например, $XCH_2COOC_2H_5$, XCH_2COAr , XCH_2COX ($X = Cl, Br$), с образованием соответствующих соединений.

Оказалось, что другие соединения, содержащие в своей молекуле активный водород, например, малоновый и ацетоуксусный эфиры, в присутствии металлического алюминия также вступают в реакцию с галоидангидридами кислот с выделением галоидоводорода и образованием соответствующих кето-эфиров.

В настоящей работе сообщается о бензоилировании мета-ксилола, кумола, дифенила, аценафтена, бромбензола, анизола, фенетола, ди-

Реагенты в г (молях)		Количество катализатора		прод. нагрева
		в г	в г-ат	
м-кислот, 15,9 (0,15)	хлористый бензол 12,0 (0,085)	0,05	0,019	8
Кумол, 12,0 (0,1)	14,0 (0,1)	0,02	0,0074	8
Дифенил, 15,4 (0,1)	14 (0,1)	0,02	0,0074	8
Аценафтен, 15,4 (0,1)	14,0 (0,1)	0,02	0,0074	3
Бромбензол, 15,7 (0,1)	14,0 (0,1)	0,05	0,0185	15
Анизол, 10,8	14 (0,1)	0,015	0,0056	3,5
Фенетол, 7,0	8	0,02	0,0074	
Дифениловый эфир, 10,4 (0,065)	8,5(0,06)	0,02	0,0074	8
Этилмаломат, 16 (0,1)	14 (0,1)	0,02	0,0074	4

* 82,9%—считая на прореагировавший аценафтен

** 78,86%—считая на прореагировавший аценафтен

Продукт реакции	Выход		Т. к. в С/мм	Т. пл. в С/мм	Литературные данные	
	в г	в %			т. кип. в С/мм	т. плавл. в °С
2,4-диметил-бензофенон	12.72	65.1	173— —175/9	—	180/10(3a) 190—195/11(3б)	—
4-изопропил-бензофенон	13.9	62.4	198— —200/18	—	200—204/20(4)	—
4-бензоил-дифенил	9.6		255— —257/18	100—101	—	102(5)
3-бензоил-аценафтен	20.1	68.37*	245— —255/14	84—85	260—390	85(6a) 98—99.5(6б)
4-бромбензофенон	10.5	40.0	121— —126/9	81	—	82(7)
4-бензоил-анизол	15.6	73.86	187— —193/9.5	61—62	—	61—62(8)
4-бензоилфенетол	8.9	68.5**	204— —208/20	—	242(9)	—
4-фенокси-бензофенон	8.3	50.0	—	71	—	71(10)
монобензоилмалонат	14.4	54.0	185— —188/11	—	194—195/14(11)	—

фенилового эфира, а также диэтилмалонового эфира. Константы полученных соединений совпадают с таковыми, приведенными для них в литературе.

Выходы синтезированных соединений составляют 40—74% теоретического количества, считая на взятый в реакцию, а иногда и до 83% считая на вошедший в реакцию хлорангидрид. Как и в случае применения хлористого алюминия, образуются почти исключительно пара-замещенные кетоны.

Экспериментальная часть. Опыты проведены методом с применением аппаратуры, описанными нами ранее (1,2). Металлический алюминий брался в количестве 0,0056—0,019 г-атома на моль хлорангидрида кислоты.

Реакция начиналась через несколько минут после начала нагревания. Нагревание реакционной смеси до температуры ее кипения продолжалось 2—15 часов.

Реакционная смесь в случае бромбензола, дифенила, ацетофенона и малонового эфира подвергалась перегонке без обычной предварительной промывки подкисленной водой и просушки.

Условия проведенных опытов, выходы и константы полученных соединений сведены в приводимой ниже таблице.

Выводы: 1. Для синтеза ароматических кетонов из мета-ксилола, кумола, дифенила, аценафтена, бромбензола, анизола, фенетола и дифенилового эфира применен металлический алюминий без предварительной активации и без добавления промоторов, в отсутствие растворителя.

Количество металлического алюминия, примененного для проведения реакций, составило от 0,0056 до 0,019 г-атома на моль хлористого бензоила.

В качестве ацилирующего компонента применен хлорангидрид бензойной кислоты. Выходы синтезированных соединений составляют 40—73,86% теоретического количества, считая на взятый хлористый бензоил.

2. Установлено, что хлористый бензоил в присутствии металлического алюминия и в отсутствие растворителя вступает в реакцию с диэтиловым эфиром малоновой кислоты с выделением хлористого водорода и с образованием монобензил-диэтилмалонового эфира.

Институт органической химии
Академии наук Армянской ССР

Վ. Դ. ԱԶԱՏՅԱՆ

Կենսոճնեղի սխեմեզ՝ մենադական ալյումինիումի հերկայուքյամբ

Մենք արդեն հաղորդել ենք ածխաջրածիւնների հալոգենային ածանցյալներով արոմատիկ միացութիւնները նախապես չակտիվացրած և պրոմոտորներ չափելացրած մետաղական ալյումինիումի օդնությամբ ալկիլելու մասին:

Զարգացնելով այդ հետազոտությունները, մենք պարզեցինք, որ մետաղական ալյումինիումը նույն կերպ կարելի է հաջողությամբ գործադրել նաև արոմատիկ միացություններից և թթուների հալոգենանհիդրիդներից կետոններ ստանալու համար:

Ինչպես հայտնի է, նման սինթեզներում գործադրվում է մեծ քանակությամբ ալյումինիումի ջրազուրկ տրիքլորիդ, երբեմն մեկ մոլ՝ թթվի քլորիդի մեկ մոլի դիմաց. լուծիչի միջավայրում:

Ալյումինիումի տրիքլորիդի փոխարեն մետաղական ալյումինիում գործադրելիս պահանջվող մետաղի (կատալիզատորի) քանակությունը շնչին է. իսկ ուսկցիան էլ հաջողությամբ ընթանում է լուծիչի բացակայությամբ, ընդ որում սինթեզվող կետոնների կլթերը մի շարք դեպքերում ավելի պակաս չեն, քան ալյումինիումի տրիքլորիդի գործադրության դեպքում: Թված առավելություններին պետք է ավելացնել նաև, որ այս եղանակով սինթեզներ կատարելն ավելի պարզ է ու հարմար, տնտեսապես ավելի շահավետ, քան ալյումինիումի տրիքլորիդի օգնությամբ կատարելը:

Պարզել ենք նաև, որ մետաղական ալյումինիումի ներկայությամբ արոմատիկ միացությունների հետ ուսկցիայի մեջ են մտնում նաև այնպիսի միացություններ, ինչպես օրինակ, $XCH_2COOC_2H_5$, XCH_2COAr , XCH_2COX ($X = Cl, Br$). Պայացնելով համասպատասխան միացություններ:

Պարզված է նաև, որ մոլեկուլի մեջակտիվ ջրածին պարունակող այլ միացություններ ևս, օրինակ՝ մալոնաթթվական և ացետաքաղախաթթվական էսթերները, մետաղական ալյումինիումի ներկայությամբ նույնպես ուսկցիայի մեջ են մտնում թթուների հալոգենանհիդրիդների հետ. արձակելով հալոգենաջրածին և դոյացնելով համասպատասխան կետո-էսթերներ:

Ներկա հոդվածում նկարագրում ենք մետա-քսիլոլի, կումոլի, դիֆենիլի, ացենաֆթենի, բրոմբենզոլի, անիզոլի, ֆենետոլի, դիֆենիլթերի և մալոնաթթվական էսթերի բենզոլումը: Գործադրված ալյումինիումի քանակությունը և զեղ է բենզոլի քլորիդի մոլի դիմաց 0,0036—0,019 գ-ատոմ: Սինթեզված նյութերի ելքերը կազմում են տեսականի 40—74%: Ստացվել են համարյա բացառապես պարա-տեղակայված կետոններ:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ В. Д. Азатян, ДАН СССР, 59, 901 (1948); Изв. АН АрмССР (серия физ.-мат. и естеств. наук), № 8, 81 (1946). ² В. Д. Азатян, ДАН АрмССР, XXV, № 5, 235 (1957); Изв. АН АрмССР (ХН), XII, 161 (1959). ^{3a} А. Клагес, Г. Ликрот, Бер., 32, 1565 (1899); ^{3b} Л. М. Сморгонский, ЖОХ, 21, 655 (1951). ⁴ А. Клагес, П. Аллендорф, Бер., 31, 1000 (1898). ⁵ Р. И. Гиллеспи, И. А. Лейстен, J. Chem. Soc., 1954, I. ⁶ Л. Ф. Физер, Е. В. Гертберг, J. Am. Chem. Soc., 61, 1272 (1939). ⁷ И. Огата, М. Тсуишита, J. Org. Chem., 20, 1631 (1955). ^{8a} И. Х. Фельдман, А. И. Цицер ЖОХ, 23, 441 (1953); ^{8b} Г. Буртон, П. Ф. Г. Преил, J. Chem. Soc., 1937, 529. ⁹ Л. Гаттерман, Р. Эрхардт, Г. Маши, Бер., 23, 1206 (1890). ¹⁰ Г. Е. Юнгнейд, Э. Ф. Клайн, Э. У. Крейндалл, J. Am. Chem. Soc., 75, 3333 (1953). ¹¹ Л. Клайзен, Lieb. Ann., 291, 72 (1896).