Э. М. Кегеян

О радиальном поведении аналитических функций в круге

(Представлено академиком АН Армянской ССР А. Л. Шагиняном 30/V 1963)

Пусть D —единичный круг в комплексной плоскости z , S —единичная окружность и E —некоторое замкнутое множество точек на S .

Обозначим через B класс аналитических в D функций, ограниченных по модулю единицей.

По известной теореме единственности ограниченных аналитических функций, если $f(z) \not\equiv 0$ в круге D , то из соотношения

$$\lim_{r \rightarrow 1} f(re^{i\theta}) = 0 \text{ при } \theta \in E,$$

следует, что $\text{mes } E = 0$ ⁽¹⁾.

Если $\text{mes } E = 0$, то всегда можно построить ограниченную аналитическую в D функцию, равномерно стремящуюся к нулю на радиусах θ при $\theta \in E$ и $r \rightarrow 1$ ⁽²⁾.

Обозначим

$$\mu(R) = \sup_{\substack{\theta \in E \\ 0 < r < R < 1}} |f(re^{i\theta})|.$$

В настоящей заметке исследуется допускаемая скорость стремления к нулю функции $\mu(R)$ при $R \rightarrow 1$ для функции класса B , отличной от тождественного нуля.

Этот вопрос хорошо исследован для множества E , состоящего из одной точки. Законченные результаты в этом направлении получены А. Л. Шагиняном ⁽³⁾.

Пусть $\mu(r)$ ($\mu(0) \leq 1$)—действительная положительная функция, определенная в промежутке $(0, 1)$, которая, строго убывая, стремится к нулю при $r \rightarrow 1$. Пусть, далее, E —замкнутое множество точек на окружности S с нулевой линейной мерой и $C_S E$ —дополнение к E относительно окружности S . $C_S E$ —открытое множество, состоящее из конечного или бесконечного числа интервалов

$$C_S E = \sum_{(k)} (a_k, b_k). \tag{1}$$

При этом, если $\delta_k = b_k - a_k$, то будем предполагать, что

ПА-5165

$$\delta_{k+1} \leq \delta_k \quad \text{при } k = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Обозначим через $B(\mu, E)$ совокупность функций $f(z) \neq 0$ из класса B , удовлетворяющих условию

$$|f(re^{i\theta})| \leq \mu(r) \quad (3)$$

при $\theta \in E$ и $0 < r < 1$.

Определим номер $N(r)$ из условий

$$\delta_k > \frac{1-r}{2} \quad \text{при } k = 1, 2, \dots, N(r), \quad (4)$$

$$\delta_k \leq \frac{1-r}{2} \quad \text{при } k \geq N(r) + 1.$$

Далее, определим последовательность положительных чисел $\{\gamma_k\}$ следующим образом:

$$\gamma_k = \begin{cases} \frac{1-r}{4} & \text{при } k \leq N(r) \\ \frac{\delta_k}{2} & \text{при } k > N(r) \end{cases} \quad (5)$$

Для функции из класса $B(\mu, E)$ можно утверждать следующее:

Теорема 1. Для каждой функции из класса $B(\mu, E)$ имеет место следующее неравенство:

$$\ln |f(0)| \leq \frac{1}{\pi} \sum_{(k)} \gamma_k \ln \left[\mu(r) + \frac{4\gamma_k [\mu(2r-1)]^2}{1-r} \right].$$

Доказательство. Пусть $e^{i\varphi_0} \in E$ и $z_0 = re^{i\varphi_0}$, где $0 < r < 1$.

Если $|z - z_0| \leq \frac{1-r}{4}$, то

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|\zeta - z_0| = \frac{1-r}{2}} |f(\zeta)| \frac{|z - z_0|}{|\zeta - z| |\zeta - z_0|} |d\zeta|. \quad (7)$$

Для оценки $|f(\zeta)|$ на окружности $|\zeta - z_0| = \frac{1-r}{2}$ предположим, что

$\arg \zeta \leq \varphi_0$, и рассмотрим полукруг $\gamma(r, z_0): \{|z - z_0| < 1 - r; \arg z \leq \varphi_0\}$.

Граница $\gamma(r, z_0)$ состоит из полуокружности $J_1: \{|z - z_0| = 1 - r; \arg z \leq \varphi_0\}$ и из отрезка $J_2: \{z = |z|e^{i\varphi_0}, 2r - 1 \leq |z| \leq 1\}$.

Так как $f(z) \in B(\mu, E)$, то из (3)

$$|f(z)| \leq \begin{cases} 1 & \text{на } J_1 \\ \mu(2r-1) & \text{на } J_2, \end{cases}$$

так что по теореме о двух константах (4) получим, что

$$|f(\zeta)| < [\mu(2r-1)]^{\omega(\zeta, J_2, \gamma(r, z_0))} \quad (8)$$

при $|\zeta - z_0| = \frac{1-r}{2}$, где $\omega(\zeta, J_2, \gamma(r, z_0))$ — гармоническая мера отрезка J_2 в точке ζ относительно полукруга $\gamma(r, z_0)$.

Для таких ζ

$$\omega(\zeta, J_2, \gamma(r, z_0)) \geq \frac{2}{\pi} [2 \operatorname{arctg} 2 - 1], \quad (9)$$

так что из (8) и (9) получается следующая оценка на окружности $|\zeta - z_0| = \frac{1-r}{2}$:

$$|f(\zeta)| < [\mu(2r-1)]^2, \quad (10)$$

где $0 < \alpha < 1$ — абсолютная константа.

Из (7), (3) и (10) при $|z - z_0| < \frac{1-r}{2}$ и $|z| = r$ получим

$$|f(z)| < \mu(r) + |z - z_0| [\mu(2r-1)]^2 \cdot \frac{4}{1-r} <$$

$$< \mu(r) + |\varphi - z_0| \frac{4[\mu(2r-1)]^2}{1-r}, \quad (11)$$

где $\varphi = \arg z$.

Но так как $\ln |f(z)|$ — субгармоническая функция в D , то для каждого r ($0 < r < 1$), учитывая (1), (11) и (4), получим

$$\begin{aligned} \ln |f(0)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(re^{i\varphi})| d\varphi = \frac{1}{2\pi} \sum_{(k)} \int_{a_k}^{b_k} \ln |f(re^{i\varphi})| d\varphi \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \sum_{(k)} \left\{ \int_{a_k}^{a_k + \gamma_k} \ln \left[\mu(r) + (\varphi - a_k) \frac{4[\mu(2r-1)]^2}{1-r} \right] d\varphi + \right. \\ &\quad \left. + \int_{b_k - \gamma_k}^{b_k} \ln \left[\mu(r) + (b_k - \varphi) \frac{4[\mu(2r-1)]^2}{1-r} \right] d\varphi = \right. \\ &= \frac{1}{\pi} \sum_{(k)} \gamma_k \ln \left[\mu(r) + 4 \frac{\gamma_k [\mu(2r-1)]^2}{1-r} \right] + \\ &\quad + \frac{(1-r)\mu(r)}{4\pi[\mu(2r-1)]^2} \sum_{(k)} \ln \left[1 + \frac{4\gamma_k [\mu(2r-1)]^2}{\mu(r)(1-r)} \right] - \frac{1}{\pi} \sum_{(k)} \gamma_k. \end{aligned}$$

Отсюда и получается доказываемое неравенство, если учесть, что $\ln(1+x) < x$ при $x > 0$.

Теорема 2. Если

$$\lim_{r \rightarrow 1} N(r) (1 - r) \ln \mu(2r - 1) = -\infty, \quad (12)$$

то класс $B(\mu, E)$ пуст.

Действительно, пусть наоборот, $f(z) \in B(\mu, E)$ и m -порядок нуля этой функции в точке $z=0$. Тогда функция

$$\varphi(z) = \frac{f(z)}{z^m}$$

будет принадлежать классу $B(\mu_1, E)$, где функция $\mu_1(r)$ определяется следующим образом:

$$\mu_1(r) = \begin{cases} 1 & 0 \leq r \leq r_1 \\ \frac{\mu(r)}{r^m} & r_1 < r < 1. \end{cases} \quad (13)$$

Здесь r_1 -корень уравнения $\mu(r) = r^m$. Кроме того, $\varphi(0) \neq 0$.

Учитывая (4) и (5), из теоремы 1 получаем

$$\begin{aligned} \ln |\varphi(0)| &\leq \frac{1}{2\pi} N(r) (1 - r) \ln \{ \mu_1(r) + 2 [\mu_1(2r - 1)]^\alpha \} = \\ &= \frac{\alpha}{2\pi} N(r) (1 - r) \ln \mu(2r - 1) + \frac{1}{2\pi} N(r) (1 - r) \ln 2 - \\ &- \frac{\alpha \cdot m}{2\pi} N(r) (1 - r) \ln r + \frac{1}{2\pi} N(r) (1 - r) \ln \left\{ 1 + \frac{\mu(r)}{2r^{m(1-\alpha)} [\mu(2r - 1)]^\alpha} \right\}. \end{aligned}$$

Отсюда и следует утверждение теоремы 2, так как из (4)

$$N(r) (1 - r) \leq \sum_{(k)} 2\delta_k = 4\pi$$

и из (13)

$$\ln \left\{ 1 + \frac{\mu(r)}{2r^{m(1-\alpha)} [\mu(2r - 1)]^\alpha} \right\} \leq \frac{1}{2}$$

при $r_1 < r < 1$.

Из результатов статьи (3), в частности, следует, что ни одна аналитическая и ограниченная в D функция, кроме тождественного нуля, не может стремиться к нулю на радиусах круга D при $r \rightarrow 1$ со скоростью

$$\exp \left\{ -\frac{P(r)}{1 - r} \right\}$$

при условии

$$\lim_{r \rightarrow 1} P(r) = +\infty.$$

Этот результат можно получить и из (12). Если взять вместо E одноточечное множество, тогда $N(r) = 1$. Следовательно,

$$\lim_{r \rightarrow 1} N(r) (1 - r) \ln \mu(2r - 1) = \lim_{r \rightarrow 1} (1 - r) \frac{-P(2r - 1)}{2(1 - r)} = -\infty$$

и по теореме 2 эта функция не принадлежит к $B(\mu, E)$, значит, она тождественно равна нулю.

Из (12) можно получить и следующий результат:

Теорема 3. Пусть

$$\mu(r) = \exp \left\{ -\frac{1}{1-r} \right\}.$$

Для того чтобы $B(\mu, E)$ не был пустым, необходимо и достаточно, чтобы множество E было конечным множеством.

Действительно, если E состоит из точек $e^{i\alpha_k}$ ($k=1, \dots, m$), то не трудно видеть, что функция

$$f(z) = \exp \left\{ \sum_{k=1}^m \frac{1}{ze^{-i\alpha_k} - 1} \right\}$$

принадлежит классу $B(\mu, E)$, чем и достаточность условия теоремы доказана.

Для доказательства необходимости предположим, что E — бесконечное множество. Тогда, очевидно, $\lim_{r \rightarrow 1} N(r) = +\infty$. Следовательно,

$$\lim_{r \rightarrow 1} N(r) (1-r) \ln e^{-\frac{1}{2(1-r)}} = -\infty$$

и по теореме 2 класс $B(\mu, E)$ пуст.

Интересно установить и следующее:

Теорема 4. Как бы медленно функция $\mu(r)$ не стремилась к нулю при $r \rightarrow 1$, можно построить на S такое замкнутое множество E меры нуль, чтобы класс $B(\mu, E)$ был пуст.

Для доказательства этой теоремы установим следующую лемму.

Лемма. Для каждой положительной функции $\varphi(r)$, которая монотонно возрастая, стремится к $+\infty$ при $r \rightarrow 1-0$, можно построить последовательность невозрастающих положительных чисел $\{\delta_k\}$ такую, что

$$1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k < 1,$$

$$2) \quad \overline{\lim}_{r \rightarrow 1-0} (1-r) N(r) \varphi(r) > 0,$$

где $N(r)$ определяется из (4) с помощью последовательности $\{\delta_k\}$.

Доказательство. Пусть $n_0 = 0$. Возьмем номер n_1 настолько большим, чтобы

$$\varphi \left(1 - \frac{1}{2n_1} \right) > 2,$$

и пусть

$$\delta_1 = \delta_2 = \dots = \delta_{n_1} = \frac{1}{2n_1}$$

Если номер n_k уже выбран, то возьмем $n_{k+1} > n_k$ настолько большим, чтобы

$$\varphi\left(1 - \frac{1}{2^{k+1}n_{k+1}}\right) > 2^{k+1},$$

и пусть

$$\delta_{n_k+1} = \delta_{n_k+2} = \dots = \delta_{n_{k+1}} = \frac{1}{2^{k+1}}.$$

Последовательность невозрастающих чисел $\{\delta_k\}$ удовлетворяет следующим условиям:

$$1) \quad \sum_{m=1}^{\infty} \delta_m = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{i=n_k+1}^{n_{k+1}} \delta_i \right) < \sum_{k=0}^{\infty} n_{k+1} \frac{1}{2^{k+1}n_{k+1}} = 1.$$

$$2) \quad \text{при } r_k = 1 - \frac{1}{n_k 2^{k+1}} \text{ имеем}$$

$$N(r_k)(1 - r_k)\varphi(r_k) > n_k \cdot \frac{1}{n_k 2^{k+1}} \cdot 2^k = \frac{1}{2},$$

так что

$$\overline{\lim}_{r \rightarrow 1} N(r)(1 - r)\varphi(r) \geq \frac{1}{2}.$$

Переходя к доказательству теоремы, возьмем функцию $\varphi(r) = [-\ln \mu(2r - 1)]^{1/2}$ в условии леммы и построим последовательность чисел $\{\delta_n \downarrow 0\}$, для которой

$$\overline{\lim}_{r \rightarrow 1} N(r)(1 - r) \sqrt{\ln \frac{1}{\mu(1r - 1)}} > 0.$$

Но тогда

$$\lim_{r \rightarrow 1} N(r)(1 - r) \ln \mu(2r - 1) = -\infty. \quad (14)$$

Рассмотрим промежуток $J: 0 < \varphi < \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k$ (по лемме $\sum_{k=1}^{\infty} \delta_k < 1$) и систему интегралов $\{(a_k, b_k)\}_j$, где

$$1) \quad b_k - a_k = \delta_k$$

$$2) \quad (a_k, b_k) \subset J \quad k = 1, 2, \dots$$

$$3) \quad (a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset, \text{ если } i \neq j$$

и пусть

$$E = J - \sum_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k).$$

Из (14) и из теоремы 2 следует наше утверждение относительно множества E .

Երևանский государственный университет

Է. Մ. ՔԵԶԵՅԱՆ

Շրջանում անալիտիկ ֆունկցիաների սառավղային վարքի մասին

Դիցուք D -ն $|z| < 1$ շրջանն է, իսկ S -ը $|z| = 1$ շրջանագիծը կոմպլեքս հարթության վրա:

Թող $\mu(r)$ -ը ($\mu(0) < 1$) լինի մոնոտոն նվազող դրական ֆունկցիա, որը ձգտում է զրոյի երբ $r \rightarrow 1$, իսկ E -ն՝ զրո չափի փակ բազմություն S -ի վրա:

Նշանակենք $B(\mu, E)$ -ով միավոր շրջանում միարժեք անալիտիկ $f(z)$ ֆունկցիաների դասը որոնք բավարարում են

$$|f(re^{i\varphi})| < \mu(r)$$

անհավասարությանը երբ $e^{i\varphi} \in E$:

Ներկա աշխատանքում հետազոտվում է $\mu(r)$ ֆունկցիայի զրոյի ձգանջու թույլատրելի արագությունը, որի դեպքում $B(\mu, E)$ դասը դատարկ չէ:

ЛИТЕРАТУРА — ԿՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ F. и M. Riesz, Über die Randwerte einer Analytischen Function. 4 Cong. Scand. Math., 1916 (опублик в 1918). ² И. И. Привалов, Граничные свойства аналитических функций, Гостехиздат. М.—Л., 1950. ³ А. Л. Шагинян, Известия АН АрмССР, т. XII, № 1 (1959). ⁴ Неванlinna, Однозначные аналитические функции, М. - Л., Гостехиздат, 1940.