

Ա. Մ. ԿՈԹՈՂՅԱՆ

ՄԵՂՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
ՆՐԱՆՑ ԴԵՍ



ՍՏՈՒԳՎԱԾ Է 1961

638.15

Կ-63

Ա. Մ. ԿՈՒՐԿՅԱՆ

ՄԵՂՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԵՎ

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ՆՐԱՆՑ ԴԵՄ

14279
A 2
19295

А. КОТОГЯН
**БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ И МЕРОПРИЯТИЯ
БОРЬБЫ С НИМИ**

(На армянском языке)

Ереван, Армгиз, 1949 г.

ՄԵԳՎԻ ԷԽԼԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մեղվաբուժական տնտեսություններում խոշոր շարիք են պատճառում մեղվի հիվանդությունները, որի հետևանքով լինում են խոշոր կորուստներ: Անասնաբուժական պատվյունների գոկտոր Վ. Ի. Պոլտեվը հաշվել է, որ Միության մասշտաբով մեղվի հիվանդությունները տարեկան կորուստ են տալիս մոտավորապես՝

ա) մեղր 220,5 տոննա:

բ) մոմ 10,5 » ,

գ) մեղվի քնտանիքներ 220.000 հատ:

Վերևում բերված թվերից երևում է, որ կորուստը չափազանց մեծ է: Մեղվի հիվանդություններից այս կամ այն տեսակը, այս կամ այն չափով տարածված են ամբողջ Միության մեջ, մի տեղում շատ, մյուս տեղում քիչ, օրինակ՝ Հեռավոր Արևելքում մեղվի վատխոտ հիվանդությունը բոլորովին չկա:

Հաշտատանը նույնպես դերը չէ այդ շարիքից. մեր տարբեր շրջանների մեղվանոցներում հիվանդության գրեթե բոլոր հիմնական տեսակները կան: Հիվանդություններն ավելի շատ ավելի են գործում հատկապես այս վերջին տարիներում:

Հիվանդությունների այսպիսի լայն տարածումը և նրա հասցրած հսկաչափան վնասներն ստիպում են մեզ՝ մեղվապահներին, ուսումնասիրել ոչ միայն հիվանդությունների առաջացման և տարածման պատճառները, այլև սրտել նրանց նշանները և նրանց դեմ պայքարելու ձևերը:

Բնագիտաբանական ավելի հեշտ է նախազգուշանալ, կանխել հիվանդություններն ու նրանց տարածումը, քան թե հիվանդ քնտանիքներին բուժելը:

Հաստնացած մեղուներն ու նրանց թրթուրները կարող են հիվանդանալ իրենց բոլոր հասակում, մեղուների հիվանդություններ լինում են վարակիչ և ոչ վարակիչ: Վարակիչ հիվանդություն-

ների ժամանակ մի մեղվից հիվանդությունն անցնում է մյուս մեղվին, մեկ թրթուրից մյուս թրթուրին և մեկ ընտանիքից մյուս ընտանիքին: Վարակիչ հիվանդություններն առաջացնում են միկրոբներ կամ բակտերիաներ և հատուկ պարագիտներ, որոնք անտեսանելի են հասարակ աչքին, նրանց հնարավոր է տեսնել միայն խոշորացույցների և մանրադիտակների (միկրոսկոպներով) օգնությամբ: Վարակիչ հիվանդությամբ վարակված ընտանիքները մեծ քանակությամբ մեղուներ են կորցնում, իսկ փտախոտով վարակված լինելու դեպքում ոչնչանում են նրանց թրթուրները, հարսնյակները, որի պատճառով այդ ընտանիքները չափից ավելի թուլանում են և էթն ժամանակին միջոցներ ձեռք չառնվեն, ամբողջ ընտանիքներ կհանգեն:

ՀԱՍՈՒՆԱՑԱԾ ՄԵՂՎԻ ՀԻՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1. ՄԵՂՎԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Հասունացած մեղվի հիվանդության հետ գործ ունենալուց պետք է հիշել, որ սկզբնական շրջանում նրա հայտնաբերումն աչքան էլ դյուրին չէ, ինչպես փտախոտի, ալյսինքն թրթուրների հիվանդությունն իր առաջին շրջանում հայտնաբերելը:

Մեղվապանը հասունացած մեղվի հիվանդությունները նկատում է միայն այն ժամանակ, երբ հիվանդ ընտանիքները թուլացել, ալյսինքն կորցրել են արդեն մեծ քանակությամբ մեղուներ, և դտնվում են անկման ճանապարհին: Հիվանդ ընտանիքներն աչքան են թուլանում, որ անմիջապես աչքի են ընկնում, օրինակ՝ եթե ընտանիքը մի քանի օր առաջ պտտում էր 10 շրջանակ, իսկ մերջին ստուգման ժամանակ, նա փոխանակ ավելացնելու, պտտում է 3—4 շրջանակ: Դրա համար անհրաժեշտ է հիվանդության առաջին արտաքին նշաններից հետո հետևել նրան, բայց պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, այն է հիվանդության արտաքին նշաններից դժվար է բնորոշել հիվանդության տեսակը, դրա համար էլ անհրաժեշտ է անպայման ճիշտ դիագնոզը դնել միմյալն մանրադիտակի միկրոսկոպի օգնությամբ, ալյսինքն լաբորատոր քննությամբ հետո:

Այս հիվանդությունը սուր-վարակիչ հիվանդություն է հասունացած մեղուների համար, առաջին անգամ 1904 թ. հայտնվել է Անդլիայի մի փոքրիկ կղզում (Ուայոտ), որտեղ մասսայական կերպով ոչնչացրել է մեղվի բնառնիքները:

Այս հիվանդության պատճառների հարուցիչը հայտնվեց միայն 1920 թ. Մեռ-ի կողմից:

Պարզվեց, որ այս հիվանդությունն առաջին բերում փոքրիկ միկրոսկոպիկ ազեր, որոնք մեղվի շնչառության անցքերի, տրախեաների պարադիտներն են, այս ազերը կոչվում են ախար, ապիս, կամ մեղվի ազեր, որոնք ունեն 0,2 մմ մեծություն:



Նկ. 1.

Ակարոզային ախ (խիստ մեծացրած)

A) էգ, B) արու:

Այս հիվանդությունը, ինչպես նաև մյուս հասունացած մեղվի վարակիչ հիվանդությունները, հայտնվում են դարձանք. այն ընտանիքները, որոնք շատ վարակված են, մեղուների մի մասը իջահանդի ձմռանը, իսկ մյուս մասը, ձմեռանոցից դուրս դնելուց հետո: Թույլ վարակված մեղուները կարող են ամբողջությամբ չհաղկել կամ աննկատելի քանակությամբ մեղուներ կորցնել:

Այս հիվանդությունը կարող է շատ ուժեղ նեբոզործել, երբ կատարվի կլիմայական ուժեղ փոփոխություն, ցրտերից հետո տաք եղանակներ, կամ բուքից հետո ցուրտ, նամանավանդ անբարենպաստ տարիներում:

Հիվանդության նշանները կայանում են նրանում, որ տնհատ մեղուները թուլանալով կորցնում են իրենց թռչելու ընդունակությունը, թռչելու գեպքում բնկնում են գետնին և սկսում են սողալ արկանոցի մոտ. նրանց թևերի վրա նկատվում է փոփոխություն, դա բացատրվում է նրանով, որ տրախեաները կորցնելով իրենց առանձնահատկությունը հնարավորություն չեն տալիս թևերին աշխատելու:

Վարակված մեղուների թռչելուց դուրս է գալիս կոշտ ձայն, ինչպես բոռի ձայնն է:

Ակաբող հիվանդության տարածումը.— Այս հիվանդությունը տարածվում է հիվանդի և առողջի անմիջական շփման միջոցով. էգ. տիղը միաշնակ սողում է առողջ մեղվի վրա և այնտեղից մտնում շնչառության անցքը:

Ապացուցված է, որ մեղվի տիղը չի լինում ո՛չ մեղրահացերի, ո՛չ փեթակի մասերին և ո՛չ էլ (որդ ու ձվերի) ձվերի, փրթուրների և հարսնյակների վրա, նույնիսկ ուժեղ վարակված ընտանիքներում: Լեյնումենայնիվ պետք է զգուշ լինել հիվանդ ընտանիքի գույքը սգոագործելու ժամանակ, պետք է ծծմբի ծովա տալ, որից հետո տալ առողջ ընտանիքներին:

Այս հիվանդությամբ կարող են վարակվել ինչպես աշխատավոր, այնպես էլ բոու և մայր մեղուները: Մեղուները վարակվում են տղերով միայն ջահել ժամանակ, ամենից շատ նոր ծնված մեղուները՝ 87%-ով, մի օրեկան մեղուները՝ 73%-ով, երկու օրեկան մեղուները՝ 54%-ով, երեք օրեկանները՝ 40%-ով, չորս օրեկանները՝ 16%-ով, հինգից ինն օրեկանները՝ 2—3%ով, 12 օրեկանից բարձր մեղուները բոլորովին չեն վարակվում: Եթե տիղը վարակում է մեծահասակ մեղվին, ապա տիղը մտնում է շնչառության անցքից ներսում, շկարողանալով կաշկել արտախչանների պատերին, նորից դուրս է գալիս:

Ակաբող հիվանդության բուժումը.— Այս հիվանդությունը միակն է, որի բուժման համար օգտագործվում են դեղատոնք: Մինչև բուժման անցնելը պետք է կատարել հետևյալ միջոցառումները հիշտ անտորոշելու (զիազնող) համար:

Յուրաքանչյուր ընտանիքից պետք է վերցնել 30—50 կենդանի կամ նոր մեռած մեղու և այդ ընտանիքից վերցրած նմուշը պետք է դնել թղթե ծրարի կամ լուցիկ տուփի մեջ, որոնց վրա նշանակել մեղվանոցի հասցին, ընտանիքի համարը և նմուշ վերցնելու ժամանակը: Հալարած նմուշները պետք է դնել տախտակա կամ թիթեղյա արկղի մեջ, ամուր փակել կափարիչով (վարակը չտարածելու նպատակով) և շտապ կերպով ուղարկել ամենամոտիկ դիագնոստիկ լաբորատորիան: Արկղի վրա պետք է պարզորոշ դրել լաբորատորիայի և ուղարկողի հասցեն: Առանձին ուղարկվող նմուշում պետք է գրել մեղվանոցի տիղը, կամ մեղվաբույժը պետք է մանրամասնորեն նկարագրի հիվանդ լինելու մեջ կասկածվող մեղվի ընտանիքների արտաքին նշանները, նրանց բանակը և իր հասցին:

ՄԵՂՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՖԲՈՈՒԻ ՀԵՂՈՒՆՈՎ

Ֆրոուի Հեղուկով մեղուների բուժումը կախում ունի նրանում, որ փեթակի մեջ մտցրած ֆրոուի Հեղուկի թունավոր գոլորշիները մտնում են մեղվի շնչառության գործարանները և աշխտեղ սպանում են մակարածող (սպարաղիա) տզին, զգալի վնաս չհասցնելով մեղվին:

Ֆրոուի խառնուրդի պատրաստելու եղանակը՝

1. Վերցնում են 2 մաս նիտրոբենզոլ.
2. » » 2 » մաքուր բենզին (ավիացիոն).
3. » » 1 » սաֆրուրի (սապարակի) ձեթ:

Այդ երեք նյութերի խառնուրդը տալիս է սուր հոտ ունեցող մի Հեղուկ, որը հրապարում է մեղուներին և նպաստում է գոլորշիների զարգացմանը մեղվանոցում: Ֆրոուի խառնուրդը թունավոր է, փնտախար մարդու շնչառության ուղիների համար և հեշտությամբ բացառվում է, այդ պատճառով խառնուրդի հետ շատ զգույշ պետք է լինել: Ֆրոուի խառնուրդը պետք է պահել հով տեղ, հեղված և պարաֆինած խցաններով, գոլորշի սրվակներում և սրբփակի վրա մակագրել «Թույն»:

Նկատելի ունենալով, որ նիտրոբենզոլն ու բենզինն արագ գոլորշիանում են, նպատակահարմար է խառնուրդը պատրաստել զործածելուց անմիջապես առաջ՝ անհրաժեշտ եղանակով խառնուրդը պատրաստելիս բենզինն ավելացնել վերջում:

ԴԱԳԱՆ, ԲԼԱՏԻ ՓԵՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԸՆՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՖԲՈՈՒԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ԴՈՋԱՆՆԵՐԸ

Ֆրոուի Հեղուկով մեղուներին տկարուկից բուժելու համար զործ են ածվում միատեսակ դրական հետևանքներ տվող տարբեր զուգանքներ:

Փեթակի մեջ կարելի է մտցնել հեղուկ՝

- ա) երկու անգամ 5-ական խոր. սմ, 2 օր ընդմիջումով,
- բ) երեք օրվա ընթացքում օրական 3 խոր. սմ,
- գ) չոթ օրվա ընթացքում օրական 1,8 խոր. սմ,
- դ) հինգ օրվա ընթացքում ախտավորված ընտանիքին օրը

մեջ տալ 30-ական Հալիլ կամ թե 6 օրվա ընթացքում օրական 20-ական կալիլ: Իսկ լանդստրոտի փեթակներում ապրող ընտա-

նիքների համար վերը նշված դուղաները բիշ պետք է փոփոխել: Օրեկան պետք է տալ 2,5 խոր. սմ, ընդամենը 9 խոր. սմ-ի փոխարեն տալ 7,5 խոր. սմ:

Փեթակն ու շրջանակները և փեթակում գտնված բոլոր առարկաները, պետք է 5—7 օրով առանձնացնել մեղունների համար անմատչելի տեղ, որից հետո միայն կարելի է նրանց օգտագործել մեղվաբուծական տնտեսություն մեջ: Ֆրոուի հեղուկով բուժումը կարող են կատարել միայն հատուկ որակավորված աշխատավորներ:

ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՄԵԹԻԼՍԱԼԻՑԻԼՍՈՎ

Վինտերգինի մեթիլսալիցիլատի սինթետիկ ձեթն անգույն, կամ բաց դեղնագույն հեղուկ է, ուժեղ, յուրահատուկ հոտով: Մեթիլսալիցիլատը սպանում է մեղունների շնչափողերում գտնված բոլոր տիզերին: Նրա փոքր դուղաներն ավելի պակաս թունավոր են, քան թե ֆրոուի հեղուկը. բուցավառվող չեն, մեղունների և թրթուրների վրա ակնհայտ վնասակար ազդեցություն չունեն և մեղունների մեջ զոդություն չեն առաջացնում:

Նախքան բուժումը պետք է կատարել հետևյալ նախապատրաստական աշխատանքները՝

ա) պարզել ընտանիքի ուժը (շրջանակների քանակը, թե քանի շրջանակ է պատում մեղուն, ձվերով, թրթուրներով և հարսնյակներով, մեղրահացների քանակը, մեղրի պաշարը և այլն) և փեթակի առջևի պատի վրա նշանակել ընտանիքի ուժի համեմատ դեղանյութի դոզան.

բ) ոտուգել կերի պաշարը և քանակը հասցնել առնվազն 4 կգ.

գ) փեթակում եղած բոլոր ճեղքերը ծեփել (ծեփանով, կավով և այլն).

դ) պատրաստել յուրաքանչյուր ընտանիքի համար 15—20 սմ երկարությամբ, 7 սմ լայնությամբ և 7 մմ բարձրությամբ մետաղաքանցից փանդակ, որի մեջ լցնել բամբակ, որպեսզի բամբակի վրա լցված դեղանյութը մետաղաքանցով մեղուններից անջատվի.

ե) ճշտորեն չափված դեղանյութը պետք է լցնել «դ» կետում նշված պատրուկի կամ բամբակաշերտի վրա և խսուղյա սրկանոցի անցքով մտցնել փեթակը:

Մեթիլալիցիլատը պետք է տալ երեք շաբաթվա ընթացքում երկու օրը մեկ անգամ, երեկոները, երբ մեղուների թոխքը պաղարել է: Դոզաները հետևյալներն են՝ թուլ ընտանիքների համար (1—6 շրջանակ պատուղ մեղու) ամեն անգամ 6 խոր. ամ, միջակ ընտանիքներին (7—9 շրջանակ պատուղ) 7,5 խոր. ամ, ուժեղ ընտանիքներին (10—12 շրջանակ պատուղ) 8,5 խոր. ամ, կորսվածներով (վերնահարկերով) ընտանիքներին 10 խոր. ամ:

Բժշկության ընթացքում մեղվի ընտանիքը 10 անգամ ստանում է նրա համար սահմանված դոզան, որը կազմում է 60—100 խոր. ամ դեղանյութի:

ՄԵԳՎԻ ՆՈՋՆՄԱՏՈՂ ՀԻՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նոզեմատուզը.— Սա հասունացած մեղվի վերին աստիճանի վարակիչ հիվանդություն է, որն առաջացնում է նոզեմա պարազիտը, սրի հետևանքով թուլացնում է ընտանիքները և երբեմն ոչնչացնում ամբողջ մեղվանոցներ: Սովորաբար այս հիվանդությունը մեղուները հիվանդանում են զարնանք:

Նոզեմա հիվանդությունը տարածված է Հայաստանի մի շարք շրջաններում (որի մասին մինչև օրս ճշգրիտ տվյալներ չկան), տարածված է նաև Միություն մեջ զանազան երկրամասերում և Սվրոպայում:

Նոզեմայով հիվանդ ընտանիքներն աստիճանաբար կորցնելով աշխատավոր մեղուներին, այնքան են թուլանում, որ շատ հաճախ նրանցից ոչ միայն բերք չի ստացվում, այլև պետք է նրանց կերակրել որպեսզի ձմռանը ապրեն: Այսպիսի մեղվի ընտանիքին մեղվապահն ուժեղ ընտանիքներից օգնություն տալով, ուժեղացնում է, շատ հաճախ տեսնելով, որ այդ էլ չի օգնում, լուծարքի է ենթարկում ամբողջ ընտանիքը:

Նոզեմա հիվանդությունը որոշ ընտանիքներում սկսում է վարչանալ ձմեռանոցային շրջանի երկրորդ կեսին, հատկապես արագ չափով վարակը տարածվում է ընտանիքներում, երբ ձմեռող մեղուն առաջին անգամ սկսում է մաքրել իր վերջնադիրում կուտակված կղկղանքը. փեթակում այս հիվանդության մաքսիմալ վարքացումը գնում է զարնան առաջին երկու ամիսներին, որից հետո սկսում է ուժեղ անկում:

Այս հիվանդության նշաններն ուսումնասիրելիս պետք է ու-

շարունակումն դարձնել ոչ միայն առանձին-առանձին մեղքի, այլև ամբողջ ընտանիքի ախտաբանության վրա: Նոգեմաշով տառապող մեղուների մեջ նկատվում է օրգանիզմի րնդհանուր թուլություն, սրանք դառնում են թեղիքի անընդունակ, չկարողանալով ոտքերով ամուր կաշնել շենքերին, ընկնում են հատակին, ինչըր դողողում են (թունավորումից), որովայնը ուռած, տուգած (փորակապուժյունն և այլն), բայց այսպիսի նշաններ լինում են նաև ուրիշ հիվանդության դեպքում, երբ մեղուները նստած վիճակում վերջնադիքը դատարկում և արտաթորում են փեթակի մեջ մեղրահացերի վրա:

Նոգեմաշով հիվանդացած մեղուների որովայնը լինում է ուռած, նրանց վերջնադիքը լցված է լինում պինդ և երբեմն ջրալի կաթնասպիտակավուն արտաթորանքով, եթե աղպիսի մեղվի որովայնը սեղմենք ջրալի կղկղանքը դուրս կցայտի մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա, սրի նոտը լինում է թխու, իսկ շարացած վիճակում՝ նման է քիսիտտի (բռնոթի) հոտին:

Նոգեմաշով հիվանդ մեղվի ընտանիքի արկանոցի առաջ, գետնի վրա, նկատվում են մեծ քանակությամբ թափված կենդանի մեղուներ, սրանք թևերը թափահարելով սողում են մեղվանոցում. նրանք շեն կարողանում թռչել, խմբերով հավաքվում են փեթակի մոտ քարերի, խոտերի վրա, մեռած մեղուներ նկատվում են փեթակի արկանոցի տախտակի վրա կամ մոտը, մեջքի վրա պառկած՝ ստները գեպի վերև:

Պարնան ընթացքում հիվանդության ամենատիպիկ նշանը նանդիսանում է հիվանդ ընտանիքների հասունացած մեղվի խոշոր հորուստը, ընտանիքների աճեցողության բաժնեկանալու փոխարեն նկատվում է նվազում և թուլացում, երբեմն նույնիսկ ընտանիքը անգում է, դրա համար էլ մեղվի ընտանիքը պետք է պահուստի, սրպեսդի հիվանդության դեպքում շուտ նկատվի ընտանիքի թուլացումը: Այս հիվանդության հարուցիչը հանդիսանում է միջբնիշտիկն պարագիտը, որը մեղվի կերամարսողության օրգանի հիվանդություն է: Նոգեմա հիվանդությունը հայտնաբերվել է 1909 թ.: Նոգեմաշի հարուցիչները վերին աստիճանի վարակիչ են. լեկնելով մեղվի ստամոքսը նրանք վարակում են բոլոր հասակի, բոլոր տեսակի մեղուներին և վարակումը կարող է տեղի ունենալ տարվա բոլոր եղանակներին:

Այս հիվանդությունը մեղվանոցում կարող է տարածվել մեղ-

վապահի անփութության, մասնագիտությունը չտիրապետելու հետեանքով կամ մեղուների և բոռերի միջոցով, երբ հիվանդ ընտանիքի վարակված մեղուն կամ բոռը մոտում են առաջ փեխակները:

Այս հիվանդությունը կանխման համար խոշոր նշանակություն ունեն պրոֆիլակտիկ միջոցառումները, որա համար բոլոր մեղվա-նոցներում պետք է կատարել հեռեկալ միջոցառումները:

Նոզեմալից վարակված (անապահով) մեղվանոցները հաշտ-նարկելու համար անց են կացվում մեղվանոցների և մեղվարն-տանիքների բնույթով:

Քննություն համար մեղունների յուրաքանչյուր ընտանիքից ուղարկում են լաբորատորիա 50 մեռած (հանգած) մեղու: Նոզե-մատուղի առկայությունն ստուգելու համար մեղունների նմուշները քննության պետք է ուղարկել մեղվի բնտանիքները գտնադրող ձմե-սանոցից դուրս գնելուց անմիջապես հետո:

Նոզեմատուղից կորուստ ունեցած մեղունների ընտանիքները ձմեռանոցից դուրս հանելուց մի քանի օր հետո տեղափոխել (թափ առլ) մաքուր և վերականգնված փեխակների մեջ և առլ նրանց մաքուր, աշնանից ախտահանված մեղրահացեր, փեխակում մնացած ձվով, թրթուրներով և հարսնյակներով շրջանակների ձու-ղիկները խնամքով քերել առանձին արկղի մեջ և սրբել ֆորմալինի 10 տոկոսանոց լուծույթում թրջած շորով, սրից հետո ֆորմալինի խոր հեռացնելու համար շրջանակների ձուղիկները մաքրել նաշա-ղիրի 1 տոկոսային լուծույթում թրջած ուրիշ շորով:

Նայած ձվերի, թրթուրների և հարսնյակների դուրս գալու ընթացքին, աչք մեղրահացերն անհրաժեշտ է տեղափոխել բնի-կերին, իսկ դրանցից ազատվելուց հետո անսպաժման մեղրահացերը հեխակից հեռացնել և եխարկել ախտահանման:

Ամառվա ընթացքում նոզեմատուղային մեղվանոցների բոլոր ընտանիքներում կատարվում է բների լրիվ փոփոխում, կամ մեղու-ներին թափ է արվում զլխավոր բերքից առաջ:

Այն շրջաններում, որտեղ նոզեմատուղ է սահմանված և դա կազմում է մեղվանոցների 50% -ից ավելին, առողջացնող միջո-ցառումներն անց են կացվում բոլոր մեղվանոցներում:

Մեղունների նոզեմատուղային ընտանիքների մայրերն ամեն տարի պետք է փոխարինվեն երիտասարդ և զուգավորված (բեղմնա-վորված) մայրերով:

Բներից ազատված, փորձուծից կեղտոտված, հնացած, գոր-
ւածովյան համար անպետք ամբողջ մեղրահացերը ենթարկվում
են հալման: Նոպեմատողալին պիտանի մեղրահացերը մաքրվում
և ախտահանվում են ֆորմալինի 4%-ալին լուծույթում, 3—4 ժամ-
վա ընթացքում 20—25⁰-ից ոչ պակաս ջերմությամբ ամուր ծած-
կված տաշտակի կամ ուրիշ ամանի մեջ: Ֆորմալինով ախտահա-
նելուց հետո մեղրահացերը խնամքով ըլսացվում են նաշապրի
ուպիրտի թուլլ լուծույթում, մեղրաքառ մեքենայով քամվում և
օդափոխվում է մեղուների համար անմուտչելի տեղ, մինչև հոտի
խառն վերանալը (1—3 օր):

Նոպեմատողալին ընտանիքներից մեկը քամելուց հետո
մեղրահացերի ախտահանումը կատարվում է ֆորմալինի 4%-ալին
լուծույթով:

Ֆորմալինի 4%-ալին լուծույթը սրահելու միջոցով մեղրահա-
ցըն ախտահանելիս, աշխատանքը կատարվում է հակազազով:
Ձեռքերը փշանալուց զերծ պահելու համար, դործ են անում ու-
տինե ձեռնոցներ, կամ ձեռքերին քսում են վազելին:

Այն տեղերում, որտեղ մինչև զլխավոր մեղրաբերքը չի կա-
ռարվել բների փոփոխումը կամ թափ տալը, զլխավոր բերքահա-
վաքի ավարտվելուց հետո, գարնանից հիվանդ բոլոր ընտանիքնե-
րին պետք է տեղափոխել մաքուր, վարակազերծված մեղրահացե-
րով փեթակների մեջ ու նրանց ծածկել մաքուր ծածկոցներով և
աշնանը կերակրել շաքարաջրով: Բույնը խառցեն և մեղվի ընտա-
նիքի մեծության չափով և առաջ առաջացումներ:

Մեղվանոցը համարվում է առողջ և սահմանափակումները
նրա վրայից վերցվում են, եթե հետևյալ գարնան սեզոնին անց-
կացրած մեղուների հմուռների և գարնանը դուրս հանելուց հետո,
կենդանի մեղուների լաբորատոր քննությունը տվել է բացասա-
կառն արդյունք:

ՀԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ՄԵՂՎԻ ՈՉ ՎԱՐՍԿԻՉ ՀԻՎԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նրիտասարդ մեղուներն իրենց կերակրող հասակում, (2—13
օրեկան, հաճախ 6—11 օրեկան) փեթակից դուրս են գալիս և
թափառում նրա շուրջը: Այս հիվանդությունը սովորաբար նկատ-
վում է մայիս ամսին, մի անգամից ցուրտ եղանակներից հետո:

այս հիվանդությունը կարող է լինել նաև աշնանը: Այս հիվանդությունը վարակիչ չէ և լավ եղանակներին անցնում է:

Ամենից ցայտուն և տիպիկ օրինակը, որով հիվանդությունը կարելի է տարբերել մյուս սողացող մեղուներից, դա հիվանդ մեղվի վերջնագլխի դրոշմանն է, նա սովորաբար լցված է լինում չոր ծաղկափոշով այնքան, որ քիչ է մնում պայթի, շնայելով, որ մի շարք մեղուների կլկվածքը կարող է լինել ջրիկ:

Հիվանդության պատճառները.— Վերջնագլխի ծաղկափոշով լցվելը նրանից է, որ խնամող մեղուններն ուտում են մեծ քանակությամբ ծաղկափոշի, որպեսզի ուժեղացնեն. կերակրող զնվճերի զործունեությունը: Դա վերադրում են ծաղկափոշու ազդեցությանը, երբ նա փչացել է ցրտից կամ խոնավությունից:

Բորբոսից թունավորված մեղունների նշանները (փեթակներին տրվում է բորբոսնած մեղրահացի մաքրելու համար) հիշեցնում է մալիսյան հիվանդությունը: Խնամող մեղունները փորձում են մեղրի և ջրի պահանջը բավարարել մեծ քանակությամբ ծաղկափոշի և տեղով, որի հետևանքով շատ չոր կեր ուտելուց առաջանում է փորկապ հիվանդությունը:

Պաչաբի միջոցները.— Հանդիպելով մալիսյան հիվանդության ծանր աստիճանին, անհրաժեշտ է մեղուններին կերակրել տաք ջրով շաքարաջրով (1 կգ շաքար, 1 կգ ջուր), որով կդադարի նրանց հիվանդությունը: Խորհուրդ է տրվում, որպես հախաղցուչական միջոց, մեղվանոցում ունենալ լավ ջրամաններ, որոնք լցված լինեն գաղջ (գոլ) ջրով կամ ջրամանները. ապահովված լինեն քամուց: Պետք է խուսափել գարնանը մեղվի ընտանիքներում բորբոսնած չեչեր պահելուց կամ օդատադործելուց:

Մեղվի ԹԹՈՒՐԻ (ՈՐԴԻ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Մեղվի թրթուրների (որդերի) հիվանդությունները հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի՝ բաց թրթուրների (որդի) փտախտ կամ հլոթալական փտախտ և հարանյակների (փակ որդի) փտախտ կամ ամերիկյան փտախտ: Այս հիվանդությունները տարածված են ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ կան մեղրատու մեղուններ, բացառությամբ Հիւսսիւր Արևելքից, այս հիվանդությամբ մեղվի բնատանիքները վարակվում են տարվա դարնան երկրորդ կեսերից և ամռան ամիսներին, երբ ընտանիքներում կա մեծ քանակությամբ

(թրթուր) որդ: Այս վարակիչ հիվանդութիւնները ձվերի վրա չեն ներգործում, որովհետեւ ձվի տառչանը համեմատաբար ամէլի ամուր է, իսկ երկրորդն էլ ձվային շրջանը կարճ է. ընդամենը 3 օր:

ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՓՏԱԽՏ ԿԱՐ ԷՍԲՈՅԱՆԵՐԻ (ՓԱԿ ՈՐԳԻ) ՓՏԱԽՏԸ

Ամերիկյան փտախտը մեղ մոտ կոչւում է նաեւ փակ, որով փտախտ, այս հիվանդութիւնը սուր վարակիչ է, որով հիվանդահում են մեղվի թրթուրները (որդերը): Ամերիկյան փտախտն ամենից շատ վնաս է հասցնում մեղվի բնտանիքներին ամռան ամիսներին, նրանց շատ թուլացնում է և եթէ մարդկանց կողմից օգնութիւն չստանա, հիվանդ բնտանիքն ամբողջութեամբ կոչնչանա:

Այս հիվանդութիւնն առաջանում է շատ դիմացկուն սպոր առաջացնող միկրոբ, որը կոչւում է լարվիլի բացիլ (*bacillus lar-*



նկ. 2.


Կարվեյի բացիլ.

Ամերիկյան փտախտի բացիլներ:

vea), որն իրենից ներկայացնում է կլոր ծալերով ձողիկներ, որոնք անբարենպաստ պայմաններում պատենովորվում են և դառնում սպոր:

Ամերիկյան փառախտի սպորը կարող է դիմանալ տառնյակ տարիներ: Այս սպորները 1000 եռացրած ջրի մեջ կախած կդիմանան 11 րոպե, անընդհատ եռացող մեղրի մեջ կախված կոչնչանան 1—2 ժամում: Արևի ուղիղ ճառագայթները չոր սպորին կոչնչացնեն 28—41 ժամվա ընթացքում, իսկ մեղրի մեջ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ սպորը կդիմանա 4—6 շաբաթ:

Ամերիկյան փառախտի ախտանշանները.— Առաջին նշանները երևում են ալն ժամանակ, երբ սերեկած բջիջների մեջ թրթուրները կամ հարսնյակներն արդեն մեռել են և սկսել քայքայվել, մեռած հարսնյակների սերեկների գույնն սկսում է փոխվել և աստիճանաբար փոս ընկնել ու ծածկվել. մեռած հարսնյակների սերեկները մեղուներն սկսում են քանդել, վարակված թրթուրը (որդը) բջիջների մեջ սկսում է զորշ գույն ստանալ և կորցնել իր բը-




Նկ. 3.

Ամերիկյան փառախտով մեռած թրթուրների տեսքը բջիջների մեջ:

նակաճ կապտասպիտակ գույնն ու կլոր ձևը: Բրթուրն (որդն) աստիճանաբար նեխելով, փտելով ստանում է ավելի մուգ գույն գույն կամ սրճագույն տեսք և կաշում է ցածի պատին:

Երկրորդ ամենացայտուն ախտանշանն այն է, որ եթե այդ մեռած թրթուրների (որդերի) փտած, նեխած զանգվածին մոտեցնենք մի լուցկու կամ մի փայտի ձող և խառնելով բարձրացնենք դեպի վեր, այդ զանգվածը կաշելով լուցկու ձողին մի քանի սանտիմետր կծորա, կձգվի դեպի վեր:




Նկ. 4.

Երրորդ ախտանշանը ամերիկյան փտախտով մեռած թրթուրի հատուկ հոտն է, որը նմանվում է հյուսնի հալած սոսինձի (կլելի) հոտին. դրա համար էլ այս հիվանդությունը կոչվում է նաև վարչահոտ փտախտ: Մեռած թրթուրը (որդն) աստիճանաբար չորանալով կորցնում է իր մածուցիկությունը ու հոտը և վերածվելով թեփուկի, կաշում է բջի ցածի կողքի պատին ամբողջ երկարությամբ: Վերջինս շատ ամուր կաշում է բջիջի պատերին, իսկ մեղուները չեն կարողանում այդ մաքրել, և ահա սարակ մեռած թրթուրը, նեխած-փտած վիճակում, նույնպես կաշում է բջիջների ցածի պատին ամբողջ երկարությամբ և ունի մածուցիկ, կաշող հատկություն, որի հետևանքով մեղուները չեն կարող մաքրել բջիջներից:

Չորրորդ ախտանշանն այն է, որ մեղրահացի վրա ձվի թրթուրի և հարսնյակի (որդի ու ձվի) դասավորությունն անկասկած է լինում:

Մենք հարանյակի լեզուն առաջին կգտնվում է լինում բջիջի վերին կողմին և նույնությամբ էլ մնում է նույնիսկ նրա թևիկները վերացվելուց հետո: Սովորաբար ամերիկյան փառախոտով վարակվում են նաև մալրացու և բուսացու թրթուրները (որդերը): Վարակման



Նկ. 5.

Ամերիկյան փառախոտով վարակված որդերի ընդհանուր տեսքը (առանձինի և բջիջների ծակծկված կափարիչները):

սկզբնական շրջանում, նույնիսկ վարժ մեկվապաշր չի նկատույն ձևանդ բջիջները, հետագայում հոր մեկունները մեռած թրթուրների (որդերի) հարանյակի սերեկները բաց են անում, այդ ժամանակ անմիջապես աչքի են ընկնում բջիջում մեռած թրթուրները (որդերը), հարանյակները: Ամերիկյան փառախոտով վարակված ընտանիքն աչլու չի առուջանա, որովհետև մեռած թրթուրները (որդերը) վերածվելով սոսինձանման նյութի, կաշում են բջիջների տատերին այնքան ամուր, որ այնտեղից հեռացնելը մարդկանց և մեղսների միջոցով հնարավոր չէ, դրա համար էլ վարակված դանդվածը միշտ մնում է այնտեղ բջիջներին կապած:

Ուսեղ վարակված ընտանիքներում աստիճանաբար կրճատվում է դուրս եկող մեկունների քանակը, որը գնալով հասնում է չնչին քանակության, սրովհետև թրթուրները (որդերը) հարանյակ վիճակում մեռնում են և դրանից շատ քչերն են զարգանում, մեղսները դուրս գալիս, դրա համար էլ ընտանիքում ափելի շատ է մեռնող մեկունների քանակը, քան թե նոր դուրս եկող մեկուններինը

Այստեղից պարզվում է, թե ինչու փտախտով վարակված ընտանիքներն արագ թուլանում են սովորաբար ամուսնը կամ աշնանը և ամբողջությամբ հանգում են ձմեռներ, կամ վաղ զարնանք: Թույլ վարակված ընտանիքները կարող են ձմեռել, բայց նրանց մաս չիվանդությունն սկսում է հայտնվել ոչ թե ամուսնը, կամ զույնան երկրորդ կեսերին, այլ համեմատաբար ավելի շուտ:

Ամերիկյան փտախտը.— Տարածվում է շատ դանդաղ և վարակված ընտանիքն ալեկա չի առողջանում, եթե մարդն օդնութիան չգա, հիվանդ ընտանիքը վաղ թե ուշ կհանգի:

Աղբից մեղուները փորձում են մեռած խրիտրի (որդի) հարսնակի դիակը բջիջներից հանել, բայց որովհետև նրանք ամուր կրպած են սրտերին, ուստի նրանց մաքրելն, ինչպես մենք տեսանք, դժվար է, բայց որոշ մեղուներ ալ վարակը վերցնում են իրենց վրա և դրանով վարակում են մեզը, որով և վարակում են խրիտրներին (որդերին):

Հիվանդության տարածման համար ավելի վտանգավոր է այն մեղրը, որը դռնվում է հիվանդա խրիտրներով (որդերով) մեղրուհայերի բջիջների մեջ:

Ամերիկյան փտախտ հիվանդությունը տարածում են նաև փեթակում ապրող կամ ներս ու դուրս անող որոշ պարազիտներ և միջատներ. օրինակ՝ մոմի ցեցը, կրեռը, մրջյունը և այլն:

Այս հիվանդությունը մեղվանոցում ընտանիքից ընտանիք խմբականում անցնում է մեղուների գոլություն միջոցով, — ուժեղ նստանիքները հարձակվելով հիվանդությունից թուլացած ընտանիքի վրա թաղանում և ալգպիտով վարակվում են: Այստեղ քիչ դեր չի խաղում նաև մեղվապահը, երբ մի ընտանիքից մյուս ընտանիքին շրջանակով ուժ կամ կերպաշար է տալիս, կամ ձմեռանոցում հանգած ընտանիքի մեղրահոցերը բաժանում է տողը ընտանիքներին և ալապիտով վարակում նրանց:

Հիվանդությունը տարածվում է նաև այն ժամանակ, երբ մեղվապահը հիվանդ ընտանիքին ստուգելուց հետո, առանց ձեռքերը կամ գործիքներն ախտահանելու, ստուգում է առողջ ընտանիքները:

Նախազգուշության համար մեղվանոցների կազմակերպման օրից պետք է ձեռք առնել բոլոր միջոցները, որպեսզի հիվանդության օջախ չստեղծվի մեղվանոցում: Դրա համար խոշոր ուշադրություն պետք է դարձնել ուրիշ տեղից գնված մեղուների վրա,

դնելուց առաջ պետք է լավ ստուգել և ապա վերցնել: Ուրիշ տեղից գույք, կամ ինվենտար դնելուց պետք է լավ ակտաճանել և ապա դրանց մեղվանոցում օգտագործել:

Անխտաբակաւ միջոցառումներ.— Այս հիվանդության դեմ պայքարելու միակ միջոցառումը մեղուներին հիվանդ փեթակից հեռացնելն է, որը կոչվում է թափ տալ: Մեղուները հիվանդ փեթակից առաջ անխտաբակում են մաքուր և ակտաճանված փեթակի մեջ, որտեղ նրանք նորից սկսում են իրենց համար նոր բույն և նոր մեղրահացեր կառուցել, և ախտեղ դարդացնել առողջ ձվեր, թրթուրներ և հարսնյակներ (որդ և ձվեր):

Այս թափ տալու մեթոդի էությունը դա հիվանդ ընտանիքին արհեստականորեն բնական ձագի պայմանների մեջ դնելն է. երբ հիվանդ ընտանիքին թափ ենք տալիս հիվանդությանից զերծ մի նոր փեթակի մեջ, այդ թափ տալու ժամանակ մեղուներն զգալով որոշ վտանգ, անմիջապես իրենց մեղրատարից լցնում են մեղրով, թափ տված մեղուները թողնում ենք դատարի փեթակում առանց մեղրահացերի, առանց կերի 48 ժամ, այն հաշվով, որ մեղուներն իրենց մեղրատարիում եղած մեղրի սրտ մասն օգտագործեն որպես իրենց կենսապահ: կեր՝ մի մասով կերակրեն մորը, բոռերին և բացի դրանից սրտ մասն էլ օգտագործեն որպես լրացուցիչ կեր՝ մոմ արտադրելու համար:

Այդ ընտանիքներին երկու օրից հետո նորից թափ ենք տալիս մի ուրիշ նոր ակտաճանված փեթակի մեջ և անմիջապես տալիս ենք մոմաթերթեր, որոնց բջիջների կառուցելը կտևի 1—2 օր. մայրն այդ բջիջների մեջ կսկսի ձվեր դնել, մեղուները սրանց կըսկսեն կերակրել միայն 3 օրից հետո, այն էլ կախահյուսվով, որը զերծ է հիվանդության հարուցիչներից. ուրեմն, եթե հաշվելու լինենք այդ ժամանակաշրջանը, կստացվի հետևյալ պատկերը, որ մեղուներն իրենց մեղրատարիկերում վերցրած մեղրը կամա-ակրամ օգտագործում են 5—7 օրվա ընթացքում, մինչև նոր թրթուրների (որդերի) խնամքը: Այստեղից վստահ կարելի է ասել, որ մեղվի մեղրատարիում եղած հին փեթակից վերցրած մեղրը բոլորովին չէր կարող մնալ առանց օգտագործելու, ուրեմն 5—7 օր հետո նոր թրթուրներին (որդերին) արդեն նրանք կսկսեն կերակրել դաշտից բերած թարմ նեկտարով, որը զերծ է վարակից:

Բազմաթիվ փորձերը ցույց են տվել, որ հախտազուլակա մի-

ջոյնների լրիւ և ձշգրիտ կերպով կիրառւում է թափ տւած ընտանիքներից նոր հիվանդացողներ հազվագյուտ են պատահւում:

Ամերիկյան փտախտի դեմ պայքարը կազմակերպելիս պետք է աշխատանքները դասավորել այնպես, որ հիվանդ ընտանիքներից ամբողջութեամբ և շինովին վերացվեն վարակի աղբյուր հանդիսացող միկրոօրգանիզմները, այդ նպատակով պայքարի գործադրման ընթացքում լինել վերին աստիճանի զգուշ և աշխատանքները կատարել շատ արագ: Զգուշ պետք է լինել նրա համար, որ մեղվանոցում գոլդություն կամ հարձակում առաջ չգա, հետո ոչ մի վարակւած նշույթ, փնթակ, շրջանակ, մեղրահաց, մոմի կտոր, մեղվանոցում դես ու դեն թափւած շիւղնէլ, որոնք կարող են առուջ ընտանիքների վարակման աղբյուր դառնալ. արագ պետք է աշխատել, որպեսզի հնարավորութեան սահմաններում նվազագոյնի հասցվի նոր վարակումներ առաջացնելու բոլոր հավանականութեանները, դրա համար էլ չի կարելի հիվանդներին թափ տալ վաղ պարնանը, երբ չկա օժանդակ մեղրաբերը:

Եթե մեղվանոցում կան ամերիկյան հիվանդութեանից թուացած ընտանիքներ, պետք է դրանք նախօրոք միացնել իրար հետ, ուժեղացնել, հետո միայն բուժումը սկսել:

Բուժման ժամանակ, երբ ամեն ինչ վերելում նշւած ձևով կազմակերպել և նախապատրաստել ենք, թափ տալու աշխատանքները պետք է սկսել այն ժամանակ, երբ բնութեան մեջ կա օժանդակ մեղրաբերը և մեղուները սկսել են մոմ արտադրել, մեղրահացեր գործել, որպեսզի թափ տալուց անմիջապես հետո մեղվի ընտանիքները կարողանան մոմաթերթի բջիջները գործել և կարճ ժամանակում պատրաստել իրենց բույնը:

Այն մեղվանոցները, որտեղ հիվանդ ընտանիքների քանակը քիչ է, բուժման աշխատանքները կատարւում են մեղվանոցում: Թափ տալու աշխատանքներն սկսել օրվա տաք ժամին և հնարավորութեան սահմանում վերջացնել մեկ օրում, այն էլ կարճ ժամանակութեամբ, թողնելով միայն մեկ երկու հատ հիվանդանոց-փնթակներ: Նայած մեղվանոցի հիվանդ ընտանիքների քանակին, դրանք մեջ պետք է հավաքել թափ տւած հիվանդ ընտանիքներից հանած ձվերով, թրթուրներով և հարսնակներով (որդ և ձվեր) մեղրահացերը:

Հիվանդանոց-փեթակներն ընտրում ենք մեղվանոցի հիվանդ ընտանիքներից և ոչնչացնում ենք նրա մորը, այդ ընտանիքի վրա դնում կորսուսներ և դրանց մեջ հավաքում ձվերով, թրթուրներով, հարսնյակներով (որդ ու ձվով) և մեղրով շրջանակները՝ ու այդ վիճակում թողնում 21 օր, մինչև նրա մեջ եղած առողջ թրթուրներից (որդ) ու ձվերից դուրս գան մեղուներ, որից հետո այդ հիվանդանոց-փեթակներում եղած ընտանիքները բուժում ենք նույն ձևով, այսինքն՝ թափ տալով: Այդ հիվանդանոց-փեթակներից հանած բոլոր մեղրահացերը տեղափոխում ենք մի փակ սենյակ, սրտեղ մեղուների մուտքը հնարավոր չի լինի մինչև նորանցից մեղրի բամբեղ և մեղրահացերի հաշիւը:

Մեղվաբուծական աշխատանքի անհատականները, որոնք ունենան քանակության մեջ հիվանդ ընտանիքներ, պետք է կազմակերպեն հիվանդանոց-մեղվանոցներ, որտեղ տեղափոխեն իրենց մեղվանոցներից բոլոր հիվանդ ընտանիքները և աշխտեղ կազմակերպեն թափ տալու բուժման աշխատանքները:

Հիվանդանոց-մեղվանոցը, ինչպես վերևում նշեցինք, պետք է մոտ 4—5 կիլոմետր հեռու լինի առողջ մեղվանոցներից, որպեսզի թափ տալու ժամանակ ոչ մի կասկած չլինի հիվանդ մեղվանոցի ընտանիքներից հիվանդութունը առողջ ընտանիքներին փոխանցվելու մասին:

Հիվանդանոց-մեղվանոցների հետ կարելի է վարվել երկու ձևով՝

ա) բոլոր թափ տված ընտանիքները տեղափոխել և դնել առողջ մեղվանոցներում:

բ) հիվանդանոց-մեղվանոցը թափ տալ և ամբողջութեամբ թողնել տեղում, մինչև հաջորդ տարի և դա կազմակերպել որպես առանձին մեղվանոց. իհարկե այդ հանգամանքը կախված է տրանսպորտի մեծություներից և շահերից:

Այն մեղվանոցները, որտեղ բնդամենը մեկ հիվանդ ընտանիք կա, ապա նրան թափ տալուց հետո, նրանից հանած ամբողջ ձվերը, թրթուրները և հարսնյակները (որդն ու ձուն) մեղրահացերի հետ պետք է հաշիւ և մի անգամից ազատվել դրանից: Իսկ մեղրը կարելի է օգտագործել որպես սնունդ:

Ամերիկյան փոխախտով հիվանդ ընտանիքներին պետք է թափ տալ կրկնակի, դա կարելի է հասկանալ հետևյալ կերպ. թափ տա-

լու աշխատանքներն սկսում ենք այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ վերջում նշված ձևով նախատարապետի ենք մեղվախոցում. հիվանդ ընտանիքն իր փեթակով վերցնում ենք տեղից և դնում մի կողմի վրա, հիվանդ փեթակի տեղը հողը բաճով շուռ տալիս, վրայից ծածկում կրո՛վ, մոխրով կամ մաքուր հողով, որից հետո հիվանդ փեթակի տեղը դնում մաքուր ախտահանված, բոլորովին դատարկ փեթակ, որի մեջ դնում ենք բոլորովին դատարկ շրջանակի ձողեր և երեսը ծածկում մաքուր ծածկոցով: Այդ փեթակի արկանոցի առաջ փռում ենք մի մեծ սավան, որի ծալքը միացնում ենք արկանոցի տախտակին: Հիվանդ ընտանիքի մայրը շատ զգուշ վերցնում և դնում ենք վանդակի մեջ ու կախում նոր փեթակի բոլորովին դատարկ շրջանակների կամ ձողերի մեջտեղում, որից հետո հիվանդ փեթակից մեկ առ մեկ հանում շրջանակները և ուժանոթյամբ թափ ենք տալիս նրանց վրայի մեղուները սավանի վրա: Մեղուները՝ սավանի վրայից, արևի տակից, սկսում են մտնել դատարկ փեթակը և կծիկ կազմում մայր մեղվի վրա, սավանը հերթով օգտագործում ենք հիվանդ ընտանիքներին թափ տալու համար, որից հետո ղգուշովյամբ փաթաթում և տանում ներս:

Մեղուները թափ տված վիճակում մնում են 48 ժամ առանց մեղրահացերի (ուչ մի դեպքում չի կարելի թե՛ առաջին և թե՛ երկրորդ թափ տալու ժամանակ նրանց մեղրահացեր տալ), որից հետո բերում ենք ախտահանված մի նոր փեթակ, որի մեջ պետք է դրված լինի ալնքան մոմաթերթով կպցրած շրջանակներ, որքան ընտանիքը կաքող է պատել: Թափ տված հիվանդ փեթակը տեղից վերցնում և նրա տեղը դնում ենք նոր, ախտահանած փեթակ, նրա առջև փռում ենք լվացած, ախտահանված սավան, որից հետո բաց ենք անում առաջին անգամ թափ տված փեթակը և ախտեղից մորը վանդակով վերցնում ենք ու տեղափոխում մի ուրիշ վարակազերծ վանդակի մեջ և դնում նոր փեթակի շրջանակների մեջտեղը, որից հետո փեթակից մեղուները երկրորդ անգամ թափ ենք տալիս փեթակի առաջ փռած սավանի վրա. մեղուները՝ սավանի վրայից փեթակը մտնելուց հետո, սավանը ղգուշովյամբ վերցնում ենք և օգտագործում մյուս հիվանդների համար, իսկ վերջում փաթաթում և տանում ենք ներս ախտահանելու համար: Թափ տված ընտանիքների մորը պետք է վանդակից ազատել երկրորդ թափ տալուց մի քանի ժամ հետո:

Ռափ տված ընտանիքները որոշ ժամանակ մինչև թրջուրների (որդ ու ձվի) 2—3 սերունդի զարգանալը, պետք է վերցնել կտակածի տակ, որից հետո միայն պետք է հաշվել սրպես առողջ ընտանիքներ:

Ռափ տալու աշխատանքները վերջացնելուց անմիջապես հետո անհրաժեշտ է հիվանդներից հանած մեղրահացերը հալել, իսկ եթե մեղրով լիքը մեղրահացեր կան, կարելի է մեղրը քամել, հետո մոմը հալել:

Ամերիկյան փոտախտով հիվանդ ընտանիքն առաջին անգամ իր հին փեթակում թափ տալը, իմ կարծիքով սխալ է, պետք է երկու անգամն էլ թափ տրվի մաքուր ախտահանված փեթակում:

Մեղվանոցի վարակված դուլքն ու ինվենտարը, որը հավաքել էինք փակ սենյակում, պետք է առանց ձգձգումների մաքրել և ախտահանել: Փեթակների մեջ եղած մոմերը մաքրել և հետո դուլք (սպալանի) լամպով փեթակի ներսից՝ ամեն իրով՝ լավ ալրել:



• Նկ. 6

Փեթակի կորպուսի ախտահանումը՝ զոդիչ լամպի կրակով:

մինչև խանձվելը, որից հետո կարելի է նրան օգտագործել որպես վարակազերծ փեթակ:

Զոդիչ (պայալնի) լամպ շինելու դեպքում փեթակները կարելի է ախտահանել հացի լավ տաքացրած թոնրի վրա, փեթակը շուտ տված պահելով: Եթե վերը նշված միջոցներից ոչ մեկը չի կարող գտնվել, կարելի է դիմել ամենապրիմիտիվ միջոցին. այսինքն փեթակի ներսից քսել նավթը և ալրել մինչև լավ խանձվելը, որից հետո կափարիչը ծածկել, որ անմիջապես կրակը հանդչի:

Հիվանդոտ, վարակված դատարկ շրջանակներն առանց խնայելու կարելի է վառել, իսկ եթե շրջանակների շատ սուր պահանջ կա, կարելի է ղոդիչ (պայալնի) լամպով ալրել, կամ քանդել, դնել մեծ կաթնալի մեջ և 2—3 ժամ եռացնելուց հետո օգտագործել:

Երեսի ծածկոցները պետք է ալրել, իսկ եթե նոր են, պետք է ջրի մեջ եռացնել մինիմում 2 ժամ, որից հետո հարթուկել և ապա օգտագործել. նույն ձևով պետք է վարվել նաև տաքացման պարկերի և բարձերի հետ:

Ամերիկյան փտախտով վարակված ընտանիքներից ստացած մեղրը պետք է պահել շատ ապահով, մեղմների համար անմատչելի վայրում և ոչ մի դեպքում այդ մեղրը չօգտագործել մեղմներին կերակրելու համար:

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓՏԱՆՏ

Եվրոպական փտախտը կոչվում է նաև թրթուրների (բաց որդի) փտախտ: Այս հիվանդությունը նպաստավոր պայմաններում ավելի արագ է տարածվում փեթակի ներսում և մեղվաճուղում, քան ամերիկյան փտախտը, դրա համար էլ շատ արագ թուլացնում է մեղվի ընտանիքները և քայքայում մեղվաճուղները. ժամանակին մարդկային օգնություն չլինելու դեպքում, ամբողջ մեղվաճուղները կարող են ոչնչանալ:

Այս հիվանդությունը համարվում է սուր-վարակիչ հիվանդություն, որն ավելի շատ է տարածված, քան ամերիկյան փտախտը, այս հիվանդության հարուցիչը հանդիսանում է Պլուտոնի (Pluton) բացիլը:

Հիվանդությունը հայանվում է մեղ մոտ, ցածրագիր դաշտային շրջաններում՝ դարձան երկրորդ կեսերին, իսկ լեռնային շրջաններում՝ ամառն առաջին կեսերին, կերի սակավության և ցուրտ տնձրեային եղանակների պայմաններում:

Եվրոպական փառախախտ ատամնիշները հետևյալներն են՝ մեղրահացերի բջիջների մեջ ձուռն, թրթուրը և հարսնյակը դասափորված են ոչ սիմետրիկ, ախինքն ոչ համաչափ կերպով, ալլ լինում են խառն խաշտարդեա:

Մի բջիջում լինում է ձուռ, մշուտում՝ հարսնյակ, հարևան բջիջում՝ թրթուր, կամ թրթուրի մնացորդ և ալլն:

Եվրոպական փառախախտ թրթուրները (որդերը) վարակվում են թրթուր միճակի 3—4 օրեկան հասակում և մեռնում են նախքան հարսնյակ դառնալը, ախինքն նախքան սերնդելը: Հաղվալուտ են պատահում գեպեր, եբ թրթուրները (որդերը) մեռնում են սերնդած միճակում:

Այս դեպքում ես, ինչպես ամերիկյան փառախտն է, սկսում է բջիջների սերնդների գույնը մուգանալ, փոս լնկնել և ծածկվել: Այս է պատճառը, որ անփորձ մեղվապահը շատ հաճախ այս երկու հիվանդությունները խառնում է մեկը մյուսին և չի կարողանում աստիճանաբար պատահել իրանց փառախտներն իրարից:

Ուշագուշակները շատ հաճախ եվրոպական փառախտով մեռած թրթուրների բջիջներից հանում և մաքրում են, դա է պատճառը, որ շատ հաճախ բջիջների հատակին տեսնում ենք թրթուրների մնացորդներ:


Եվրոպական փառախտով մեռած թրթուրն սկզբնական շրջանում կորցնում է իր կլոր ձևը և բնական կախնաման գույնը, դառնում է բաց դեղնավուն: Վարակված թրթուրը երբեմն բջիջի հատակին ընկած է լինում մեջքի վրա, երկու ծայրերը դեպի վեր, կամ օղակաձև ընկած բջիջի հատակին՝ երկու ծայրերը ուղղված դեպի բջիջի հատակը, կամ թե չէ ստանում է բոլորովին պատահական տեսք. դրան հակառակ ամերիկյան փառախտով վարակված կամ մեռած թրթուրը միշտ ընկած է լինում բջիջի ցածի կողքին:

Աստիճանաբար, երբ հիվանդությունը հնանում է թրթուրների փառախտ ավելի է ուժեղանում, թրթուրի գույնը փոխվում և դառնում է ավելի մուգ դեղին կամ դորշոպույն տեսք է առանում, կորցնելով իր թափանցիկությունը:

Կույների փոփոխությունը բացատրվում է նշանով, որ թրթուրի փտելու ժամանակ նրա մեջ մուտք են գործում նաև ուրիշ բույսեր, որի հետևանքով էլ փոռը թրթուրն արագորեն փոխում է իր գույնը:

Նվրոպական փտախտով մեռած թրթուրները (որդերը) չեն կաշում քջիջների պատերին և չունեն այն մածուցիկությունը, ինչպես ունեն ամերիկյան փտախտով մեռած թրթուրը, երբեմն սպառնում է, որ այս հիվանդություններից մեռած թրթուրներից մասնք նույնպես ունենում են որոշ մածուցիկություն, բայց ոչ այնպես ձգվող, երկարող, ինչպես տեսանք ամերիկյան փտախտի դեպքում:

Նվրոպական փտախտը շատ լիով հոտ ունի, երբեմն հիվանդության որոշ շրջանում զգացվում է թթու հոտ, իսկ համար էլ միշտ մի շարք մեղմապահների այդ հիվանդությունն անվանում են թթու որդի հիվանդություն (փտախտ):




Նկ. 7.

Պլյուտոնի բացիլը:

Այս հիվանդության հարուցիչը հանդիսանում է Պլյուտոնի բացիլը, որը հայտագործվել է 1912 թ.: Պլյուտոնի այդ բացիլները



շատ ալլաձև են իրենց մեծությամբ (տես նկար 7): Այս բացիլը սպուլ չի զոյացնում և դիմացկունությունը շատ թույլ է. շատ շուտ ոչնչանում է, 63° (C-ի) տաքացրած ջրում դիմանում է մոտ 10 րոպե, իսկ 79° տաքացրած մեղրի մեջ դիմանում է նույնպես 10 րոպե:

Եվրոպական փոախոտ հիվանդություն ժամանակ բացի Պլուտոնի բացիլից, հանդիպում ենք նաև ալլ միկրոօրգանիզմների. ուրնը այս կամ այն ձևով ազդում են և փոխում հիվանդության պատկերը: Պլուտոնի բացիլից բացի կա նաև Ալվեյի (Alveii) բացիլը, ուր լրբիտրի փոտմից առաջանում է տճաճ հոտ, հիշեցնելով սուրի քրտինքի հոտը: Ալվեյի բացիլն առաջ է դալիս, երբ հիվանդությունն ինքնահոսի է յուղնված, աչք դեպքում հալանվում է, աչսպես կոչված փոախոտի «դարչահոտ տեսակը». եթե այդ հիվանդ լրբիտրների մեջ ընկնի մեղրի սարեպոտեիոկի (СТРЕПТОКОК), ապա կառաջանա լրբու հոտ, այս «լրբու տեսակ» փոախոտը կամ «լրբու փոախոտը» որը 60—70° (ըստ C-ի) տակ արագ ոչնչանում է:



Նկ. 8.

Այս հիվանդության համար ավելի բարենպաստ հող են հանդիսանում ցուրտ եղանակները և կերի՝ մեղրի ու ծաղկափոշու պակասությունը: Այս ընտանիքներում, որոնք ապահովված չեն լավ տաքացումներով, բայց թրթուրները շատ հեշտությամբ կարող են վարակվել եվրոպական փտալստ հիվանդությամբ, նախանաժանդերք ընտանիքն ապահովված չէ լրիվ կերսպաշարով:



Նկ. 9 և 10.

Ավելի բացիլը և սպորը:

Այս հիվանդությունը սուր-վարակիչ հիվանդություն է և փնթակի ներսում վարակը տարածում են ջահել կերակրող մեղուները: Նրանք մաքրում են բջիջները հիվանդությունից մեռած թրթուրներից և իրենք իրենց վրա կրում են վարակը ու կերակրելով առողջ թրթուրին, վարակում են նրանց:

Այսպիսով տեսնում ենք թե որքան հեշտ ճանապարհով փնթակի ներսում վարակը մի թրթուրից անցնում է մյուսին: Առաջին 7—8 օրում վարակը մի թրթուրից անցնում է մյուսին շատ դանդաղ, իսկ հետո շատ արագ կերպով ծավալվում է ամբողջ ընտանիքում:

Հիվանդության տարածումը ընտանիքից ընտանիք, կամ մեղվանոցից մեղվանոց առաջժամ այնքան էլ ուսումնասիրված չէ, բայց կարելի է ենթադրել, որ դա առաջ է գալիս հետևյալ ճանապարհով՝

1. Մեղուները դուրսնում և թալանում են հիվանդ ընտանիքի մեղրը և դա բերում փեթակ, ապա վարակված մեղրով կերակրում են առողջ թրթուրներին և վարակում նրանց:

2. Երբ հիվանդ ընտանիքներից (չիմանալով նրանց հիվանդ լինելը) առողջ ընտանիքներին տալիս ենք մեղրահացերով մեղր, ձվեր, թրթուրներ և հարսնյակներ (որդ ու ձու) և այլն:

3. Հիվանդ մեղվանոցի դուքն առանց արտահանելու օգտագործում ենք առողջ մեղվանոցներում:

4. Հիվանդ ընտանիքներից վերցրած արհեստակարն ձագերի մի տեղից մյուս տեղ փոխադրումը, կամ առանց ստուգելու հիվանդ ընտանիքների զնամները կամ վաճառումները:


5. Շուկայից կամ այլ մեղվանոցից մեղր գնելով և մեղուներին կերակրելով:

6. Մեղվապահի անփութության պատճառով, երբ հիվանդ ընտանիքներն ստուգելուց հետո ձեռքը կամ գործիքներն առանց արտահանելու ստուգում է առողջ ընտանիքներին:

Նվրոպական փոտախաի հարուցիչները լայնորեն տարածված են բնության մեջ, նրանք դառնում են հողի մեջ, առողջ ընտանիքի փեթակում և այլն, որպեսզի նրանք գործեն, անհրաժեշտ են բարենշնչապատ պայմաններ:

Նվրոպական հիվանդության դեմ մեղվի ընտանիքները տարբեր դիմացկունություն ունեն: Այն ընտանիքները, որոնք ավելի

էներգիա ունեն լավ են աշխատում, իրենց բույնը արագ և լավ մաքրում են մեռած թրթուրների (որդերի) մնացորդներից և ավելի դիմացկուն են հիվանդութեան նկատմամբ, երբեմն իրենք իրենց բույնը մաքրում են հիվանդութեանից: Դրան հակառակ որոշ ընտանիքներ, իրենց բույնը լավ չեն մաքրում, բջիջներում մեռած թրթուրները (որդերն) երկար ժամանակ մնում են բջիջներում, ալսպիսով վարակված թրթուրներն ընտանիքներում կազմում են մոտ 50—75%:



Նկ. 11.

Եվրոպական փտախտի տարբեր ախտանշաններ:

Եվրոպական փտախտի բուժման միջոցը հիմնականում թափ տալու եղանակն է, որի բուժման ընթացքը շատ կարճ է և արդյունավետ: Հիվանդ ընտանիքի թափ տալու տեխնիկան նույնն է, ինչ որ ամերիկյան փտախտի բուժման տեխնիկան, միայն այն տարբերությամբ, որ եվրոպական փտախտով վարակված ընտանիքներին երբեմն կարելի է թափ տալ սկզբում իր արկղում—իսկ 36—48 ժամ հետո թափ տալ մաքուր արկղի մեջ և նրան տալ մո-

մախերթ: Թափ տալու տեխնիկայի, Նիվանդանոց-փեթակներ կադ-
մակերպելու և գույքի ախտահանման վերաբերյալ մանրամասնու-
թյունը տես «ամերիկյան փոտախոտ» գլխում:

ՄԵԴՎԻ ՓՏԱԽՏ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՍՈՒՆՖԱՏԻԱԶՈՒ ՆԱՏՐԻՈՒ

Վերջին ժամանակներս մեզվի փոտախոտ Նիվանդուլյան դեմ-
օգտագործում են սուլֆատիազոլ նատրի դեղանյութը, որը իհարկե
տվի է իր դրական արդյունքը:

Անհրաժեշտ է պատրաստել 1 : 1-ի հարաբերությամբ շաքա-
րաջուր և մեկ լիտր շաքարաջրին խառնել 0,3—0,5 գրամ սուլֆա-
տիազոլ նատրի: Սկզբից կշռել սուլֆատիազոլ նատրին, լուծել կե-
րածակ տաք ջրի մեջ և հետո խառնել շաքարաջրին: Շաքարաջուրը
դոլ վիճակում կերակրել փոտախոտով վարակված ընտանիքներին
4—5 օրը մեկ անգամ 0,5—1,0 լիտրի սահմաններում:

Բուժիչ կերը պետք է տալ մեզվի ընտանիքներին նրանց բուղ-
մացման շրջանում, երբ ընտանիքներում շատ քիչ կերապաշար կա:

Սուլֆատիազոլ նատրիի դրական հատկությունը կայանում է
նրանում, որ հիվանդ ընտանիքը բուժիչ կերը ստանալուց հետո
ընտանիքում եղած նոր վարակված, բայց դեռ չմեռած թրթուրները
առողջանում են, շարունակում են աճել, չարանյակավորվել և դառ-
նալ նորմալ հաստնացած մեղուներ: Իսկ մեռացած թրթուրների հի-
վանդանալը, իրենց վարակման շրջանում դադարում է: Մինչև բու-
ժումը մեռած սրգերի գիակները քջիջների միջից մաքրում են, ու-
րից հետո փեթակներում ստացվում է ամբողջությամբ առողջ նոր-
մալ թրթուրներ և հարսնյակներ, որի հետևանքով ընտանիքներում
կրթուրների հիվանդանալը և մեռնելը դադարում է, երիտասարդ
մեղուների աճեցողությունը դնում է առանց կտրուտաի, ընտանիք-
ները ժամանակին ուժեղանում են, իրենց արտադրողականությամբ
դառնում են նորմալ ընտանիքներ:

Սուլֆատիազոլ նատրին ամբողջությամբ չի ոչնչացնում, սպա-
նում փոտախոտի հարուցիչը, այլ նրա օգնությունը կայանում է նը-
րանում, որ այդ դեղը կերի հետ ընկնելով թրթուրի ստամոքսը, հի-

վանդության հարուցիչները այդ դեպի ներկայությամբ ալեւս չեն աճում:

Սուվֆատիազուլ նատրիի ազդեցությունը մեղմի հիվանդ ընտանիքների բուժման վրա թողնում է տարբեր ազդեցություն, մի շարք ընտանիքներ զգալիորեն բուժվում են, իսկ մի խումբ ընտանիքների վրա այնքան էլ ուժեղ ազդեցություն չի թողնում, այն է, բուժիչ կերը ընտանիքում վերջանալուց հետո նորից հիվանդությունը կրկնվում է: Դրա համար էլ ավելի ճիշտ կլինի այն, որ փտախտով հիվանդ ընտանիքներին կերակրենք սուվֆատիազուլ նատրիով, որպեսզի նրանց բազմացման ընթացքը չգաղարի, ընտանիքները չհյուծվեն և մեղվաբուծական տնտեսություններն իրենց եկամուտից (բերքից) չղրկվեն, որից հետո փտախտը մեղմի ընտանիքներից վերջնականապես վերացնելու համար անհրաժեշտ է միանգամից թափ տալ մաքուր վարակազերծած փեթակը և հանած մեղրահացերի մեղրը քամել, իսկ մոմը հալել, այսպիսով հիվանդությունը իսպառ կանցնի:

ՏՈՊՐԱԿԱԶԵՎ ԿԱՄ ՊԱՐԿԱԶԵՎ ՓՏԱԽՏ

Տոպրակաձև փտախտը համարվում է մեղմի թրթուրի (որդի) վարակիչ հիվանդություն, որի հարուցիչը հանդիսանում է վիրուսը (լիպցուդ): Նա սովորաբար վարակում է թրթուրին հարսնյակ ձևավորվելուց առաջ, հիվանդությունը հայտնվում է դարձան երկրորդ կեսերին և ամռան սկզբներին, բայց կարող է երբեմն երևալ նաև ամռան ու աշնան ամիսներին: Այս վիրուսներն այնքան փոքր օրգանիզմներ են, որ ամենաուժեղ մանրադիտակով տեսած հնարավոր չէ տեսնել և բացի այդ անցնում է զտուղ պարզուրույ, պարզացնող հողի և ֆարֆուրովի (ֆիլտրից) ամենանուրբ գործիքներից, այս փոքրիկ օրգանիզմը սովորաբար ավելի արագ է բազմանում, քան մյուս միկրոօրգանիզմները:

Վիրուսի դիմացկունությունը թույլ է՝ 55—65° (ըստ Շ-ի) տաքացրած ջրի մեջ, նա մեռնում է 10 րոպեի ընթացքում, 70°-ի տաքացրած մեղրի մեջ, նույնպես ոչնչանում է 10 րոպեում, իսկ սննդային սովորական ջերմության տակ ոչնչանում է 22 օրում, արևի տակ՝ 4 ժամում, մեղրի մեջ՝ 24 օրում, 1% կարբոլյան թիփի մեջ՝ 38 օրում:

Այս հիվանդությունը տարածված է Հայաստանի մի շարք շրջաններում և այս առարկայի վրա հիմնականում հիվանդությունից ընտանիքների կորուստները մեծ չեն: Պատահում է այս հիվանդության շարորակ տեսակը, երբ ընտանիքներին չափից ավելի թուլացնում է նաև արդյունավետ դարձնում, երբեմն էլ եթի մարդիկ պետք եղած միջոցները ձեռք չառնեն, կարող է ամբողջ ընտանիքը թուլանալ և համարել, ոչնչանալ:

Այս հիվանդության ախտանշանները հետևյալներն են՝ մեղրահացի բջիջների մեջ թրթուրները, ձվերը, հարսնալիները լինում են ցրված վիճակում. ինչպես առկա ենք, մյուս վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ, թրթուրները սովորաբար մեռնում են աչքի ժամանակ, երբ մեղուները նրանց սերկում են, մեղուներն սկսում են մեռած թրթուրների (որդերի) սերկել բացել ամբողջությամբ, կամ որոշ մասով ստացվում է աչքալիսի տպավորություն, որ թրթուրները (որդերը) մեռել են բաց վիճակում:

Մեղուները սերկելները ծախում են հաճախ շատ մեծ, երբեմն էլ շատ փոքր քորոցի գլխի շափով, երբեմն էլ սերկել լրիվ վերցնում են:

Տուրբակաձև փտախտով մեռած թրթուրը (որդը) միշտ մեջքի վրա պառկած է լինում բջիջի ցածի պատին, գլուխը վեր ցցած: Տուրբակաձև փտախտով նոր մեռած թրթուրի (որդի) գույնը լինում է բաց դեղնավուն, բայց գնալով մի քանի օրվա ընթացքում գլուխը կարծրանում է և սևանում, մարմինն սառնում է որձագույն տեսք: Մեռած թրթուրը (որդը) որքան հնանում ու փոխում է, այնքան տվելի մոռ գույն է ստանում, իսկ երբեմն նույնիսկ սևանում է:

Տուրբակաձև թրթուրի (որդի) փտախտով վարակված մեռած թրթուրի (որդի) մաշկը փտելու ընթացքում կարծրանում է, աչքալիս, որ նրա ամբողջ մարմինը կարելի է առանց դժվարության դուրս հանել բջիջից, որպես մի լիքը պարի. այդ է պատճառը, որ այս հիվանդությունը կոչվում է տուրբակաձև փտախտ, եթե այդ պարկը պատռենք, միջից դուրս կթափվի սպիտակ, ջրալի և մանր, կարծես ավաղախառն հեղուկ: Տուրբակաձև մեռած թրթուրը (որդը) նման է առողջ թրթուրին (որդին), այդ հիվանդությունից մեռած թրթուրներին մեղուները շատ հեշտությամբ մարդրում են և բջիջները դարձնում վարակաղերծ:

կիմն մեղուներն աշդ մեռած թրթուրներին (որդերին) ժամանակին չեն մաքրում բջիջներից, նրանց միջի հեղուկային մասը կամաց-կամաց գոլորշիանում է, թրթուրն (որդն) իր ձեր կորցնում և աստիճանաբար շորանալով դառնում է թեփուկ. բայց թեփուկը չի կպչում բջիջի պատին և մեղուներն այս վիճակում շատ հեշտութեամբ մաքրում են բջիջները մեռած թրթուրների (որդերի) մարմիններից:

Տաքրակած և փտախառով մեռած թրթուրը (որդը) բոլորովին թելանման չի ձգվի և նրանից առանձնապես հոտ չի գալիս, եթե թթին մոտեցնենք, երբեմն կարող է հոտած մսի հոտ գալ: Այս հիվանդությամբ մեռած թրթուրներն (որդերն) օրստօրե աչնպես են փոխում իրեն գույնը, որ շատ դեպքում անսիրոճ մեղվապահները գժվարանում են ճիշտ դիագնոզ տալը, չնայած նրա բազմաթիվ ախտանշանների ցայտուն տարբերությանը:

Այս հիվանդության տարածումը ընտանիքից ընտանիքին, շատ դանդաղ է անցնում: Հիվանդությունը կարող է անցնել մեղվահասցեքով, ձու, թրթուր և հարսնյակներ տալու միջոցով: Այս հիվանդության դեմ նախազգուշական միջոցների ձեռք առնելու համար, մեղվանոցում պետք է ընտանիքները պահել ուժեղ և նրանց հետ տանել լավ խնամք, բույնը պահել խիտ, ընտանիքը պետք է լավ տաքացումներով ապահովել և ունենալ բավարար չափով լավորակ կեր ձմեռվա և գարնան համար:

Թույլ վարակված նորմալ ընտանիքները հեշտութեամբ մաքրում են իրենց բույնը, դրա համար էլ թույլ ընտանիքներին պետք է ուժեղացնել, սրպեսզի մեղուներն իրենք բջիջները մաքրեն մեռած թրթուրներից ու բուժեն ընտանիքը հիվանդությունից. իսկ ուժեղ վարակված ընտանիքներին պետք է լիափ տալ, վարակազերծ, առողջ ընտանիքներից վերցրած մեղրահացերը փոխել:

ԽԱՌՆ ՓՏԱԽՏ

Մեղվի թրթուրների վարակիչ փտախտ հիվանդություններից ամերիկյան փտախտը խիստ անտադոնիզմի մեջ է մյուս հիվանդությունների հետ. օրինակ՝ ամերիկյան փտախտով վարակված թրթուրի մեջ ոչ մի ուրիշ բացիլ մուտք գործել չի կարող, բայց միևնույն ընտանիքում կամ միևնույն մեղրահացի վրա, տարբեր բջիջներում եղած թրթուրներից կարող են տարբեր ժամանակում

վարակել և հիվանդանալ այս կամ այն հիվանդությամբ, բայց միևնույն թրթուրը (որդը) մի քանի տեսակ հիվանդությամբ վարակվել չի կարող:

ՈՐԳԻ ԵՎ ԹՐԹՈՒՐԻ ՈՉ ՎՍՐԱԿԵԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բացի վերևում նշված հիվանդություններից, որոնք ոչնչացնում են մեզվի թրթուրներին կամ հարսնյակներին, շատ հաճախ պատահում են նաև մրսած որդեր կամ հարսնյակներ, որը տաաջ է, չալիս հետևյալ պատճառներից. օրինակ՝

Գարնան ընթացքում մեզվի ընտանիքները բարենպաստ եղանակների և բերքի շնորհիվ շատ ուժեղ տեմպով սկսում են բազմանալ, կծիկն սկսվում է բացվել և մալրը սկսում է լայնացնել իր ձվադրման սահմանը, ընտանիքում լինում են մեծ քանակությամբ ձվեր, թրթուրներ, հարսնյակներ (որդ ու ձու), հանկարծ սկսում են հետադարձ ուժեղ ցրտեր, մեղուներն անմիջապես սկսում են կծիկ կազմել և կծիկից դուրս մնացող ձվերը, թրթուրները (որդերը) և հարսնյակները ցրտից սառչում և մեռնում են, աչսպիսիները լինում են մեղրահացերի ցածի մասում, կամ կողքերին: Մեռած թրթուրներն (որդերն) սկսում են գույնը փոխել և հոտել. մեղուները դրանց մաքրում են, ընտանիքում կլած մյուս թրթուրները (որդերը) գտնվում են անողջ վիճակում: Այսպիսի դեպքեր լինում են համեմատաբար թույլ ընտանիքներում:

Շատ հաճախ թրթուրները մեռնում են նաև վատ սրակի, թրված կամ թունավոր կերերից, որը նույնպես վարակելի չի կարող լինել. մեղուները նրանց կմաքրեն և կազատվեն դրանցից:

Հաճախ թրթուրները մեռնում են նաև կերի պակասությանց, երբ ընտանիքում բացակայում է զխավորապես ծաղկափռչի Մեռած հարսնյակների սերեկները մեղուները ծակում են, շատ դեպքում իրենք հոտով նմանվում են տմերիկյան փտախտին, բայց մեռած թրթուրները չեն ծորում, կամ ձգվում, դրա համար էլ ուժեղ ընտանիքն արագ մաքրում է դրանց:

Ֆառ. խմբագիր՝ Հ. ԹՈՐՄԱՆՅԱՆ
Տեխն. խմբագիր՝ Վ. ԴԱՎԹՅԱՆ
Կոճառ. սրբագրիչ՝ Հ. ՂԱԶԱՐՈՍՅԱՆ

ՎՖ 02699

Պատվիր N 192

Տիրաժ 2000

Հանձնված է արտադրության 11/VI 1949 թ.

Ստորագրված է տպագրության 20/VII 1949 թ.

Տպագրական $2\frac{1}{4}$ մամուլ

Հայպոլիգրաֆհրատի վարչության M 2 տպարան, Երևան, Կոմունյանցի

N 86, 1949 թ.

ՀԱՄԱԵՄԱՍԱԿԱՆ ՏԱԽՏԱԿ

ՍՍՀՈՒՆԵՐԻ ԲՐԺՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐՄՆՅԱՆՆԵՐԻ (ՈՐՈՇԵՐԻ) ՓՏԱԽՏ ՀԻՄՆԱԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՏԱՆԵՇԵՆԸ ՊԱՐԶՈՒՈՒ, ԱՅԴ ՀԻՄՆԱ-
ԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԵՆԸ ՀԱՄԱՐ

	Անբրիկյան փառյառ	Նյութական փառյառ	Տոգրական փառյառ
1. Փառյառի հարցերը- ները (լացրելը)	Լարվելի բաղնի, սպոր կազմող, խիստ գիմազկուն սովորական պայմաններին	Պլյուտոնի բաղնի, սպոր չի կազ- մում, հեշտությամբ ոչլուծելի է	Վիրուս, մանրադիակով անտեսանելի, ոչ շատ գիմազկուն
2. Երջանակների վրա բջիջների և թրթուրնե- րի (որդերի) տեսքը	Խիստ անկանոն դրված թրթուրներ (որդեր), քնակաձև, գույնը կորցրած, ցածր ընկած և ճակոտված սերնդներ	Սնկանաձ դրված թրթուրներ (որ- դեր) մեծ մասամբ և ընդհանրա- պես բաց բջիջներում	Նվազ անկանոն դրված թրթուրներ (որդեր), առհասարակ ուրեղները բաց է, բայց փակ սերնդները մակուղան են և ալյանքան ցածր չէ, որքան ամբրիկյանը
3. Վարակված թրթուրի (որդի) բանալը	Նդած հարձակումների (փակ որդերի) մեծադույն մասը վարակվում է, երբ հիվանդությունը երկար ժամանակ ժը- նում է փխխուրում	Նվազ, բազմաթիվ վարակված թրթուրներ (որդեր) կարելի է նկատել բաց բջիջներում	Քիչ քանակությամբ վարակված թրթ- ուրներ (որդեր) կարելի է նկատել
4. Վարակված թրթուրի (որդի) հասակը	Վարակվում է 4—5 օրեկան հասակում և առհասարակ փլանում է մեռնում է սերնդկիցուց հետո	Առհասարակ փլանում է նախքան բջիջի սերնդկից 3—4 օրեկան հասակում	Թրթուրը (որդը) փլանում է համարյա սերնդկիցուց հետո
5. Վարակված թրթուրի (որդի) գրգռ բջիջում	Միշտ ընկած է բջիջի ցածր մասում երկարած դիրքի մեջ	Որոշ դիրք չունի, փռած թրթուրը (որդը) կարելի է նկատել բջիջի օրեկ մասում	Միշտ ընկած է կենսակի վրա բջիջի ցածր մասում
6. Վարակված թրթուրի (որդի) գույնը	Սև սրճագույն, նվազ փոփոխական	Դեղնագույն, գորշ կամ մուգ դեղնագույն, երբեմն սև, փոփո- խական է	Գորշ դեղնագույն կամ սև դորդագույն գույնը միշտ սև է
7. Հոտը	Սուր հոտ, որը նմանում է հյուսնի հալած ստանդի հոտին	Ինքնուրույն կամ որոշ հոտ չունի, երբեմն անախորժ թխու կամ ուռի բրուրների հոտ	Չ ու ն ի
8. Թրթուրի (որդի) կազ- մվածքը	Մառուցիկ է, թվական ձգվում է	Մառուցիկ չէ, որոշ չափով փրխ- րուն, կարող է ձգվել փառն ուե- ղելի նման	Ոչ մի մառուցիկություն կամ առան- գակառվություն չունի՝ Սպիտակ ջրալի և կարծես ավալալան է
9. Վարակված թրթուրի (որդի) տեսակը	Ընդհանրապես աշխատավոր մեղրի թրթուրներ (որդեր) հազվագյուտ գեներում բուսաորդեր կամ մալա- որդեր	Ներք տեսակի թրթուրներն (որ- դերն) էլ վարակվում են	Ընդհանրապես աշխատավոր մեղրի թրթուր (որդ) է, հազվագյուտ գեներում բուսաորդ է, գուցե և վարակվեն մալաորդեր
10. Շնչափողերը և մաշկը	Փչանալուց հետո, շնչափողերը պարզ չեն երևում՝ Մաշկը օրայնված հա- լած է	Շնչափողերը պարզ երևում են, մաշկը որոշ չափով կարծի է մնում	Շնչափողերը լին երևում՝ Մաշկը ամուր տուրալի նման է մնում
11. Թնփուլը	Սև սրճագույն, որոշ չափով փայլուն, շատ դժվար է բջիջից պզկել	Գորշ կամ սև սրճագույն, անհոտ է, հեշտությամբ կարելի է անդա- տել բջիջից	Մուգ կամ սև գույն, որոշ չափով ան- հարթ, շատ հեշտությամբ կարելի է պզկել բջիջից
12. Բջիջների մաքրումը մեղուների կողմից	Անկարելի է մաքրել	Շատ հեշտությամբ կարող են մաքրել, եթե մեղվապահը մի- ջատի	Շատ ավելի հեշտությամբ կարող են մաքրել
13. Տարածվելը	Ընդհանրապես զանդող, բայց հաս- տատ կերպով	Շատ արագ	Միջակ արագությամբ
14 Տարածման միջոցը	Ընդհանրապես վարակված մեղրից և վարակված նյութի հետ անխնամ վերաբերմունից	Կերպրման միջոցով	Պարզ չէ, գուցե կերպրման միջոցով
15. Նկատվում է	Առհասարակ տարվա բուրդ եղանակ- ներին, մասնավորապես ամռանը	Ընդհանրապես դարձան, հազվա- գյուտ դեպքում ամառը, երբեմն աշնանը	Ընդհանրապես գարնան, աճալի առ- տանը, երբեմն աշնանը
16. Վարակում է	Ե՛վ թույլ է՝ ուժեղ ընտանիքներին	Վարակվում են ընդհանրապես ընտանիքներ, չի կարող վնասել ուժեղ ընտանիքներին, եթե մա- սանակին միջոցներ ձեռք առնվի	Վարակվում է առհասարակ թույլ ընտա- նիքներին, կարող է վարակել, բայց չի կարող լուրջ վնաս հասցնել ուժեղ ընտանիքներին
17. Հիվանդությունը վե- րացնելու համար	Անհրաժեշտ է անպայման կրկնակի թափ տալ մեղուները մաքուր փնթակի մեջ՝ մոմաթերթով մաքուր շրջանակ- ների վրա	Անհրաժեշտ է անպայման թափ տալ մեղուները մաքուր փնթակի մեջ՝ մոմաթերթով մաքուր շրջա- նակի վրա	Մալրը փոխել, եթե ընտանիքը թույլ է, անհրաժեշտության դեպքում՝ կերակրել և ուժեղացնել



ԳԱԱ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0007934

ԳԻՆԸ 2 ՌՈՒՐ.

ՇԵՆԱ

Մ 19295