МИНЕРАЛОГИЯ

Р. А. Мандалаян, И. Х. Петросов и П. П. Цамерян

Горная кожа из доломитовой толщи верхней юры
 северо-восточной части Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР К. Н. Паффенгольцем 21/III 1965)

Минералы группы палыгорскита под микроскопом отличаются характерным спутанно-волокнуистым строением, а макроскопически обычно имеют вид кожистых или пленчатых образований, благодаря чему нередко именуется горной кожей. Они встречаются в осадочных, изверженных, а также и в метаморфических породах.

Различные типы палыгорскита описаны рядом авторов. В литературе имеются указания на присутствие его в отложениях и донных осадках интенсивно испаряющихся современных и древних бассейнов, в почвах, в коре выветривания и т. д. В опубликованных работах, однако, чрезвычайно мало сведений о нахождении горной кожи эпигенетического типа в древних толщах доломитов. Поэтому представляется интересным дать детальное описание этой разновидности палыгорскита.

В северо-восточной части Армянской ССР, среди пород верхнеюрской (оксфорд-кимеридж) вулканогенно-карбонатной серии, проявления палыгорскита установлены на двух участках, причем в обоих случаях горная кожа приурочена исключительно к карбонатным породам.

Первый участок расположен в междуречье рр. Спитак-джур и Сари-джур (левые притоки р. Агстев) в пределах Иджеванского месторождения исландского шпата (проявление Сарца-тун). Минерализация исландского шпата и вторичного кальцита контролируется зоной дробления почти широтного простирания с северо-западным падением под углом $45-90^\circ$, локализована в участках интенсивного дробления доломитизированных известняков и представлена прожилками и жилами, а также гнездами, сложенными непрозрачными, полупрозрачными и, реже, прозрачными кристаллами кальцита (¹).

Горная кожа встречается здесь в ассоциации с исландским шпатом (фиг. 1), а также в виде отдельных скоплений вдоль трещин.

Второй участок расположен в междуречье рр. Агстев и Ахум

на юго-западном склоне г. Сарум, где хлопьевидные агрегаты палыгорскита (часто вместе с кристаллами вторичного кальцита) обнаруживаются в небольших трещинах и полостях, развитых в брекчированных и доломитизированных известняках и доломитах, а также в раздоломиченных пористых и кавернозных, очень крепких породах.

Фиг. 1. Горная кожа в ассоциации с исландским шпатом.

Макроскопически палыгорскит представляет собой светло-серый, серый, серо-бурый (благодаря включениям оксидов железа и глинистых примесей) хлопьевидный пластчатый, иногда листоватый агрегат спутанно-волоконистого строения. Горная кожа нередко обволакивает кристаллы исландского шпата и вторичного кальцита, являясь, таким образом, своеобразной упаковкой, предохраняющей кристаллы от внешних воздействий.

Диагностика и химический состав. Минерал был подвергнут комплексному исследованию.

В прозрачном шлифе (фиг. 2) структура однородная, лаптопеллитовая; текстура слабо ориентированная, что, очевидно, связано с волоконистым строением минерала. Некоторые участки имеют пятнистую

Фиг. 2. Микрофото горной кожи. Текстура слабо ориентированная. X 45

текстуру вследствие скопления на поверхности основной массы многочисленных (различных размеров) примесей гидроокислов железа. Бесцветен, характеризуется серыми тонами интерференции. В общей пелитовой массе выделяются участки с ясно видимым волоконистым

строением; отдельные волокна имеют, прямое погасание. Минерал двуосный, с $N \sim 1,56$.

На электронномикроскопическом снимке (фиг. 3) очищенный от карбонатов и гидроокислов железа образец имеет спутанно-волокнистое строение. Отдельные волокна имеют вытянутую пластинчатую форму; средний поперечный их размер в плоскости (ab) равен приблизительно 500 А.

Фиг. 3. Электронномикроскопический снимок палыгорскита. Четко фиксируется волокнистое строение минерала. $\times 11000$

В результате электронографического анализа этого образца определены параметры элементарной ячейки минерала, которые характеризуются следующими величинами: $a = 5,22$ кх, $b = 18,08$ кх, $c = 12,85$ кх, $\beta = 95^\circ 40'$,

Фиг. 4. Рентгенограмма палыгорскита.

На рентгенограмме (фиг. 4) фиксируются характерные для палыгорскита отражения: интенсивный широкий рефлекс (110) с $d =$

$= 10,1 - 11,8 \text{ \AA}$; (200) с $d = 6,4 \text{ \AA}$; (130) с $d = 5,5 \text{ \AA}$ и др. Для сравнения соответствующих рефлексов с индифференцированными рентгенограммами в табл. 1 приводятся данные Брэдли (2), а также М. А. Ратеева (4) по изучению палыгорскитовых глин каширского горизонта Русской платформы.

Дифференциальные кривые нагревания (фиг. 5) характеризуются тремя эндо- и двумя экзоэффектами. Низкотемпературная эндотермическая реакция имеет максимум при $140 - 150^\circ \text{C}$. Важный для диагностики палыгорскитов эндоэффект, вызванный удалением гигроскопической и цеалитной воды, имеет максимум при $250 - 260^\circ \text{C}$. Эндотермическая реакция при выделении гидроксильной воды имеет

Фиг. 5. Дифференциальные кривые нагревания палыгорскита.

максимум при 480°C . Первый экзоэффект выражен весьма резко; достигает максимума при 360°C . На наличие экзотермической остановки при $340 - 350^\circ \text{C}$ на кривых нагревания палыгорскитовых глин из отложений каширского горизонта Русской платформы указывает М. А. Ратеев (4). Природа второй экзотермической реакции с максимумом при 600°C неясна.

Данные по химическому анализу сведены в табл. 2*.

В целом по химическому составу иджеванский палыгорскит не отличается от описанных в литературе.

Вместе с тем имеются и особенности. Так, обращает внимание большое содержание $\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ (что, по-видимому, объясняется наличием многочисленных примазок гидроокислов железа) и сравнительно незначительное содержание Al_2O_3 .

Генезис. Описываемый палыгорскит имеет, несомненно, эпигенетическое происхождение.

* Анализы выполнены в НИГМИ аналитиками М. Г. Багдасарян и Л. Н. Григорян.

Таблица 1

Межплоскостные расстояния (d) и относительные интенсивности (I) на рентгенограмме палыгорскита из доломитовой толши верхней юры северо-восточной части Армянской ССР

Данные Брэлли (²) (в кх)				Данные М. А. Ратеева (¹) (в кх)		Ориентированный природный образец (в А)	
Вычисленные		Экспериментальные		Зубовая полная фр. < 0,001 м.м		Доломитовая толша	
d	I	d	I	d	I	d	I
10,48	330	10,50	10	10,52	10	11,8	10
6,45	17	6,44	6	6,43	8	10,1	—
5,44	12	6,42	5	5,37	8	9,7	1
4,50	66	4,49	8	4,87	8	7,0	1
4,18	13	4,18	3	—	10	6,4	8
3,69	18	3,69	5	4,07	8	5,9	2—1
3,48	12	3,50	3	3,56	8	5,5	7
3,47	2	3,23	10	3,41	8	5,0	1
3,23	120	3,03	1	3,27	10	4,50	8
3,04	3	2,61	8	3,06	8	4,17	5
2,76	2	2,55	3	2,90	8	3,92	1
2,62	43	2,38	3	2,65	4	3,68	7
2,56	8	2,15	5	2,55	10	3,48	3
2,38	5	1,82	1	2,49	10	3,17	10—9
2,25	1	1,62	1	2,37	8	2,98	4
2,15	15	1,56	3	2,25	8	2,72	2—1
3,10	1	1,50	5	2,15	8	2,59	8
1,845	1			2,11	8	2,51	4
1,815	3			2,02	2	2,452	1
1,75	—			1,95	2	2,338	1
1,615	3			1,88	4	2,243	2
1,55	17			1,80	4	2,165	1
1,50	40			1,76	4	2,112	7
				1,71	6	1,966	1
				1,67	8	3,905	3
				1,59	4	1,796	4
				1,54	8	1,761	4
				1,49	10	1,716	1
				1,46	8	1,661	4—3
				1,43	10	1,607	3
				1,37	4	1,552	2

Таблица 2

Окислы	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	TiO ₂	P ₂ O ₅	FeO+ Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	п.п.п.	H ₂ O	S
Весовые проценты	50,76	10,60	0,91	8,90	0,28	0,34	4,68	0,77	сл.	14,04	9,28	сл.

Исходя из морфологического соотношения и парагенезиса кристаллов оптического кальцита и палыгорскита, можно предположить, что образование последнего во времени связано с минерализацией исландского шпата.

Гидротермальный генезис Иджеванского месторождения исландского шпата считается доказанным, при этом имеется в виду влияние вблизи интрузивного тела, не вскрытого эрозией (1).

Образование исландского шпата связано с поступлением по тектоническим трещинам низкотемпературных растворов, которые взаимодействовали с легко растворимыми известняками и доломитами: растворы обогащались Са, Mg и углекислотой; из насыщенных, сравнительно теплых растворов вначале происходило выпадение кальцита.

В дальнейшем, при понижении температуры растворов, из них выпадал палыгорскит.

Источником Al_2O_3 и SiO_2 , по-видимому, служили компоненты нерастворимого остатка карбонатных пород. В пользу такого предположения говорит обогащенность верхнеюрских карбонатов кремнеземом и глинистым веществом.

Источником магнезия служили доломитовые породы, о чем свидетельствует приуроченность палыгорскита к доломитизированным известнякам, доломитам и раздоломиченным породам.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Թ. Ա. ՄԱՆԱԼՅԱՆ, Ի. Ե. ՊԵՅՐՈՍՈՎ ԵՎ Պ. Պ. ՍԱՄԵՐՅԱՆ

**ՎԷՆԵՑԻՆԻՆ ԿԱՐԻՆ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՄՁ-Ի ԻՅՈՒՄԻԱ-ԱՐԵՆԵՆՅԱՆ ՎԻՍԻ ՎԵՐԻՆ
ՅՈՒՐԱՅԻ ԵՍՍԱԿԻ ԳՈՒՈՎԻՏՈՅԻՆ ԾԱՎԻՃԵՐՆԵՐՈՒՄ**

Հրատարակված աշխատություններում շատ քիչ տեղեկություններ կան գոյություն ունեցող շերտախմբերում էպիդոտիտի կամ պարագրոնիտի (երբեմն «Նեոնային կարի» անվանված) խմբին պատկանող միներալների հայտնաբերման մասին:

Այդ պատճառով որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում Հայկական ՄՊՁ-ի հյուսիս-արևմտյան մասի վերին յուրայի հասակի կարբոնատային ապուների մեջ գտնվող պարագրոնիտի այդ ստրատեգիկ մանրագնդին ուսումնասիրությունը:

Միներալը ենթարկվել է ունեցնող ստրատիգրաֆիային, էվոլյուցիոն-միկրոսկոպիկ էվոլյուցիոն-գր-ֆիկ, թերմական և պարթիկական ուսումնասիրությունների:

Այս բազմազանի ուսումնասիրությունները ներառված են մեզին հայտնի թուրք-արշի միներալի տեսակը և վերականգնել նրա ստրատիգրա-տեքտոնիկականությունները:

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին նկարագրված պարագրոնիտի պատկանելությունը հիդրոթերմալ ծագմանը, որի պատճառով են խուսում նեոնային փաստերը՝

ա) պարագրոնիտի գենետիկ կապը իւււնդական շրջանի հետ, որի հիդրոթերմալ ծագման տեսակետը հասկանալի տեղիք չի ստանում:

բ) պարագրոնիտի ներկայությունը տեկտոնիկական նկարագրում:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Չ Դ ՈՒՇ Կ Ե Ր Յ ՈՒ Ն

1 Н. И. Ильин, Советская геология, № 1, 1964. 2 W. F. Bradley, Structural scheme of altopulgitic. Amer. Mineralogist, 1940. 3 G. W. Brindley, D. M. Mac Ewan. X-ray identification and crystal structures of claudenite, London, 1951. 4 М. А. Румянцев, Закономерности размещения и генезис глинистых минералов в современных древних морских бассейнах, Изд. «Наука» М., 1964.