ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
XLIII 1966 1

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хнзорян

# Новый вид канавочников из Армянской ССР
(Coleoptera, Carabidae)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 16/III 1966)

Род канавочников (*Trechus* Clairv.) представляет большой интерес для биогеографов, так как насчитывает много видов, расселенных на небольших ареалах, в особенности в горных странах. В Армении до сих пор было обнаружено 10 видов этого рода, из них 8 эндемичных. Ниже приводится описание еще одного вида. Его тип хранится в коллекциях Зоологического института Академии наук Армянской ССР.

*Trechus zangezuricus* Iablokoff-Khnzorian sp. nov. Армянская ССР Боротанский перевал, 2300 м, в норах обыкновенной полевки, 30/VII 1963, тип (самец) и паратип; там же, 23/VII 1950, 4 паратипа; Шагаш (Сисианский р-н), у ручья, в норе полевки, 2 паратипа; 11/VI 1963 (Г. Аветисян).



Фиг. 1.

Черно-бурый, усики красные, ноги светлые. Длина 3,5—3.6 *мм*.

Этот вид настолько близок к *T. dzermukensis* m., что габитуально от него трудно отличим, но его глаза немного более выступающие, задние углы переднеспинки слегка более острые и первая щетинконосная пора на третьей бороздке надкрылий расположена немного дальше от основания, чем у этого вида. У самца первый членик передних лапок менее треугольный, расширен слабее, без явственного бокового зубца. Пенис (фиг. 1) характерный, много уже, чем у *dzermukensis*, его основание сильно расширено и удлинено, вершина вытянута в длинный зубец, кончающийся пуговкой, вооружение внутреннего мешка состоит из одной большой пластинки, расположенной ребром и вытянутой спереди в длинную коническую лопасть.

Этот вид принадлежит к группе *T. caucasicus* Jeann, отличается от всех ее видов строением пениса, габитуально ближе всего стоит к *T. luteolus* Jeann. из Абхазии и *dzermukensis* Khnz. с Сарер Сарцали.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ա. Մ. ՅԱՓԼՈՒՄՈՎ-ԽՆԶՈՐՅԱՆ

## Անվակալիճների նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից
(Coleoptera, Carabidae)

*Անվակալիճների սեռը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում բիոաշխարհագրագետների համար, քանի, որ դրանից շատ տեսակներ ոչ մեծ արեալով տարածված են հատկապես լեռնային գոտիներում։ Հայաստանում մինչև այժմ հայտաբերված է այդ սեռից 10 տեսակ, որից 8 էնդեմիկ են։ Ստորև նկարագրվում է ևս մեկ տեսակ — Trechus zangezuricus sp. n. բռնված Սիսիանի շրջանի լեռնա-տափաստանային գոտում՝ սովորական դաշտամկան բներում։*

*Տիպը հայտնաբերված է Որոտանի լեռնանցքում։*