

Л. В. Арнольди


Новый вид рода *Otiorrhynchus* Germ. (Coleoptera, Curculionidae)
 из Армянской ССР

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 17/V 1966)

Otiorrhynchus (*Hanibotus*) *hajastani* L. Arnoldi, sp. nov.

В сборах С. М. Хнзоряна из долины Аракса, сделанных в 1958 г. в районе села Веди, имеется один экземпляр скосаря, относящийся к группе *Hanibotus* Reitt. Вид является новым для науки; ниже дается его описание (фиг. 1).

Ржаво-бурый, усики и ноги красно-желтые. Голова по строению типична для секции *Hanibotus* Reitt. (¹), от основания почти до птеригиев сильно конусовидно суженная. Глаза плоские, большие, верхние, крупно-фасеточные. Лоб вдавлен, благодаря чему основание головотрубки отделено от головы между глазами, немного шире головотрубки между птеригиями, покрыт крупными точками, отграниченными узкими промежутками. Виски с морщинистой скульптурой. Боковые канты головотрубки слегка дуговидно выгибаются перед глазами и здесь с поперечными морщинками, как бы зазубрены, кпереди оггибают птеригии. Помимо упомянутых кантов имеется срединный киль, начинающийся у ямки на лбу и кончающийся на уровне птеригиев. Передний край головотрубки с глубокой треугольной вырезкой; птеригии овальные, косо поставленные. Мандибулы без куколочных придатков. Усики с тонкой, слегка S-образно изогнутой рукоятью, к вершине слегка расширенной и снизу с зубчиком. Первый и второй членики жгутика почти равной длины, первый несколько толще второго, третий длиннее своей ширины, четвертый почти квадратный, пятый квадратный, шестой и седьмой попе-



Фиг. 1. *Otiorrhynchus hajastani* L. Arnoldi sp. nov. Передняя часть тела сверху.

речные. Булава веретеновидная, заостренная, ее первый членик чашевидный, третий по длине равен половине булавы. Переднеспинка на боках почти шаровидно округленная, сзади без перетяжки, спереди перетянута с боков, основание резко, слегка морщинисто окаймлено. Весь диск в крупных и глубоких глазчатых точках, на боках переходящих в зерна, с очень узкими килевидными промежутками, в каждой точке по светлому прижатому волоску. Основание переднеспинки лишь немного шире вершины. Надкрылья широко и коротко яйцевидные, сзади нависающие. Точки бороздок мельче, чем на переднеспинке, бороздки спереди малоуглубленные, сзади резкие с более густыми точками. Промежутки бороздок с мелкими, неправильно расположенными зернышками, кзади более острыми. От каждого зернышка отходит по волоску, длина которого приблизительно равна ширине промежутка. Ноги довольно тонкие и небольшие. Передние бедра булавовидные, без следа зубчика, голени прямые, с ровным, почти лезвиевидным наружным кантом, наружная вершинная лопасть довольно большая, усаженная короткими толстыми шипиками, внутренняя с зубцевидным шипом. Внутренний край голени с четырьмя шипиками. Лапка узкая, с глубокодвухлопастным третьим члеником. На верхней стороне бедер торчащие волоски. Средние и задние бедра менее булавовидные, голени совнутри с тонкими волосками, лапки еще более тонкие, чем на передних. Задние голени совнутри в довольно густых, более длинных, грубых волосках. Коготковый членик по длине равен половине лапки. Длина 4,8 мм (без головотрубки).

Найден на нижней части горного склона в полупустынной зоне под кустиком *Thymus* 10/IV 1958.

Сравнительные замечания: в группе видов, отнесенных мною к секции *Hanibotus*, списываемый вид стоит несколько особняком, благодаря отсутствию явственных куколочных придатков на мандибулах. По размеру и окраске он стоит ближе всего к *O. (Han.) angustifrons* Strl., но резко отличается от него формой головы и переднеспинки, последняя более сходна с таковой у недавно описанного вида *O. (Han.) sunicensis* L. Arn. (2). Отсутствие зубца на нижней стороне бедер также характерно для вновь описываемого вида.

Լ. Վ. ԱՌՆՈԼԴԻ

Otiorrhynchus Germ. սեռի նոր տեսակ Հայկական ՍՍՀ-ից
(Coleoptera, Curculionidae)

Հոդվածում տրված է երկարակնճիթների յի նոր տեսակի՝ *Otiorrhynchus hajastani* L. Arnoldi նկարագրությունը, որը գտնված է ապրիլ ամսում Վեդուս կիսաանապատային գոտում Այս տեսակը պատկանում է *Hanibotus* սեկցիային, բայց որոշ շեղումներով տարբերվում է:

ЛИТЕРАТУРА — ԿՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ E. Reitter, Bestimmungs-Tabellen der Untergattungen *Aramichnus* Gozls und *Tyloderes* Schönh. des Genus *Otiorrhynchus* Germ., Wiener Entomol. Zeitung, 31, 3-5, 1912. ² Л. В. Арнольди, ДАН Арм. ССР, 38, № 4, 251-256, 1964.