НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В. М. Тараян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и С. В. Вартамян

Экстракционно-фотометрическое определение рения
 метиленовым голубым

(Представлено 10/VI 1967)

Реакция взаимодействия метиленового голубого с перренатионом впервые была предложена для открытия микрограммовых количеств рения (¹). Опубликованное позже краткое сообщение об экстракционно-фотометрическом определении рения этим красителем не дает его полной характеристики как реагента на рений и не содержит всех необходимых данных для широкого практического его применения (²).

Учитывая то обстоятельство, что основные красители обладают высокой чувствительностью, мы решили исследовать оптимальные условия образования перрената метиленового голубого, а также определить состав и устойчивость этого соединения.

Метиленовый голубой относится к азтиониевым красителям (производные тиазина) и строение его аммониевой соли можно представить формулой:

Как краситель, так и его соединение с перренатом экстрагируются дихлорэтаном.

На фиг. 1 приведены спектры поглощения соединения и реактива в дихлорэтано, снятые на спектрофотометре СФ-4а. Из приведенных данных следует, что как у красителя, так и у соответствующего соединения рения максимум светопоглощения наблюдается при 645 мк. Далее для выяснения оптимальных условий экстракций была изучена зависимость величины оптической плотности дихлорэтановых экстрактов от рН водной фазы. Заданное значение рН создавалось с помощью фосфатных буферных растворов или фосфорной кислоты и контролировалось потенциометрически. Соединение экстрагировалось дихлорэтаном из водной фазы в интервале значений рН 1—8.

Фиг. 1. Спектры поглощения дихлорэтановых экстрактов. I—красителя (раствор сравнения дихлорэтан); II—соединения ReO_4^- с красителем (раствор сравнения—дихлорэтан); III—дифференциальная кривая. ($\text{pH}=4.55$; $[\text{Re}]$ и $[\text{красителя}]$ в водной фазе: $2,16 \cdot 10^{-6}$ М и $1,56 \cdot 10^{-4}$ М соответственно).

Фиг. 2. Зависимость оптической плотности дихлорэтановых экстрактов от pH среды. I—красителя (раствор сравнения дихлорэтан); II—соединения ReO_4^- с красителем (раствор сравнения дихлорэтан); III—дифференциальная кривая.

Фиг. 3. Зависимость оптической плотности от концентрации рения ($l=1$ см) в отсутствии и в присутствии $0,5$ мкг молибдена.

Фиг. 4. Кривые состав—оптическая плотность дихлорэтанового экстракта системы перманганат-метиленовой голубой при общей молярной концентрации. I— $5,4 \cdot 10^{-5}$ М; II— $2,7 \cdot 10^{-5}$ М.

В делительную воронку помещали 1 мл раствора перрената, содержащего 10 мкг Re, добавлением буфера создавалось требуемое pH, разбавляли водой до 25 мл, добавляли 10 мл дихлорэтана и взбалтывали 2—3 минуты. После разделения фаз оптическая плотность дихлорэтанового экстракта измерялась на СФ-4а при 645 мкм (фиг. 2). Раствором сравнения служил экстракт реактива.

Из приведенных на фиг. 2 данных следует, что оптимальные условия среды pH 4—5.

Фиг. 5. Логарифмический график зависимости образования ассоциата перрената от концентрации метиленового голубого. $[Re]_{орг}$ — концентрация соединения перрената с метиленовым голубым в органической фазе. $[Re]_{вод}$ — концентрация перрената в водной фазе $[краситель]$ — равновесная концентрация метиленового голубого в водной фазе.

Заметно высокий коэффициент распределения исследуемого соединения между органической и водной фазами позволил ограничиться однократной экстракцией. Для практически полного извлечения перрената достаточно применять 20-кратный избыток реактива. Окраска дихлорэтанового экстракта очень устойчива и сохраняется без изменения в течение нескольких дней. Подчиняемость основному закону фотометрии наблюдается в интервале концентрации 0—20 γ /10 мл дихлорэтана (фиг. 3). На основании данных калибровочного графика было найдено среднее значение кажущегося коэффициента молярного светопоглощения ($\epsilon_{645} = 110400$). Состав образующегося соединения был установлен методом изомолярных серий (фиг. 4), методом сдвига равновесия (фиг. 5) и препаративным методом.

В последнем случае соединение выделяли выпариванием дихлорэтанового экстракта. Сухой остаток растворяли в воде и определяли рений роданидным методом, а концентрацию красителя — по калибровочной кривой водных растворов красителя. Результаты, полученные тремя различными методами, однозначны и свидетельствуют о том, что перренат вступает в реакцию с метиленовым голубым в молярном отношении 1:1.

Была рассчитана константа неустойчивости соединения перрената с метиленовым голубым, для чего были использованы экспери-

ментальные данные трех независимых методов. Среднее значение константы нестойкости исследуемого соединения оказалось равным $7,0 \cdot 10^{-6}$. Определению мешают анионы: Cl^- , SO_4^{2-} , SCN^- , I^- , ClO_3^- , BrO_3^- . Молибдат- и вольфрамат-ионы образуют с метиленовым голубым труднорастворимое в воде соединение, не экстрагируемое дихлорэтаном. Данные калибровочного графика хорошо воспроизводимы в присутствии 0,5 мг молибдена (фиг. 3). Большие количества молибдена, как и вольфрама, мешают определению.

Ереванский государственный
университет

Վ. Մ. ԹԱՌԱՅԱՆ, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ քիմիկոս-անդամ, և Ս. Վ. ՎԱՐԳԱՆՅԱՆ

Ռենիումի լեհատակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումը մեթիլենային կապույտով

Հետազոտվել է որոշվել են մեթիլենային կապույտի և պերոքսիդային առաջացման օպտիմալ պայմանները, որոշվել են առաջացած միացությունների բաղադրությունը և կայունությունը:

Հուսակլանման մաքսիմումը համապատասխանում է սպեկտրի 645 մմկ-ին: Միջավայրի օպտիմալ $\text{pH} = 4-5$: Պերոքսիդային զործնականորեն ամբողջությամբ անցնում է օրգանական ֆազ ֆոսֆորաթթվային միջավայրում սեպտիկի քառապատիկ ավելցուկի ներկայությամբ: Բերի օրենքին ենթարկումը դիտվում է $0-20$ մկգ Re^+ 10 մկ դիքլորլիթանում: Հուսակլանման թվազոր մոլյար գործակցի արժեքը՝ $\epsilon_{645} = 110400$:

Պերոքսիդային մեթիլենային կապույտի հետ փոխազդում է 1:1 մոլյար հարաբերությամբ: Հետազոտվող միացության անկայունության հաստատունի միջին արժեքը $7,0 \cdot 10^{-6}$ է, հանգարում են Cl^- , SO_4^{2-} , SCN^- , I^- , ClO_3^- , BrO_3^- անիոնները: Մոլիբդենը և վոլֆրամը ջրային ֆազի 25 մկ-ում մինչև 0,5 մկ լինելու դեպքում չեն խանգարում ունիումի որոշմանը:

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

¹ В. Гейльман, К. Брюнгер, Zeltschr. für anorgan. und allgemein. Chemie, 199, 85, 1931. ² С. Трувала, Papers Symp. Chikago, 1960. Rhentum Compilation of papers edited by B. W. Gonser Elsevier Amsterdam—New York, 1962, p. 191, 199.