Последнее объясняет двузарядностью органического катиона. Б-зольный экстракт устойчив в течение 28 часов.

Ассоциат хлоридного комплекса таллия (III) с метиленовым синим экстрагируется смесью дихлорэтан-трихлорэтилен (1:1). Максимум светопоглощения дихлорэтан-трихлорэтиленового экстракта указанного соединения наблюдается при 655 нм (рис. 1). Оптимальная кислотность водной фазы 0,1—0,5 н. HCl. Оптическая плотность экстрактов подчиняется основному закону фотометрии в интервале концентрации 0,2—3,5 мкг таллия в 1 мл экстракта.

Рис. 1. Кривые светопоглощения экстрактов ассоциатов $TlCl_4^-$:
 —●—●—●—●— метиловый зеленый, —○—○—○—○— метиленовый синий; —Δ—Δ—Δ—Δ— метиленовый зеленый; —х—х—х—х— толуидиновый синий.

Кажущийся молярный коэффициент светопогашения равен 1,14.10⁴. Окраска экстракта устойчива в течении 36 часов. Методом изомолярных серий, а также препаративным методом установлено, что в экстрагируемом соединении соотношение катиона метиленового синего к хлоридному комплексу таллия (III) равно 1:1.

Смесь дихлорэтан-трихлорэтилен (1:1) является также хорошим экстрагентом для соединения хлоридного комплекса таллия (III) толуидиновым синим. Кривая светопоглощения дихлорэтан-трихлорэтиленового экстракта имеет максимум при 660 нм (рис. 1). Оптимальная кислотность водной фазы 0,01—1,0 н. HCl. Подчинение основному закону фотометрии наблюдается в пределах концентрации 0,05—1,0 мкг/мл.

Кажущийся молярный коэффициент светопогашения равен 1,17.10⁴. Значение оптической плотности экстракта в течение 16 часов не меняется.

ся. Методом сдвига равновесия, а также препаративно установлено, что отношение катиона толуидинового синего к хлоридному комплексу таллия (III) в полученном соединении равно 1:1.

Хлоридный комплекс таллия (III) с метиленовым зеленым экстрагируется смесью дихлорэтан-трихлорэтилен (1:1). Максимум светопоглощения экстракта наблюдается при длине волны 655 нм (рис. 1). Максимальная и постоянная оптическая плотность исследуемых экстрактов получается в интервале значений pH 2—1,0 н. HCl. Подчиняемость закону Бугера-Ламберта-Бера наблюдается в пределах 0,1—3,5 мкг таллия в 1 мл экстракта. Кажущийся молярный коэффициент светопоглощения равен $8,14 \cdot 10^4$. Окраска экстракта устойчива в течение 30 часов. Методами изомолярных серий, сдвига равновесия и препаративно установлено, что в экстрагируемом соединении соотношение органического катиона к TlCl равно 1:1.

На основании вышеприведенных данных разработаны новые высокочувствительные экстракционно-фотометрические методы определения микроколичеств таллия. Исследуются возможности применения вышеупомянутых красителей для экстракционно-фотометрического определения элементов, образующих анионные комплексы: Re(VII), Au(III), Ta(V) и т. д.

Ереванский государственный университет

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ քվարկից-անդամ Վ. Մ. ԹԱՌԱՅԱՆ, Ե. Ն. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, Վ. Ժ. ԱՐՄԵՐՈՒՆԻ

Թալիումի միկրոքանակների էֆստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշումը մի քանի հիմնային ներկերի՝ մեթիլային կանաչի, մեթիլենային կապույտի, տոլուիդինային կապույտի, և մեթիլենային կանաչի հետ

Հետազոտված է թալիումի (III) քլորիդային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը մի քանի հիմնային ներկերի՝ մեթիլային կանաչի, մեթիլենային կապույտի, տոլուիդինային կապույտի, և մեթիլենային կանաչի հետ:

Հաստատված է, որ թալիումի (III) քլորիդային կոմպլեքսի մեթիլային կանաչի հետ առաջացրած միացությունը լավ էքստրակցվում է բենզոլով: Ստացված էքստրակտի մաքսիմում լուսակլանումը նկատվում է 640 նմ ապեկտրի մարզում: Թալիումի (III) քլորիդային կոմպլեքսի առաջացրած միացությունը մեթիլենային կապույտի, մեթիլենային կանաչի և տոլուիդինային կապույտի հետ էքստրակցվում է դիքլորէթան տրիքլորէթիլեն խառնուրդով (1:1):

Ստացված էքստրակտների մաքսիմում լուսակլանումը համապատասխանում է առաջինը և երկրորդը՝ 655 նմ և երրորդը՝ 660 նմ ապեկտրի մարզում: Որոշված է ջրային ֆազի օպտիմալ թվությունը և ֆոտոմետրիայի հիմնական օրենքին հնթարկվելու սահմանները:

Մշակված են թալիումի (III) միկրոքանակների որոշման նոր, զգայուն եղանակներ:

ЛИТЕРАТУРА — 9 0 0 4 2 6 0 1 0 3 0 1 6

- ¹ И. Л. Блюм, И. А. Ульянова, «Заводская лаборатория», 23, 283 (1957). ² С. Д. Гурьев, Сборник трудов Гинцветмета, 10, 371 (1955). ³ Н. Т. Воскресенская, Журнал аналитической химии, 11, 585 (1956). ⁴ Н. Onishi, Bull. chem. Soc. Japan, 29, 945 (1956). ⁵ F. Culkin and J. P. Riley, Anal. Chim. Acta. 24, 413 (1961).