УДК 546.719+667.622

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Член-корреспондент АН Армянской ССР В. М. Тараян, С. В. Вартанян

О взаимодействии перренат-иона с основным красителем «нильским голубым»

(Представлено 11/VII 1968)

Ранее проведенными исследованиями было показано, что перренат-ион взаимодействуя с тиазиновыми красителями образует соединения, которые в виде ионных ассоциатов экстрагируются из фосфорнокислой среды. Полученные экстракты интенсивно окрашены и могут быть использованы для экстракционно-фотометрического определения малых количеств рения (^{1,2}).

Данные с применением для указанной цели красителей оксазинового ряда в литературе отсутствуют. Представляло интерес выяснить различие в реакционной способности тиазиновых и оксазиновых красителей, что по-видимому могло быть обусловлено заменой атома серы в соответствующих соединениях атомом кислорода. С этой целью изучено взаимодействие перренат-иона с оксазиновым красителем — кислая сернокислая соль амино-нафтодиэтил-аминофеноксазина («Нильский голубой А»).

Опыты показали, что этот реагент взаимодействует с рением (VII) в фосфорнокислой среде. Образующееся соединение экстрагируется дихлорэтаном.

На рис. 1 приведены спектры поглощения дихлорэтановых экстрактов красителя и его соединения (рН ≈ 5,6).

Экстракт чистого красителя имеет красную окраску и максимумы на кривой его светопоглощения наблюдаются при 530—550 нм и 650 нм. Дихлорэтановый экстракт соединения перренат-иона с красителем окрашен в синий цвет, а максимум его светопоглощения отмечается при 650 нм. В присутствии серной и в особенности соляной кислоты резко

повышается извлечение чистого красителя. Поэтому при определении оптимальных значений pH водной фазы, заданное значение pH создавалось с помощью фосфорной кислоты или фосфатных буферных растворов и контролировалось потенциометрически.

Рис. 1. Кривые светопоглощения дихлорэтановых экстрактов: 1— $4,8 \cdot 10^{-5}$ М раствора «ильского голубого» по отношению к дихлорэтану; 2—соединения перренат-иона с «ильским голубым» по отношению к холостому $[KReO_4] = 2,16 \cdot 10^{-6}$ М, $[крас.] = 4,8 \cdot 10^{-5}$ М (pH=5,6; $l=10$ мм).

Исследуемое соединение рения экстрагировалось дихлорэтаном из водной фазы в интервале значений pH 0,8—6,6. В делительную воронку помещали 1 мл раствора содержащего 10 мкг рения, 0,5 мл 0,1-процентного раствора красителя и соответствующим буферным раствором разбавляли до объема 25 мл. Затем добавляли 10 мл дихлорэтана и взбалтывали 1 мин. После разделения фаз оптическая плотность дихлорэтанового экстракта измерялась при 650 нм. Раствором сравнения служил экстракт реактива.

Рис. 2. Оптическая плотность дихлорэтанового экстракта в зависимости от кислотности водной фазы (среда фосфорнокислая): 1—красителя по отношению к чистому экстрагенту; 2—соединения по отношению к чистому экстрагенту; 3—дифференциальная кривая.

Из приведенных на рис. 2 данных следует, что наибольшее и постоянное значение оптической плотности наблюдается в интервале значений pH 1,9—5,7. Заметно высокий коэффициент распределения исследуемого соединения между органической и водной фазами, позволил ограни-

читься однократной экстракцией. Для практического полного извлечения рения достаточно 20-кратный избыток красителя. Окраска дихлорэтанового экстракта устойчива и сохраняется в течение 24 часов. Подчиняемость закону Бера соблюдается в интервале 0—20 $\mu\text{г Re}/10 \text{ мл}$

Рис. 3. Кривые состав-оптическая плотность дихлорэтанового экстракта системы перренат—„нильский голубой“ при общей молярной концентрации: 1— $2,7 \cdot 10^{-5} \text{ M}$; 2— $5,4 \cdot 10^{-5} \text{ M}$.

Рис. 4. Логарифмический график зависимости образования комплекса от концентрации „нильского голубого“. $[\text{Re}]_{\text{орг}}$ - концентрация соединения перрената с красителем в органической фазе, $[\text{Re}]_{\text{вод}}$ - концентрация перрената в водной фазе, $[\text{краситель}]$ —равновесная концентрация „нильского голубого“ в водной фазе.

дихлорэтана. Кажущийся коэффициент молярного погашения дихлорэтановых экстрактов ассоциата рения с красителем, полученный методом насыщения равен $\bar{\epsilon} = 8 \cdot 10^4$.

Состав образующегося соединения был установлен методом изо-молярных серий (рис. 3), методом сдвига равновесия (рис. 4) и препаративным методом^(3,4). ReO_4^- — реагирует с «нильским голубым» соотношением 1:1. Данные полученные методом сдвига равновесия, позволили рассчитать примерное значение константы неустойчивости образующегося соединения перрената с красителем «нильским голубым» ($K_{\text{н ст.}} \approx 2,7 \cdot 10^{-6}$).

В условиях образования этого ионного ассоциата изучалось также поведение некоторых обычно сопутствующих перренату ионов, а именно: молибдат-, вольфрамаг-, ванадат-ионов.

Установлено, что ванадат-ионы не мешают определению перрената до 400 γ /25 мл, а вольфрамаг—до 200 γ /25 мл. Присутствие молибдена допустимо до 50 γ в 25 мл водной фазы.

Ереванский государственный университет

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Իդրակից-անդամ Վ. Մ. ԹԱԻԱՅԱՆ, Ս. Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Պերոենատ իոնի փոխազդեցությունը հիմնային ներկ նիլյան կապույտի հետ

Պարզվել է, որ օրսագինային ներկ նիլյան կապույտը փոխազդում է պերոենատ իոնի հետ առաջացնելով ֆոսֆորաթթվային միջավայրում դիբորեթանով էքստրակվող իոնական ասոցիատ:

Որոշվել են միացութային առաջացման օպտիմալ պայմանները և բազադրությունը:

Մաքսիմում լուսակլուսումը ներկի դիբորեթանային էքստրակտի համար համապատասխան հանված էքստրակցիայով ներկի քանակատի կազմիցուկի ներկայութամբ: Բերիի օրենքին $\text{pH} = 1,9 - 5,7$: Պերոենատ իոնը պորձնականորեն ամբողջությամբ օրգանական ֆազ է անցնում միանված էքստրակցիայով ներկի քանակատիկ ավիցուկի ներկայութամբ: Բերիի օրենքին ենթարկումը դիտվում է 0,20 մկգ Re 25 մլ ջրային լուծույթում ($\epsilon_{650} = 80000$):

Պերոենատ իոնը նիլյան կապույտի հետ փոխազդում է 1:1 մոլյար հարաբերությամբ:

Որոշմանը խանգարում են $\text{Cl}, \text{SO}_4^{2-}$ իոնները: Վանադիումը չի խանգարում մինչև 400 γ /25 մլ: Մոլիբդենի ներկայութունը թույլատրելի է մինչև 50 γ , իսկ վոլֆրամինը՝ 200 γ 25 մլ ջրային լուծույթում:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

- ¹ S. Tribalat, Papers Symp. Chikago, 1960; Rhenium Compilation of papers edited by B. W. Gonser Elsevier Amsterdam—New York 1962 p. 191, 199. ² В. М. Тараян, С. В. Вартанян, ДАН АрмССР, т. XLV, № 2, 121 (1967). ³ А. К. Бабко, Физико-химический анализ комплексных соединений в растворах Изд. АН УССР, Киев, 1955. ⁴ Z. Culkin, J. P. Riley, Analytica Chimica Acta, 24, 413 (1961).