ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 547.12+547.322'333

Академик АН Армянской ССР А. Т. Бабаян, С. Т. Кочарян,
 Т. А. Азизян, П. С. Чобанян, Ф. С. Киноян

Механизм дегидрохлорирования триалкил(3-хлорбутен-2-ил)аммониевых солей

(Представлено 27/VI 1969)

Воднощелочное расщепление триалкил(3-хлорбутен-2-ил)аммониевых солей приводит к образованию третичного амина, хлоропрена и винилацетилена (1, 2). Отщеплению последнего предшествует реакция дегидрохлорирования, для которой возможны следующие пути:

Под действием спиртовой щелочи при температуре 20°. 80% бромистого триметил(3-хлорбутен-2-ил)аммония подвергается дегидрохлорированию и только 20% — расщеплению на триметиламин и хлоропрен.

Для расщепления дегидрохлорированной соли (V) требуется более высокая температура. Это дало возможность (3) изучить кинетику реакции расщепления дегидрохлорированной соли (V) и показать ее сходность с кинетикой расщепления бромистого триметил (бутин-2-ил) аммония (II, R = CH₃) и резкое отличие от кинетики расщепления бромистого триметил-(бутадиен-2,3-ил)аммония (III, R = CH₃). Последнее обстоятельство исключало схему (б), т. е. дегидрохлорирование за счет OH⁻. Оно и понятно: благодаря наличию аммониевого азота каждый акт отрыва OH⁻ должен привести не к минерализации хлора при углероде с

кратной связью, а к отщеплению третичного амина и образованию хлоропрена. Что касается сходности кинетики расщепления дегидрохлорированной соли (V) и соли II, то она хотя и говорит в пользу схемы (а), приводящей к образованию бутин-2-ильной группы, однако не исключает возможности дегидрохлорирования по (в) с образованием α -алленовой группировки. Тем более, что имеются экспериментальные данные (4) свидетельствующие об изомеризации бутин-2-ильной группы в α -алленовую в условиях щелочного расщепления:

Настоящая работа посвящена получению дальнейших информации о ходе дегидрохлорирования 3-хлорбутен-2-ильной группы в аммониевых соединениях.

Исходили из следующих соображений: если дегидрохлорирование протекает по (а), тогда соотношение реакций дегидрохлорирования и прямого расщепления, при взаимодействии соли I со спиртовой щелочью при температуре 20°. должно зависеть не только от протонной подвижности β - и соответственно δ -водородных атомов, но и от геометрического строения соли I. В случае же протекания дегидрохлорирования через предварительную изомеризацию, путь (в), геометрическое расположение в исходной соли не должно влиять на соотношение этих реакций.

Цис- и *транс*-триметил(3-хлорбутен-2-ил)аммоний бромиды были получены нами из соответствующих 1,3-дихлорбутенов-2 по прописи (5): *транс*- из обычного заводского 1,3-дихлорбутена-2 повторной перегонкой на колонке, *цис*-гидрохлорированием хлоропрена при комнатной температуре. Следует отметить, что этим путем не удастся получить *цис*-изомер в совершенно чистом виде, всегда имеется и небольшая примесь *транс*. Метод, обеспечивающий чистоту *цис*-изомера (6), многостадийен и связан с трудностями. Синтез изомерных солей аммония можно было осуществить непосредственным взаимодействием соответствующего 1,3-дихлорбутена-2 с триметиламином. Однако, желая иметь и изомерные амины, мы осуществили его по схеме:

В табл. I приведены некоторые константы полученных *цис*- и *транс*-1-диметиламино-3-хлорбутенов-2. На рис. 1 показаны ИК спектры этих аминов, а на рис. 2 ИК спектры их бромметилатов.

Физические константы 1-диметиламино-3-хлорбутенов-2

$(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2-\text{CH}=\text{CClCH}_2$	Температура кипения (давление в мм)	$n_D^{22,5}$	d_4^{20}	Температура плавления	
				пикрата	бромметилата
Цис	46,8—47 (17)	1,4489	0,9398	114—116	177—178
Транс	43—43,5 (17)	1,4481	0,9372	119—120	181—182

Рис. 1. ИК спектры, наверху *цис*-, внизу *транс*-1-диметиламино-3-хлорбутена-2

Общее описание взаимодействия *цис*- и *транс*- бромистых солей триметил-(3-хлорбутен-2-ил)аммония со спиртовым раствором едкого кали:

В круглодонную колбу, снабженную капилляром и шариковой насадкой, соединенную с системой поглотителей, содержащих титрованное количество серной кислоты, вносилось по 5 мл 0,3384 н. раствора *цис*-соли или 0,400 н. раствора *транс*- соли и 1,6 н. раствора едкого кали в 96% этиловом спирте. Реакционная смесь термостатировалась при 20°. По истечении определенного промежутка времени растворитель вместе

с образовавшимся триметиламином отгонялись в вакууме при 20°. Обратным титрованием содержимого поглотителей определялось количество амина. В содержимом реакционной колбы титрованием определялось количество образовавшегося ионного галоида. Полученные данные приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Результаты взаимодействия *транс*-бромистого триметил(3-хлорбутен-2-ил)аммония с едким кали в 96% этиловом спирте при 20°

Продолжительность взаимодействия, час	Процент дегидрохлорирования	Процент расщепления
3	45,0	9,5
5	55,0	11,5
10	80,5	20,5
24	80,0	20,0
24*	80,0	100,0

* После 72 часового стояния при 20°, реакционная смесь подвергнута расщеплению на кипящей водяной бане.

Рис. 2. ИК спектры, наверху *цис*-, внизу *транс*- бромистого триметил (3-хлорбутен-2-ил) аммония

Таблица 2

Результаты взаимодействия *цис*-бромистого триметил (-3-хлорбутен-2-ил)аммония с едким кали в 96%'-ном этиловом спирте при 20°

Продолжительность взаимодействия, час	Процент дегидрохлорирования	Процент расщепления
5	32,0	25,0
8	39,0	26,5
10	42,0	27,0
18	50,0	31,0
24	51,0	33,0
48	52,7	43,7
72	53,0	46,0
72*	54,0	99,3

* После 72-часового стояния при 20°, реакционная смесь подвергнута расщеплению на кипящей водяной бане.

Полученные результаты указывают на зависимость реакции дегидрохлорирования от геометрического строения 3-хлорбутен-2-ильной группы. Это мы рассматриваем как свидетельство в пользу схемы (а) и против схемы (в).

Институт органической химии
Академия наук Армянской ССР

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ա. Թ. ԲԱՐԱՅԱՆ, Ս. Թ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ, Թ. Ա. ԱԶԻՉՅԱՆ,
Փ. Ս. ՉՈՐԱՆՅԱՆ, Յ. Ս. ՔԻՆՈՅԱՆ

Տրիալկիլ-(3-քլորբուտեն-2-իլ)-ամոնիումային աղերի դեհիդրոքլորացման
ոնակցիայի մեխանիզմը

Տրիալկիլ-(3-քլորբուտեն-2-իլ)-ամոնիումային աղերի դեհիդրոքլորացման ոնակցիայի կարող է ընթանալ տրված (а), (б) և (в) հնարավոր ուղղություններով: Նախկինում տրիմեթիլ-(2-քլորբուտեն)-2-իլ)-ամոնիում բրոմիդի (1) դեհիդրոքլորացման ոնակցիայի կինետիկական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ (б) ուղղությունը բացառված է, [3]:

Հետաքրքիր էր պարզել, թե մնացած (а) և (в) ճանապարհներից որով է ընթանում ոնակցիան: Հարցի լուծումը տալու համար դուրս ենք հանել այն դատողություններից, որ եթե ոնակցիան զնում է ըստ (в)-ի, ապա դեհիդրոքլորացման և ուղղակի ճեղքման ոնակցիաների ելքերը պետք է կախված չլինեն ելային աղի (1) երկրաչափական կառուցվածքից: Այդ նպատակով սինթեզվել են (1) աղի ցիս- և տրանս-իզոմերները, ելնելով 1,3-դիքլորբուտենի-2-ի համապատասխան իզոմերներից [6] համաձայն նշված սխեմայի: Աղյուսակ 1-ում բերված են մեր կողմից սինթեզված ամինների մի քանի ֆիզիկական հաստատությունները, իսկ նկար 1-ում և 2-ում բերված են այդ ամինների և նրանց համապատասխան բրոմիդների ինֆրակարմիր սպեկտրները: 2 և 3 աղյուսակներում բերված են 1 աղի տրանս- և ցիս-իզոմերների փոխազդեցության արդյունքները սպիրտային հիմքի հետ 20° տակ:

Ստացված տվյալներից երևում է, որ դեհիդրոքլորացման և ուղղակի ճեղքման ոնակցիաները խոտ կախման մեջ են դտնվում 1 աղի երկրաչափական կառուցվածքից, որը խոսում է (а) սխեմայի օգտին և դեմ է (в)-ին:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1 А. Т. Бабаян, Авт. свид. 196803. Заявл. 19/III, 1951. опубли. Бюллетень 1967. № 12.
2 А. Т. Бабаян, Н. Г. Вартамян, Н. Я. Зурабов, ЖОХ, 25, 1610 (1955); 3 А. Т. Бабаян, Г. А. Азизян, П. С. Чобанян, Ученые записки Ереванского Гос. университета, № 3, (1969). 4 А. Т. Бабаян, М. Г. Инджикян, Р. А. Айвазян, М. Ж. Овакимян, «Известия АН Арм. ССР», ХН, XVIII, 6, 560 (1965). 5 Z. F. Hatch, S. G. Ballin, J. Am. Chem. Soc., 71, 1039 (1949). 6 Z. F. Hatch, R. H. Perry, J. Am. Chem. Soc., 77, 1136 (1955).