

УДК 595.768

М. Е. Тер-Минасян

**Новые виды жуков-зерновок (Coleoptera, Bruchidae)
 в фауне Кавказа**

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 16/VII 1969)

При обработке материалов по жукам-зерновкам Кавказа, хранящимся в коллекции Зоологического института Академии наук СССР, были обнаружены новые виды рода *Bruchidius* Schilsky, описание которых дается в настоящей статье.

Голотипы и паратипы описанных видов хранятся в коллекции Зоологического института Академии наук СССР.

Bruchidius armeniacus Ter-Minassian sp. n. (рис. 1).

♂: Голова густо- и мелкоточечная с тонким килем на лбу, с явственной перетяжкой за ним, наличник длиннее своей ширины, глаза небольшие, умеренно выпуклые, широко вырезанные, усики заходят за плечи почти до 1/4 надкрылий, начиная с 4-го членика резко пильчатые, их 1-й членик овальный, толстый, 2-й членик маленький, шарообразный, не длиннее 1/3 1-го членика, 3-й членик почти равен по длине 1-у, но расширен к вершине, 4-й членик слегка короче следующих, также как остальные до вершинного членика сильно расширен к вершине с заостренными наружными-углами, последний членик овальный с закругленной вершиной. Переднеспинка у основания явственно шире своей длины с слабо полукруглыми, почти прямолинейно суженными вперед боками, с перетяжкой перед вершиной, с заостренными задними углами, сверху явственно выпуклая, с неглубокими выемками по обеим сторонам базальной лопасти, густо и довольно крупно точечная. Надкрылья менее чем в 1 1/2 раза длиннее общей ширины плеч, от плеч постепенно очень слабо расширены назад, наибольшей ширины за серединой, с общим вдавлением за щитком, с довольно глубокими точечными бороздками и не широкими плоскими, мелко и густо точечными промежутками. Пиландий шире своей длины, выпуклый. Ноги умеренно тонкие, длинные.

Весь черный, 2-й членик усика снизу желтоватый. Покрыт тонкими не густыми серовато-желтыми волосками, не скрывающими структуру. Дл. 2,5 мм.

Кипчах, сев.-зап. склон Алагеза (Арич, Артикского района Армянской ССР) 6/VI 1934 ♂ и ♀ (М. Тер-Минасян).




Рис 1. *Bruchidius armeniacus* T.-M.

Близок к *B. nanus* Payk., но отличается от него более короткими усиками, которые у самца не доходят до середины надкрылий, в то время как у *B. nanus* Payk. усики самца длиннее середины надкрылий, выемки по обеим сторонам базальной лопасти не глубокие, бока переднеспинки значительно менее закруглены, волоски покрывающие жука более густые и светлые.

Bruchidius lukjanovitschi Ter-Minassian sp. n.

♂: Голова густо- и мелкоточечная, вместе с сильно выпуклыми глазами заметно шире переднего края переднеспинки, лоб узкий, слегка сужен к переднему краю глаз, между глазами имеется тонкий киль, который выпукло-утолщен в задней части у заднего края глаз, наличник не длиннее своей ширины у основания, сверху вогнутый, усики длинные, достигают вершин надкрылий, их 1-й членик небольшой, овальный, 2-й не длиннее половины 1-го, 3-й равен по длине 1-у, но слегка расширен к вершине, начиная с 4-го членики усиков почти равны между собой по длине, продолговатые, не менее чем в $1\frac{1}{2}$ раза длиннее своей ширины у вершины, явственно расширены к вершине, с оттянутыми углами, но не резко пальчатые. Переднеспинка у основания не менее чем на $\frac{1}{4}$ шире своей длины с явственными выемками по бокам базальной лопасти, с сильно конически суженными от основания к вершине боками, с явственно, но не сильно выпуклым по середине диском, с заостренными задними углами, довольно крупно и густо точечная. Щиток небольшой с

выемкой на вершине. Надкрылья не менее чем в $1\frac{1}{2}$ раза длиннее общей ширины плеч, у основания шире переднеспинки, с выступающими плечами, параллельносторонние до вершины, сверху слабо выпуклые, с небольшим, но явственным общим довольно глубоким вдавлением за щитком близ середины надкрылий с тонкими бороздками и довольно широкими промежутками между ними без зубчиков или бугорков, равномерно густо покрытыми мелкими точками, блестящие. Ноги тонкие, длинные, задние бедра почти не утолщены. Пигидий шире своей длины, выпуклый, покрыт более светлыми волосками чем надкрылья. Весь не густо покрыт желтоватыми блестящими прилегающими волосками. Низ и ноги покрыты редкими светлыми волосками. Черный, 1—2 членики усиков снизу, передние голени, частично и вершинная часть средних голеней желтоватые. Дл. 3 мм.

Азербайджанская ССР, Зувантский район, 1/IX 1937 1 ♂.

Близок к *Bruchidius rubicornis* Luk. et T.-M., но отличается от него почти квадратным наличником, более длинными достигающими вершины надкрылий усиками, прямолинейно суженными боками переднеспинки, тонкими ногами.

Bruchidius talyshensis Ter-Minassian sp. n. (рис. 2.).

♂: Голова мелко и не очень густо точечная, лоб слабо сужен по направлению вперед с тонким срединным килем и перетяжкой за глазами.




Рис. 2. *Bruchidius talyshensis* T.-M.

Наличник с выемкой у основания, сужен к вершине, густо и мелко точечный. Усики едва заходят за плечи, не пильчатые, их 1-й членик продолговато-овальный, 2-й короче половины 1-го, 3-й и 4-й почти равны по

длине, узкие, почти цилиндрические, 5-й немного длиннее 3-го и 4-го и слегка расширен к вершине, 6—10-й членики мало отличаются между собой по длине, шире своей длины, почти бокаловидные с слегка оттянутыми наружными углами. Последний членик продолговато-овальный, с закругленной вершиной. Переднеспинка у основания не менее чем на 1/3 шире своей длины, с прямолинейно конически суженными вперед боками, сверху заметно выпуклая, без выемок по обеим сторонам базальной лопасти, с заостренными задними углами, густо и довольно крупно точечная. Щиток небольшой с закругленной вершиной. Надкрылья не более чем на 1/4 длиннее общей ширины плеч, параллельносторонние, с довольно глубокими точечными бороздками, у основания 3-й и 4-й бороздок имеется по одному небольшому зубчику, промежутки шире бороздок, но не очень широкие, плоские, покрыты точечно-морщинистой скульптурой. Пигидий продолговатый, длиннее своей ширины у основания, не подогнут книзу и виден сверху, с продольной не резкой выпуклостью по середине и вдавлениями вдоль боковых краев. Ноги не тонкие, задние бедра толстые. Брюшко покрыто мелкими точками.

♀ : усики короче, едва достигают плеч.

Черный, 1—4 членики усиков, передние ноги и средние голени желтовато-красные. Верх не густо покрыт тонкими золотистыми волосками, пятно на базальной лопасти переднеспинки и у середины основания пигидия и щиток покрыты белыми волосками, низ покрыт редкими серыми волосками. Дл. 2,5—2,8 мм.

Азербайджанская ССР, Талыш, Калабаш 29/V 1959 (3 ♂); Ярдымлы там же 18/V 1959 (1 ♀).

Близок к *Bruchidius koenigi* Schilsky, но легко отличается от него желтовато-красными 1—4 члениками усиков, передними и частично средними ногами, равномерно расширенными задними голеними.

Зоологический институт
Академии наук СССР

И. С. СЕР-ИГНАЦЕВСКИЙ

Bruchidae բզեզների նոր տեսակներ Կովկասի ֆաունայում
(Coleoptera, Bruchidae)

Ներկա աշխատանքում նկարագրված են Bruchidae բնտանիքին պատկանող 3 նոր տեսակ բզեզներ Կովկասի ֆաունայից: Այդ տեսակներից՝ *Bruchidius armeniacus*-ը գրանցված է Հայկական ՍՍՀ Արթիկի շրջանում, իսկ *B. lukjanovtshi* և *B. talyshensis* տեսակները գտնված են Ադրբեջանական ՍՍՀ-ի շրջաններում: