

УДК 595.763.7

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. М. Яблоков-Хизорян

Два новых вида бегунчиков из СССР (Coleoptera, Carabidae)

(Представлено академиком АН Армянской ССР В. О. Гулканяном 25/VIII 1969)

1. *Bembidion (Peryphus) sunicum* Iablokoff-Khnzorian, sp. nov.
 АрмССР: Анкаван, 20 VIII 1955 у берега Мармарика на высоте около 2000 м, самец (голотип); там же, 11/VIII 1961, 2 самца и две самки (паратипы), по сборам автора; Санаин, по сборам Малкуженко, 1 самка.

Черно-синий, надкрылья черные, обычно с 4 красно-желтыми пятнами, 2 у плеч и 2, небольших, сбоку в задней трети; ни одно пятно не достигает бокового края, плечевые отходят от узкой темной основной каймы надкрылья; у одной самки надкрылья одноцветно темные. Усики темные со светлыми 3-я основными члениками. Щупики желтые, предпоследний членик челюстных щупиков темный, ноги одноцветно желтые. Длина 5 мм. Рис. 1 (справа).

Голова с большими плоскими глазами и длинными висками, глазные бороздки не загибаются за висками, а направлены косо назад к темени. Лоб с несколькими мелкими точками, сгущенными у лобных бороздок на гладком фоне. Усики в 2 раза длиннее ширины переднеспинки. Переднеспинка сердцевидная, ее основание с несколькими вдавленными точками, без морщинок и с 2 округлыми боковыми вдавлениями, снаружи отграниченными неясной складкой, задние углы остроконечные. Основание переднеспинки такой же ширины, как голова, в 1,2 раза уже ее наибольшей ширины перед серединой, диск с тонкой и частично редуцированной срединной бороздкой на гладком фоне, вдоль боков фон сетчато шагреневанный, боковой край приподнят по всей длине, внутри отграничен глубоким желобком, видимым сверху до передних углов. Надкрылья слегка обратно яйцевидные, в 3 раза длиннее переднеспинки, в 1,5 раз длиннее общей ширины (длина измерена вдоль шва вместе со шитком), с широко закругленными плечами, их бороздки состоят спереди из крупных, кзади из мелких точек, 7-я в основной половине сходная с 6-й, кзади бороздки укорочены слегка (как у *B. saxatile* Gyll.). Фон ячеисто шагреневанный, в среднем с узкими ячейками. Боковой край

надкрылий приподнят и ограничен снизу желобком, плоским у плеч и глубоким кзади. Хетотаксия обычно для этого подрода типа. Плечи с 4 парами хлыстов, надкрылья на диске с 2 парами щетинконосных пор вдоль 3-й бороздки, поры ската расположены на боковой бороздке.

У ♂, как обычно у этого рода, 1-й членик передних лапок выпуклый, утолщенный и удлиненный, 2-й поперечный, с боковым зубцом на первом краю.




Рис. 1. слева — *Bembidion sunicum* Khnz. sp. nov., справа — *B. zolotarewi* Reitt.

Этот вид принадлежит к подроду *Peryphus* Steph. рода *Bembidion* Latr. и к небольшой его группе с точечным лбом. От всех видов этой группы, кроме *B. zolotarewi* Reitt., а также от почти всех прочих палеарктических видов подрода он отличается короткими надкрыльями (которые у прочих видов по крайней мере в 1,6 раз длиннее общей ширины). Принадлежит, по-видимому, к группе *B. saxatile* и является ее единственным представителем в Армянской ССР.

B. zolotarewi иного габитуса — надкрылья уже, в 1,58 раз длиннее общей ширины, переднеспинка более сердцевидная, усики длиннее (рис. 1, справа); окраска надкрылий буровато-зеленая, одноцветная или с расплывчатым осветлением у плеч и у вершины, без четких пятен; структурные отличия: усики очень короткие, четко ограничены кзади бороздкой, являющейся продолжением лобной; переднеспинка с глубокой и цельной срединной бороздой — что побудило Рейттера, при описании этого вида, отнести его ошибочно к подроду *Pseudolimnaceus* Kr., ошибка, которая была исправлена в дальнейшем, ее задние углы без складки (нечеткий признак); надкрылья по всему контуру с широко приподнятым боковым

краем, отграниченным спутря глубоким желобком, их боковые бороздки складки укорочены больше, чем у *B. similis*.

2 *Bembidion* (*Euphonia*) *lancea* Исаковой-Княкышев sp. nov.
Гимотин, Казахский берег Илан у Иланьска, на высоте около 400 м на правом берегу на высоте, в бороздках песка, 14/V 1960, самка.

Тело однотонно черно-бурое, без металлического блеска, усники и щупики темные, ноги желтые. Длина 3 мм. Рис. 2

Голова с большими глазами, с очень короткими усиками, лоб с тонкими средними кильми, расширенными перед на наличники, но не до



Рис. 2 *Bembidion lancea* Исаковой-Княкышев sp. nov.

стигающим его переднего края, вдоль края с 2 продольными вдавлениями, спереди глубокими, складки поперечными, лобные бороздки простые, довольно извилистые, но в общем приполюсковые и параллельные друг другу, достигают вершины наличника. Усники такой же длины, как ширина обеих надкрылий вместе взятых. Передвешивание сердцевидное, наибольшей ширины перед серединой, ближе к вершине, ее окантовка с боков скошена, соответственно задние углы тупые, выступающие, боковой край спереди очень широкий, закругленный, в задней половине сильно изогнут до задних углов, диск с очень тонкой и укороченной средней линией, основанию вдавлено по всей длине, с рядом точек вдоль этого вдавления, у задних углов с короткой складкой. Плечи с четкой

